

中医执业医师资格考试 冲刺金题

金英杰国家医学考试研究中心 编

中医内科学(修订版)

 北京金英杰图书有限公司

第五篇 中医内科学

第一章

肺系病证

一、感冒

1. 时行感冒与感冒风热证的区别点, 关键在于

- A. 恶寒的轻与重
- B. 发热的轻与重
- C. 咽喉肿痛与否
- D. 有无流行性
- E. 脉数与否



配套名师高清视频

2. 患者恶寒重发热轻, 无汗, 头痛, 肢体疼痛, 鼻塞声重, 时流清涕, 喉痒, 舌苔薄白而润, 脉浮。其治法是

- A. 散寒解肌
- B. 辛温解表
- C. 调和营卫
- D. 散寒止痛
- E. 发汗解肌

3. 患者身热, 微恶风, 汗少, 肢体痠重, 头昏重胀痛, 咳嗽痰黏, 鼻流浊涕, 心烦, 口渴, 舌苔薄黄而腻, 脉濡数。治疗应首选

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 新加香薷饮
- D. 桑白皮汤
- E. 藿香正气散

4. 感冒的病机主要是

- A. 肺气失宣
- B. 卫表不固
- C. 肺气上逆
- D. 肺气失肃

E. 卫表失和

5. 导致感冒的主因是

- A. 寒邪
- B. 热邪
- C. 风邪
- D. 湿邪
- E. 暑邪

6. 患者恶寒较甚, 发热, 无汗, 身楚倦怠, 咳嗽, 咳痰无力, 舌淡苔薄白, 脉浮无力。治疗应首选

- A. 杏苏散
- B. 参苏饮
- C. 荆防败毒散
- D. 葛根汤
- E. 桂枝汤

7. 感冒主要发生在哪一季节

- A. 春夏
- B. 秋冬
- C. 春秋
- D. 夏秋
- E. 冬春

8. 感冒之风寒束表证的代表方剂是

- A. 银翘散
- B. 荆防达表汤
- C. 新加香薷饮
- D. 参苏饮
- E. 加减葶藶汤

9. 区别风寒感冒和风热感冒的辨证依据中, 以下哪项是错误的

- A. 恶寒、发热的轻重程度
- B. 脉浮与不浮
- C. 舌苔黄与白
- D. 咽喉红肿疼痛与否
- E. 口渴与口不渴

10. 阳虚感冒的治疗方剂宜首选

- A. 参苏饮
- B. 加减葶苈汤
- C. 右归丸
- D. 再造散
- E. 麻黄附子细辛汤

11. 表虚自汗, 易伤风邪者, 宜常用的方剂是

- A. 加减葶苈汤
- B. 补肺汤
- C. 防风汤
- D. 参苏饮
- E. 玉屏风散

12. 暑湿感冒, 暑热偏盛, 热盛烦渴者, 治疗方剂应首选

- A. 新加香薷饮
- B. 藿朴夏苓饮
- C. 黄连香薷饮
- D. 三物香薷饮
- E. 藿香正气散

13. 感冒之名的记载最早见于下列哪本书

- A. 《丹溪心法》
- B. 《诸病源候论》
- C. 《医学源流论》
- D. 《仁斋直指方》
- E. 《证治汇补》

14. 患者, 女性, 27 岁。身热, 微恶风, 汗少, 头昏重胀而痛, 心烦口渴, 胸闷恶心, 小便短赤, 舌苔薄黄腻, 脉濡数。此患者应诊断为

- A. 风热感冒
- B. 风寒感冒
- C. 时行感冒
- D. 阴虚感冒

E. 暑湿感冒

15. 患者, 女性, 21 岁。身热恶风, 汗出不畅, 咳嗽, 咯吐黄黏痰, 咽喉肿痛, 口渴, 舌苔微黄, 脉浮数。方剂宜选用

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 加减葶苈汤
- D. 香薷饮
- E. 止嗽散

16. 患者, 男, 19 岁。近来恶寒较甚, 发热无汗, 身楚倦怠, 咳嗽, 咯痰无力, 平素气短懒言, 舌淡苔白, 脉浮无力。治疗方剂宜首选

- A. 新加香薷饮
- B. 葱白七味饮
- C. 参苏饮
- D. 再造散
- E. 加减葶苈汤

17. 患者, 男, 67 岁。病起 4 日, 恶寒发热, 身热较著, 鼻塞流黄涕, 少汗身痛, 咳嗽气急, 痰稠色黄, 咽痛声哑, 苔薄黄, 舌尖红, 脉浮数。证属

- A. 风寒束表证
- B. 气虚感冒
- C. 暑湿伤表证
- D. 风热犯表证
- E. 阴虚感冒

18. 患者, 女性, 16 岁。昨晚在外淋雨后出现恶寒, 发热, 无汗, 头痛, 四肢酸痛, 流清涕, 咳嗽, 吐白稀痰, 舌苔薄白润, 脉浮紧。此证应诊断为

- A. 咳嗽
- B. 鼻渊
- C. 痹证
- D. 头痛
- E. 感冒

19. 风寒感冒兼胸脘痞闷, 食少纳呆, 脉濡者, 治疗应首选

- A. 荆防败毒散

- B.羌活胜湿汤
- C.杏苏散
- D.香苏散
- E.三仁汤

(20~21 题共用备选答案)

- A.玉屏风散
- B.参苏饮
- C.再造散
- D.补中益气汤
- E.加减葶藶汤

20. 阴虚感冒的代表方剂宜首选

21. 气虚感冒的代表方剂宜首选

(22~23 题共用备选答案)

- A.新加香薷饮
- B.参苏饮
- C.荆防败毒散
- D.银翘散
- E.加减葶藶汤

22. 感冒暑湿伤表证的代表方剂应首选

23. 感冒风热犯表证的代表方剂应首选

(24~25 题共用备选答案)

- A.风寒感冒
- B.风热感冒
- C.暑湿感冒
- D.气虚感冒
- E.阴虚感冒

24. 身热,微恶风,汗少,肢体酸重或疼痛,头昏重胀痛,咳嗽痰黏,鼻流浊涕,心烦口渴,渴不多饮,胸闷脘痞,泛恶,腹胀,大便或溏,小便短赤,舌苔薄黄而腻,脉濡数。证属

25. 恶寒重,发热轻,无汗,头痛,肢节酸疼,鼻塞声重或鼻痒喷嚏,时流清涕,咽痒,咳嗽,痰吐稀薄色白,口不渴或渴喜热饮,舌苔薄白而润,脉浮紧。证属

二、咳嗽

1. 治疗咳嗽,应以治肺为主,还应当注意治

- A.肝、脾、肾

- B.心、肝、肾
- C.心、脾、肾
- D.心、肝、脾
- E.肝、肾、胃

2. 下列各项中,除哪项外,均是内伤咳嗽的常见病因

- A.情志刺激
- B.饮食不节
- C.过劳努伤
- D.肺脏虚弱
- E.久病伤阴



配套名师高清视频

3. 女,20 岁。每遇生气后即咳逆阵作,口苦咽干,胸胁胀痛,咳时面赤,舌红苔薄黄,脉弦数。其证候是

- A.痰热郁肺
- B.肝肺气逆
- C.肝火犯肺
- D.阴虚火旺
- E.肺热津伤

4. 患者,男,40 岁。咳嗽气促,咳痰量多,痰质粘稠而黄,咯吐不爽,胸胁胀满,面赤身热,口干,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗应首选

- A.止嗽散
- B.桑菊饮
- C.二陈汤
- D.清金化痰汤
- E.加减泻白散

5. 女,20 岁。每逢生气即咳逆阵作,口苦咽干,胸胁胀痛,咳时面赤,舌红苔薄黄,脉弦数。治疗应首选

- A.加减泻白散合黛蛤散
- B.龙胆泻肝汤合黛蛤散
- C.清金化痰汤合桔梗汤
- D.二陈汤合柴胡疏肝散
- E.桑白皮汤合柴胡疏肝散

6. 治疗咳嗽痰热郁肺证的最佳方剂应选择

- A.桑菊饮

- B. 桑白皮汤
- C. 清金化痰汤
- D. 清肺饮
- E. 泻白散

7. 在下列各选项中, 哪一项不是内伤咳嗽的分型

- A. 痰湿蕴肺
- B. 肺气郁痹
- C. 痰热郁肺
- D. 肝火犯肺
- E. 肺阴亏耗

8. 在治疗咳嗽初起时, 应当忌用

- A. 诃子、五味子
- B. 沙参、麦冬
- C. 双花、连翘
- D. 黄芩、冬花
- E. 半夏、陈皮

9. 外感咳嗽治疗原则是

- A. 祛邪利肺
- B. 疏风散寒
- C. 调和营卫
- D. 解表发汗
- E. 祛风化痰

10. “五脏六腑皆令人咳, 非独肺也”的记载出自于以下哪一书籍

- A. 《内经》
- B. 《金匱要略》
- C. 《诸病源候论》
- D. 《景岳全书》
- E. 《医学入门》

11. 下列哪一项不是肺阴亏耗型咳嗽的主症

- A. 干咳, 咳声短促
- B. 痰少黏白
- C. 口干咽燥
- D. 食少脘痞
- E. 脉象细数

12. 外感咳嗽的病位主要在

- A. 脾

- B. 心
- C. 肺
- D. 肾
- E. 肝

13. 患者, 男, 18 岁。咳嗽, 咯黄稠痰, 咳时汗出口渴身热, 恶风肢楚, 舌苔薄黄, 脉浮数。治法宜采用

- A. 疏风散寒, 宣肺止咳
- B. 健脾燥湿, 化痰止咳
- C. 清肺化痰, 肃肺降气
- D. 疏风清热, 宣肺化痰
- E. 疏风清热, 润燥止咳

14. 患者, 女, 56 岁。干咳, 痰少而色白, 声哑, 口咽干燥, 神疲乏力, 形瘦, 舌红少苔, 脉细数。此咳嗽宜选用

- A. 清肺润燥, 化痰止咳
- B. 疏风清肺, 润燥止咳
- C. 滋阴润肺, 止咳化痰
- D. 养阴清肺, 化痰止咳
- E. 清热化痰, 平肝降火

15. 患者, 女, 39 岁。干咳日久, 症见痰少而黏白, 声哑, 口干咽燥, 潮热盗汗, 渐消瘦, 舌红少苔, 脉细数。此病证属

- A. 肺癆之阴虚火旺型
- B. 咳嗽之肺阴亏耗型
- C. 血证咳血之阴虚火旺型
- D. 内伤发热之阴虚内热型
- E. 虚热肺痿

16. 内伤咳嗽之肝火犯肺证治疗的代表方剂是

- A. 清金化痰汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 桑杏汤
- D. 桑菊饮
- E. 黛蛤散合加减泻白散

17. 最早把咳嗽分为外感和内伤两类的医家是

- A. 李中梓
- B. 刘完素

- C.朱丹溪
D.张景岳
E.钱乙

18.在外感咳嗽与内伤咳嗽的鉴别中,下列哪一项对鉴别无意义

- A.病程的长短
B.起病的缓急
C.咳嗽的多少
D.疾病的新久
E.属实属虚

19.在五脏中与咳嗽病证的关系最不密切的是

- A.肾
B.肝
C.脾
D.肺
E.心

20.患者,男,25岁。咳嗽气粗,咯大量白色黏痰,伴胸胁胀满而痛,面赤身热,口干欲饮,舌苔黄厚腻,舌质红,脉数。治法宜选用

- A.清肺平肝降火
B.清热化痰肃肺
C.疏风清热肃肺
D.健脾燥湿化痰
E.温化痰湿宣肺

21.患者,女,65岁。反复咳嗽已经6年,咳声重浊,痰色白量多质稠,胸闷,脘痞,食少,体倦,苔白腻脉滑。此患者宜选用

- A.二陈汤
B.导痰汤
C.麻杏苡甘汤
D.麻杏石甘汤
E.清金化痰汤

22.肺阴亏耗证的咳嗽首选方剂为

- A.清燥救肺汤
B.玉屏风散
C.麦门冬汤
D.沙参麦冬汤

E.百合固金丸
(23~24题共用备选答案)

- A.风热犯肺
B.风寒袭肺
C.风燥伤肺
D.痰热郁肺
E.肺阴亏耗

23.三拗汤合止嗽散治疗咳嗽的证型为

24.桑菊饮治疗咳嗽的证型为

(25~26题共用备选答案)

- A.二陈汤合三子养亲汤
B.清金化痰汤
C.桑杏汤
D.黛蛤散合加减泻白散
E.三拗汤合止嗽散

25.治疗肝火犯肺型咳嗽的代表方剂是

26.治疗痰湿蕴肺型咳嗽的代表方剂是

(27~28题共用备选答案)

- A.疏风清热,润燥止咳
B.疏风清热,宣肺止咳
C.清肝泻肺,化痰止咳
D.清热肃肺,化痰止咳
E.滋阴润肺,化痰止咳

27.患者咳嗽咳痰不爽,痰黄或黏稠,喉燥咽痛,常伴恶风身热,头痛肢楚,鼻流黄涕,口渴,舌苔薄黄,脉浮数。其治法是

28.患者喉痒干咳,无痰或痰少而粘连成丝,咳痰不爽,咽喉干痛,唇鼻干燥,口干,常伴鼻塞,头痛,微寒,身热,苔薄黄或薄白,脉浮。其治法是

三、哮病

1.患者,男,42岁。呼吸气促,喉中哮鸣有声,胸闷如窒,口不渴,形寒肢冷,面色晦暗,舌苔白滑,脉弦紧。治疗应首选

- A.二陈汤
B.麻黄汤
C.定喘汤
D.射干麻黄汤
E.平喘固本汤

2. 患者哮喘多年,气短息弱,自汗畏风,面色白,咳嗽痰稀,舌淡苔白,脉弱。其诊断是

- A. 哮证缓解期,肺虚
- B. 哮证缓解期,脾虚
- C. 哮证缓解期,肾虚
- D. 虚喘,肺虚
- E. 虚喘,肾虚

3. 患者呼吸急促,喉中哮鸣有声,胸膈满闷,咳嗽痰少,形寒畏冷,舌苔白滑,脉弦紧。其治法是

- A. 温肺化痰,纳气平喘
- B. 温肺散寒,化痰平喘
- C. 温肺散寒,止咳化痰
- D. 温肺化痰,散寒解表
- E. 散寒温脾,化痰平喘

4. 患者喉中痰鸣如吼,气粗息涌,胸高胁胀,咳痰色黄烦闷不安,汗出面赤,口渴喜饮,舌红苔黄腻,脉弦滑。其治法是

- A. 清热泻肺,豁痰开窍
- B. 宣肺化痰,止咳平喘
- C. 清热宣肺,化痰定喘
- D. 宣肺解表,止咳化痰
- E. 泻肺通腑,宣肺清热

5. 患者,男性,60岁。呼吸急促,喉间哮鸣有声,胸膈满闷如塞,面色晦滞带青,口不渴,形寒怕冷,舌苔白滑,脉弦紧。若表寒里饮,寒象较甚者,可用

- A. 射干麻黄汤
- B. 小青龙汤
- C. 苏子降气汤
- D. 定喘汤
- E. 三子养亲汤

6. 哮病发作时的病理环节在于

- A. 肺气不清
- B. 肺失宣降
- C. 伏痰
- D. 痰阻气闭
- E. 肺气虚寒

7. 痰阻气道,肺失宣降是哪个病证的基

本病机

- A. 肺癆
- B. 喘证
- C. 咳嗽
- D. 肺胀
- E. 哮证

8. 哮证寒包火证的首选方剂是

- A. 平喘固本汤
- B. 小青龙加石膏汤
- C. 麻杏石甘汤
- D. 定喘汤
- E. 大青龙汤

9. 哮病最主要的发病诱因是

- A. 气候突变
- B. 饮食不当
- C. 劳累过度
- D. 饮食不节
- E. 情志失调

10. 寒哮久发易伤内脏,一般伤及

- A. 肺肾
- B. 肺脾肾
- C. 脾肾
- D. 肺脾
- E. 肺心

11. 哮病的宿根是

- A. 寒
- B. 热
- C. 痰
- D. 气
- E. 火

12. 哮病缓解期表现为肺脾气虚证候者,宜选用的方剂是

- A. 左归饮
- B. 六君子汤
- C. 六味地黄丸
- D. 麦门冬汤
- E. 大补阴丸

13. 哮病内外皆寒的常用治疗方剂是

- A. 小青龙汤

- B. 华盖散
- C. 甘姜苓术汤
- D. 二陈平胃汤
- E. 半夏厚朴汤

14. 治疗热哮的发作期,应首选方剂是

- A. 桑白皮汤
- B. 麻杏石甘汤
- C. 苏子降气汤
- D. 定喘汤
- E. 泻白散

15. 冷哮咳痰特点为

- A. 臭脓痰
- B. 痰稠黄胶黏
- C. 痰黄白相兼
- D. 痰如白沫量多
- E. 痰稀薄多沫咯吐不爽

16. 哮喘之病名最早见于以下哪本书

- A. 《金匱要略》
- B. 《内经》
- C. 《医学正传》
- D. 《丹溪心法》
- E. 《景岳全书》

17. 患者,男,56岁。哮喘十余年,发作已经半月,经治略平,但现仍感胸闷气短,动则喘甚,吸气不利,腰酸乏力,不耐劳累。烦热颧红,口干,舌红少苔,脉细数。证属

- A. 痰浊阻肺证
- B. 下虚上实证
- C. 肺肾两虚证
- D. 心阳欲脱证
- E. 脾肾两虚证

18. 最早阐明哮喘病机为痰的医家是

- A. 张景岳
- B. 李东垣
- C. 刘完素
- D. 朱丹溪
- E. 李中梓

19. 患者,男,76岁。平素食少脘痞,大便不实,每于饮食不当时引发哮喘,现倦怠,

气短,舌质淡,苔白滑,脉细软。方药宜选用

- A. 生脉散
- B. 四君子汤
- C. 六君子汤
- D. 香砂六君子汤
- E. 补中益气汤

20. 哮喘发作时以邪实为主,在辨证时首先应当分清的是

- A. 气血
- B. 虚实
- C. 阴阳
- D. 表里
- E. 寒热

21. 患者,男,47岁。气粗息涌,喉间痰鸣,痰白质黏,难以咯出,烦闷不安,口苦,口渴喜饮,舌红苔黄,脉滑数。此时应选用的方剂是

- A. 苏子降气汤
- B. 定喘汤
- C. 控涎丸
- D. 射干麻黄汤
- E. 小青龙汤

22. 患者,男,65岁。平素有哮喘病史,发作2月,时轻时重,近2日以来喘咳加剧,喘急面青,烦躁不安,汗出肢冷,舌淡紫,脉细,治宜

- A. 补肺纳肾固脱
- B. 养阴益气救脱
- C. 健脾益气固脱
- D. 益气回阳救逆
- E. 温肾平喘固脱

23. 患者,女,66岁。久患哮喘不愈,平素短气息促,动则为甚,吸气不利,心慌,脑转耳鸣,腰酸膝软,劳累后哮喘更易发作。治宜

- A. 温补肾阳
- B. 健脾益肾
- C. 滋阴益肾
- D. 补肺益肾

E.补益精血
(24~25 题共用备选答案)

- A.宣肺散寒
- B.祛风涤痰
- C.温清并施
- D.清热宣肺
- E.扶正固脱

24.哮喘冷哮证的治法宜选用

25.哮喘热哮证的治法宜选用

(26~27 题共用备选答案)

- A.射干麻黄汤
- B.定喘汤
- C.小青龙汤加石膏汤
- D.三子养亲汤
- E.平喘固本汤

26.热哮证的代表方剂宜选用

27.寒包热哮证的代表方剂宜选用

四、喘证

1.喘证的病变部位在

- A.心、肺
- B.肺、肾
- C.心、肾
- D.脾、肾
- E.肺、脾



配套名师高清视频

2.患者,男,42岁。喘逆上气,咳痰不爽,痰质稠、色黄,恶寒、身热,无汗,舌红苔黄,脉浮滑而数。治疗应首选

- A.麻杏石甘汤
- B.黄连解毒汤
- C.清金化痰汤
- D.银翘散
- E.桑白皮汤

3.患者,男,70岁。喘促气短,声低气怯,咳声低弱,咳痰稀白,自汗畏风,舌淡红苔薄白,脉弱无力。治疗应首选

- A.三子养亲汤合二陈汤
- B.生脉散合补肺汤
- C.七味都气丸合生脉散
- D.参蛤散合金匱肾气丸

E.苏子降气汤合二陈汤
(4~5 题共用备选答案)

- A.桑白皮汤
- B.麻杏石甘汤
- C.苏子降气汤
- D.定喘汤
- E.泻白散

4.治疗热哮发作期,应首选

5.治疗喘证痰热郁肺证,应首选

6.喘证表寒肺热型的代表方剂是

- A.射干麻黄汤
- B.桑白皮汤
- C.小青龙汤
- D.葶苈大枣泻肺汤
- E.麻杏石甘汤

7.实喘的治疗原则是

- A.化痰平喘
- B.降气化痰
- C.降气平喘
- D.祛邪利气
- E.宣肺平喘

8.五磨饮子适用于哪一证型的喘证

- A.上实下虚证
- B.痰浊阻肺证
- C.肺气郁痹证
- D.表寒里热证
- E.痰热郁肺证

9.喘脱危象,宜急服

- A.紫金丹
- B.参附汤送服黑锡丹
- C.苏子降气汤
- D.控涎丹
- E.回阳急救汤

10.清热化痰,宣肺平喘用于喘证的证型是

- A.肺气郁闭
- B.表寒里热
- C.痰热郁肺
- D.痰浊阻肺

E. 风寒袭肺

11. 喘证肾虚不纳证不宜选用

A. 金匱肾气丸

B. 参蛤散

C. 生脉散

D. 七味都气丸

E. 定喘汤

12. 喘脱的病机为

A. 心气欲竭, 脾肾阳衰

B. 心气欲竭, 肺肾阳衰

C. 肾气欲竭, 心肺阳衰

D. 肺气欲竭, 肝肾阳衰

E. 肺气欲竭, 心肾阳衰

13. 患者, 男, 65 岁。咳喘多年, 入冬加重, 痰多色白, 胸闷如塞, 腰膝酸冷, 动则心悸汗出, 苔白腻, 舌体略胖, 脉沉细而滑。其病机为

A. 痰浊阻肺

B. 寒饮伏肺

C. 肺肾气虚

D. 上盛下虚

E. 肾不纳气

14. 喘证持续不已的病位在

A. 心

B. 肺

C. 脾

D. 肾

E. 肝

15. 患者, 女, 73 岁。久喘之人, 出现喘促短气, 气怯声低, 喉有鼾声, 咳声低弱, 痰吐稀薄, 自汗畏风, 舌淡脉弱。治法用

A. 益气养血

B. 补肺益气

C. 补脾益肺

D. 益气健脾

E. 益气固表

16. 患者, 女, 21 岁。3 日前不慎感寒后出现喘逆上气, 胸胀而痛, 鼻扇, 咳吐黄稠痰, 恶寒无汗, 身痛口渴, 苔黄质红, 脉浮数。

应诊断为

A. 风热型咳嗽

B. 痰热型咳嗽

C. 痰热郁肺型喘证

D. 表寒里热型喘证

E. 热哮

17. 喘证每遇情志刺激而诱发首选方药

A. 柴胡疏肝散

B. 逍遥散

C. 五磨饮子

D. 四磨汤

E. 四七汤

18. 患者, 男, 77 岁。喘促日久, 动则喘甚, 呼多吸少, 气不得续, 形瘦神疲, 跗肿, 汗出肢冷, 面青唇紫, 舌淡苔白脉沉弱。此时应当选用的方剂是

A. 十全大补丸

B. 左归丸

C. 右归丸

D. 金匱肾气丸

E. 六味地黄丸

19. 对于虚喘的治疗应当重视

A. 治肺

B. 治脾

C. 治心

D. 治肝

E. 治肾

(20~21 题共用备选答案)

A. 风寒壅肺证

B. 表寒肺热证

C. 痰热郁肺证

D. 痰浊阻肺证

E. 肺气郁闭证

20. 喘息咳逆, 呼吸急促, 胸部胀闷, 痰多稀薄而带泡沫, 色白质黏, 常有头痛, 恶寒, 或有发热, 口不渴, 无汗, 苔薄白而滑, 脉浮紧。证属

21. 喘而胸满闷塞, 甚则胸盈仰息, 咳嗽, 痰多黏腻色白, 咯吐不利, 兼有呕恶, 食少,

口黏不渴,舌苔白腻,脉象滑或濡。证属

(22~23 题共用备选答案)

- A.解表清里,化痰平喘
- B.清热化痰,宣肺平喘
- C.清热宣肺平喘
- D.扶阳固脱,镇摄肾气
- E.补肾纳气,宣肺平喘

22.喘证痰热郁肺证的治法宜选用

23.喘证正虚喘脱证的治法宜选用

(24~25 题共用备选答案)

- A.桑白皮汤
- B.七味都气丸
- C.麻杏石甘汤
- D.麻黄汤
- E.小青龙汤

24.喘证风寒壅肺证的代表方剂宜首选

25.喘证寒饮伏肺,复感外寒而引发者宜选用

五、肺痈

1.患者,男,32岁。素日嗜酒,外出着凉后,始见时时振寒,发热,继而壮热汗出,烦躁不宁,咳嗽气急,咳吐腥臭浊痰,胸满作痛,口干苦,便秘,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗应首选

- A.清金化痰汤
- B.《千金》苇茎汤
- C.桑白皮汤
- D.加味泻白散
- E.《济生》桔梗汤

2.肺病患者,咳吐大量脓血痰,气味腥臭异常,舌红苔黄腻,脉滑数。其病期是

- A.初期
- B.成痈期
- C.溃脓期
- D.恢复期
- E.慢性期

3.肺病患者,壮热面赤,咳嗽气急,咯痰腥臭,痰色黄绿,口渴。其治法是

- A.清肺化痰活血

- B.排脓解毒
- C.养阴清肺解毒
- D.清肺化痰消痈
- E.清热解毒化痰

4.患者咳吐大量脓血痰,腥臭异常,胸中烦满而痛,气喘不能卧,身热,烦渴,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗应首选

- A.加味桔梗汤
- B.《千金》苇茎汤
- C.如金解毒散
- D.桔梗杏仁煎
- E.桑白皮汤

5.肺痈之病名最早见于下列哪本书

- A.《素问》
- B.《医门法律》
- C.《备急千金要方》
- D.《杂病源流犀烛》
- E.《金匱要略》

6.患者,男,27岁。近3天以来,阵寒,继而壮热,咳嗽气急,咳吐黄绿色浊痰,腥臭味,胸痛不得转侧,口干咽燥,苔黄腻,脉滑数。此属何证

- A.外感发热
- B.痰热咳嗽
- C.肺痈
- D.胸痹
- E.喘证

7.肺痈成痈化脓的病理基础,主要在于

- A.痰热壅盛
- B.热壅血瘀
- C.血脉瘀滞
- D.热伤血脉
- E.气滞血瘀

8.最早创用苇茎汤治疗肺痈的是

- A.《金匱要略》
- B.《杂病源流犀烛》
- C.《备急千金要方》
- D.《外科正宗》
- E.《医宗金鉴》

9. 加味桔梗汤用于治疗下列何证

- A. 肺胀痰热壅肺
- B. 肺痈成痈期
- C. 咳嗽痰热郁肺
- D. 实喘痰热郁肺
- E. 肺痈溃脓期

10. 肺病的治疗原则是

- A. 清热解毒, 凉血止血
- B. 清热解毒, 化瘀排脓
- C. 清热解毒, 肃肺化痰
- D. 清热解毒, 活血通络
- E. 清热解毒, 宣肺平喘

11. 肺病溃脓期若气虚不能托脓, 可以在辨证用药的基础上加入

- A. 西洋参
- B. 生黄芪
- C. 甘草
- D. 升麻
- E. 薏苡仁

12. 肺病溃脓期的最佳治法是

- A. 清热解毒, 凉血消痈
- B. 清热解毒, 化瘀消痈
- C. 清热解毒, 宣肺排脓
- D. 辛凉解表, 清肺排脓
- E. 清热解毒, 消痈排脓

13. 肺病恢复期的病机是

- A. 痰热与瘀血壅阻肺络, 肉腐血败
- B. 热壅血瘀, 蕴酿成痈
- C. 风热犯表, 内郁于肺
- D. 邪去正虚, 阴伤气耗
- E. 痰热阻肺, 肺气上逆

14. 肺病恢复期的治法是

- A. 益气养阴
- B. 清肺化痰
- C. 清养补肺
- D. 排脓解毒
- E. 养阴清肺

15. 患者, 男, 26 岁, 农民。患者发热恶寒, 咳嗽, 咯白色黏痰, 痰量由少渐多, 胸痛

剧烈, 呼吸不利, 舌苔薄黄, 脉浮滑数。此证应诊断为

- A. 风热咳嗽
- B. 痰热咳嗽
- C. 肺痈成痈期
- D. 肺痈初期
- E. 肺痈恢复期

16. 肺病诊断的要点是

- A. 咳嗽
- B. 胸痛
- C. 咳吐腥臭脓痰
- D. 干咳
- E. 脉滑数

(17~18 题共用备选答案)

- A. 千金苇茎汤合如金解毒散
- B. 银翘散
- C. 葶苈大枣泻肺汤
- D. 沙参麦冬汤或桔梗杏仁煎
- E. 加味桔梗汤

17. 肺病初期应选

18. 肺病成痈期应选

(19~20 题共用备选答案)

- A. 益气养阴, 排脓解毒
- B. 清肺解毒, 化瘀消痈
- C. 益气养阴清热
- D. 疏风散热, 清肺化痰
- E. 清热解毒, 排脓消痈

19. 肺病初期, 治法应为

20. 肺病成痈期, 治法应为

六、肺癆

1. 肺癆的外在致病因素是

- A. 燥邪
- B. 瘵虫
- C. 痰浊
- D. 瘀血
- E. 水饮

2. 患者, 男, 27 岁。干咳少痰, 咳声短促, 痰中带血, 五心烦热, 时有盗汗, 形体消瘦, 胸部闷痛隐隐, 舌红少苔, 脉细数。其诊

断是

- A.咳嗽肺阴亏耗证
- B.肺癆肺阴亏损证
- C.哮证肺虚证
- D.喘证肺虚证
- E.虚劳肺阴虚证

3.患者干咳少痰,痰中带血,潮热盗汗,胸闷隐痛,身体逐渐消瘦,口燥咽干,舌红少苔,脉细数。其诊断是

- A.肺癆
- B.肺痿
- C.咳血
- D.虚劳
- E.肺胀

4.患者,男,42岁。症见:咳嗽咳痰,痰中带血,五心烦热,潮热盗汗,阳痿,脉虚大无力,治疗方剂应当首选

- A.补天大造丸
- B.大补阴丸
- C.鳖甲煎丸
- D.月华丸
- E.百合固金汤

5.肺癆的治疗原则是

- A.益气滋阴,抗癆杀虫
- B.补虚培元,抗癆杀虫
- C.阴阳双补,抗癆杀虫
- D.滋阴降火,抗癆杀虫
- E.清热凉血,抗癆杀虫

6.患者,女,23岁。症见:咳嗽咳痰,痰中夹有血丝,五心烦热,脉细。治疗应首选的方剂是

- A.十全大补丸
- B.百合固金汤
- C.月华丸
- D.二至丸
- E.大补阴丸

7.百合固金汤合秦艽鳖甲散适用于治疗肺癆的哪种证型

- A.肺阴亏虚
- B.虚火灼肺
- C.气阴耗伤
- D.阴阳两虚
- E.肺肾亏虚

第二章

心系病证

1. 治疗心悸心阳不振证, 应首选

- A. 温胆汤
- B. 二陈汤
- C. 苓桂术甘汤
- D. 金匱肾气丸
- E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤 配套名师高清视频



2. 患者, 男, 35 岁, 心悸不宁, 头晕目眩, 手足心热, 耳鸣腰酸, 舌红少苔, 脉细数。其证候是

- A. 心血不足
- B. 心虚胆怯
- C. 心阴亏虚
- D. 阴虚火旺
- E. 心火内盛

3. 患者, 女, 40 岁。平素善惊易恐, 因受惊而心悸 1 个月余, 坐卧不安, 少寐多梦, 舌苔薄白, 脉虚弦。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 炙甘草汤
- C. 朱砂安神丸
- D. 天王补心丹
- E. 安神定志丸

4. 胸痹的主要病机为

- A. 气滞血瘀
- B. 寒凝气滞
- C. 痰瘀交阻
- D. 阳气虚衰
- E. 心脉痹阻



配套名师高清视频

5. 治疗胸痹心血瘀阻证的代表方剂是

- A. 生脉饮
- B. 瓜蒌薤白白酒汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 瓜蒌薤白半夏汤

E. 苏合香丸

6. 患者胸闷气短, 甚则胸痛彻背, 心悸汗出, 腰酸乏力, 畏寒肢冷, 唇甲淡白, 舌淡白, 脉沉微欲绝。治疗应首选

- A. 参附汤合右归饮
- B. 人参养营汤合左归饮
- C. 炙甘草汤合生脉散
- D. 苓桂术甘汤合左归丸
- E. 苏合香丸合左归饮

7. 患者, 男, 60 岁。胸闷疼痛, 痰多气短, 肢体沉重, 形体肥胖, 倦怠乏力, 纳呆便溏, 苔浊腻, 脉滑。治疗应首选

- A. 瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
- B. 枳实薤白桂枝汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 瓜蒌薤白白酒汤
- E. 柴胡疏肝散

8. 治疗不寐痰热内扰证, 应首选

- A. 温胆汤
- B. 朱砂安神丸
- C. 安神定志丸
- D. 黄连阿胶汤
- E. 甘麦大枣汤

9. 患者不易入睡, 多梦易醒, 心悸健忘, 神疲食少, 伴头晕目眩, 四肢倦怠, 舌淡苔薄, 脉细无力。治疗应首选

- A. 酸枣仁汤
- B. 归脾汤
- C. 交泰丸
- D. 天王补心丹
- E. 安神定志丸

10. 《金匱要略》治疗心悸的常用方剂为

A. 小青龙汤

- B.归脾汤
- C.桂枝汤
- D.炙甘草汤
- E.天王补心丹

11.心悸心虚胆怯证的治法为

- A.振奋心阳,宁心安神
- B.补血养心,益气安神
- C.滋阴清火,养心安神
- D.温补心阳,安神定悸
- E.镇惊定志,养心安神

12.心悸心虚胆怯证的代表方剂是

- A.天王补心丹合朱砂安神丸
- B.归脾汤
- C.安神定志丸
- D.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤
- E.黄连温胆汤

13.心悸心血不足证的治法为

- A.镇惊定志,养心安神
- B.补血养心,益气安神
- C.滋阴清火,养心安神
- D.温补心阳,安神定悸
- E.振奋心阳,宁心安神

14.心悸心血不足证的代表方剂是

- A.安神定志丸
- B.归脾汤
- C.天王补心丹合朱砂安神丸
- D.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤
- E.黄连温胆汤

15.患者,女,34岁。经常症见心悸心慌,善惊易怒,坐卧不安,治疗方剂应当首选

- A.温胆汤
- B.天王补心丹
- C.桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- D.苓桂术甘汤
- E.安神定志丸

16.患者,男,57岁。形体肥胖,半月以来心悸善惊,烦躁痰多,食少泛恶,舌苔黄腻,脉象滑数。此病例应辨证为

- A.水饮凌心

- B.痰火扰心
- C.心阳不振
- D.阴虚火旺
- E.心胆虚怯

17.患者,男,69岁。近日来心中悸动不安,头眩,畏寒肢冷,下肢浮肿,渴不欲饮,恶心吐涎,舌质淡胖苔水滑,脉弦。治疗方法宜选

- A.健脾化湿,安神定悸
- B.温补心阳,安神定悸
- C.补血养心,益气安神
- D.振奋心阳,化气行水
- E.清热化痰,以安心神

18.患者,女,21岁。平素胆怯,两日前受到惊吓后,常有心悸不安,善惊易恐,晚间多梦,舌苔薄白,脉象弦。该患者辨证当属

- A.心虚胆怯
- B.心阳不足
- C.阴虚火旺
- D.肝火上炎
- E.水饮凌心

19.患者,男,58岁。一年前曾患有“急性广泛前壁心肌梗死”,近日心悸不安,胸闷气短,四肢发凉,面色苍白,舌淡苔白,脉象沉弱。此病治疗应当

- A.温阳行水
- B.补血养心
- C.滋阴补肾
- D.温补心阳
- E.健脾益气

20.在下列各项中,不属于胸痹寒凝心脉证症状的是

- A.心痛如绞,心痛彻背
- B.气候骤冷发病或加重
- C.欲太息,暴怒加重
- D.手足不温,冷汗自出
- E.舌苔薄白,脉沉紧

21.以下哪个医家用失笑散及大剂量的红花、降香治疗胸痹心痛

- A.清代王清任
- B.汉代张仲景
- C.元代危亦林
- D.唐代孙思邈
- E.明代王肯堂

22. 阴寒极盛的胸痹,宜选用的方剂是

- A.乌头赤石脂丸
- B.血府逐瘀汤
- C.冠心苏合丸
- D.瓜蒌薤白半夏汤
- E.天王补心丹

23. 胸痹发作期以标实表现为主,其中最常见的是

- A.水饮
- B.气滞
- C.瘀血
- D.寒凝
- E.火毒

24. 胸痹实邪不包括

- A.瘀血
- B.寒凝
- C.痰浊
- D.湿邪
- E.气滞

25. 患者,男,52岁。既往有“冠心病”病史,正值冬季发病,症见心痛如绞,四肢不温,冷汗出,心悸气短,舌薄白,脉沉紧。其治法应为

- A.温振心阳,补益心气
- B.疏调气机,和血舒脉
- C.通阳泄浊,豁痰开窍
- D.活血化瘀,通脉止痛
- E.辛温散寒,宣通心阳

26. 患者,男,56岁。左胸闷痛3年,近来伴有气短喘促,咳嗽,痰多黏腻色白,苔白腻,脉滑。其最佳治疗方剂应当是

- A.瓜蒌薤白半夏汤
- B.瓜蒌薤白白酒汤
- C.半夏白术天麻汤

D.血府逐瘀汤

E.柴胡疏肝散

27. 患者,女,58岁。既往有“冠心病”病史半年,昨日与邻居发生口角后,自觉心痛阵作,痛无定处,脘腹胀闷,暖气较舒,舌苔白,脉细弦。治疗方剂宜选用

- A.当归四逆散
- B.丹栀逍遥丸
- C.柴胡疏肝散
- D.甘麦大枣汤
- E.瓜蒌薤白半夏汤

28. 患者,男,67岁。因胸闷痛反复发作5年,近日加重,现胸闷如窒,气短喘促,肢体沉重,头晕沉如裹,咯白痰,苔腻,脉沉滑。其中医辨证应为

- A.寒凝心脉
- B.痰浊闭阻
- C.气滞心胸
- D.痰热中阻
- E.心脾两虚

29. 患者,男性,60岁。胸闷痛反复发作10年,加重半小时,现胸闷痛彻背,心慌,大汗出,四肢厥冷,面色唇甲青紫,脉沉微欲绝。此时其辨证分型为

- A.气阴两虚
- B.阴寒凝滞
- C.胸阳虚衰
- D.心阳欲脱
- E.心肾阳虚

30. 失眠患者症见心烦,心悸,梦遗失精者,加用肉桂的目的是

- A.温补肾阳
- B.健脾和胃
- C.温经散寒
- D.温通心阳
- E.引火归原

31. 产后虚烦不寐,体瘦面白或老人夜寐早醒而无虚烦证,均可应用

- A.归脾汤合酸枣仁汤

- B.半夏秫米汤
- C.黄连阿胶汤
- D.安神定志丸
- E.六味地黄丸

32. 治疗心悸、失眠时,天王补心丹最适用于治疗

- A.阴虚火旺
- B.痰火扰心
- C.心火炽盛
- D.心胆气虚
- E.心阴不足

33. 不寐痰热扰心,宜选

- A.礞石滚痰丸
- B.黄连温胆汤
- C.半夏秫米汤
- D.朱砂安神丸
- E.酸枣仁汤

34. 患者,女,28岁。症见入睡困难3个月,多梦,胸闷胁胀,急躁易怒,伴头昏头胀,口干口苦,小便短赤,舌红苔黄,脉弦数。治疗方剂应当选用

- A.泻心汤
- B.滋水清肝饮
- C.礞石滚痰丸
- D.当归龙荟丸
- E.龙胆泻肝汤

35. 患者,女,48岁。近一年来精神紧张,经常失眠,伴心烦,心悸不安,头晕,耳鸣,健忘,口干咽燥,手足心热,舌质红,脉细数。其辨证为

- A.心胆气虚
- B.心肾不交
- C.肝火扰心

- D.心火偏亢
- E.痰热扰心

36. 患者,女,17岁。半年来因要参加考试,学习紧张,思想压力较大,晚上经常难以入眠,伴心悸健忘,四肢倦怠,饮食乏味,面色少华,舌质淡,脉细弱。其辨证为

- A.心胆气虚
- B.心脾两虚
- C.阴虚火旺
- D.忧郁伤神
- E.痰气郁结

37. 患者,男,40岁。因失眠多梦半月,前来就诊。现症见夜难入眠,兼头重如裹,胸脘满闷,心烦口苦,头晕目眩,痰多质黏,大便不爽,舌红苔黄腻,脉滑。其治法为

- A.疏肝泻热,佐以安神
- B.补养心脾,以生气血
- C.化痰清热,和中安神
- D.化痰理气,宁心安神
- E.滋阴降火,养心安神

(38~39题共用备选答案)

- A.安神定志丸
- B.半夏秫米汤
- C.龙胆泻肝汤
- D.保和丸
- E.天王补心丸

38. 不寐多梦,甚则彻夜不眠,急躁易怒,目赤耳鸣,口干而苦,便秘溲赤,舌红苔黄,脉弦数,应当选用

39. 虚烦不寐,触事易惊,终日惕惕,胆怯心悸,舌淡,脉弦细,应当选用

第三章

脑系病证

一、头痛

1. 患者,男,35岁。头痛痛连项背,恶风畏寒,口不渴,苔薄白,脉浮紧。治疗应首选

- A. 栝楼桂枝汤
- B. 川芎茶调散
- C. 葛根汤
- D. 防风汤
- E. 增液汤



配套名师高清视频

2. 患者,男,45岁。头痛经久不愈,痛处固定不移,刺痛,舌紫暗,脉涩。治疗应首选

- A. 川芎茶调散
- B. 芎芷石膏汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 通窍活血汤
- E. 天麻钩藤饮

3. 患者,女,50岁。头痛昏蒙,胸脘满闷,纳呆呕恶,舌苔白腻,脉弦滑。治疗应首选

- A. 羌活胜湿汤
- B. 半夏白术天麻汤
- C. 川芎茶调散
- D. 半夏厚朴汤
- E. 苓桂术甘汤

4. 头痛牵引项背多属

- A. 太阳经头痛
- B. 厥阴经头痛
- C. 少阳经头痛
- D. 阳明经头痛
- E. 少阴经头痛

5. 痰浊头痛的特征是

- A. 头痛如裹
- B. 头痛如裂
- C. 头痛且空

D. 头痛且晕

E. 头痛昏蒙

6. 厥阴经头痛的部位是

- A. 头后部及两侧
- B. 枕部及项部
- C. 前额部及眉棱处
- D. 头网侧及耳部
- E. 巅顶或连于目系

7. 内伤头痛的发生,与下列哪些脏腑关系密切:

- A. 心、脾、肾
- B. 肺、胃、肾
- C. 心、肺、肾
- D. 心、肝、肾
- E. 肝、脾、肾

(8~11题共用备选答案)

- A. 黄芩、蔓荆子
- B. 柴胡、川芎
- C. 吴萸、藁本
- D. 葛根、白芷
- E. 羌活、川芎

8. 太阳经的引经药为

9. 阳明经的引经药为

10. 少阳经的引经药为

11. 厥阴经的引经药为

二、眩晕

1. 下列讨论眩晕病机的主张,哪一条是《丹溪心法》提出的

- A. 无火不作眩
- B. 无虚不作眩
- C. 无痰不作眩
- D. 无风不作眩
- E. 无瘀不作眩

2.“无痰不作眩”，出自的医著是

- A.《素问·六元正纪大论》
- B.《金匱要略》
- C.《丹溪心法》
- D.《景岳全书》
- E.《医学正传》

3.患者眩晕，头重如蒙，胸闷恶心，食少寐多，舌苔白腻，脉滑。治疗应首选

- A.苓桂术甘汤
- B.半夏白术天麻汤
- C.黄连温胆汤
- D.半夏厚朴汤
- E.半夏秫米汤

4.患者眩晕，动则加剧，劳则即发，面色白，唇甲不华，心悸少寐，神疲懒言，饮食减少，舌质淡，脉细弱。其治法是

- A.健脾益气，益肾温中
- B.温补脾肾，通络宁心
- C.健脾益肾，活血化痰
- D.补益肝肾，化痰通络
- E.补养气血，健运脾胃

5.患者眩晕，精神萎靡，健忘多梦，腰膝酸软，四肢不温，形寒怯冷，舌质淡，脉沉细无力。治疗应首选

- A.左归丸
- B.右归丸
- C.大定风珠
- D.大补元煎
- E.附子理中丸

6.眩晕而见精神萎靡，少寐多梦，健忘，腰膝酸软，遗精耳鸣，五心烦热，舌质红，脉弦细数。选方宜

- A.天麻钩藤饮
- B.归脾汤
- C.左归丸
- D.右归丸
- E.以上都不是

7.下列哪项不是眩晕的病因

- A.肝风

- B.淤血
- C.外感
- D.气虚
- E.痰湿

8.治疗眩晕痰浊中阻证，应首选

- A.天麻钩藤饮
- B.半夏白术天麻汤
- C.镇肝息风汤
- D.补阳还五汤
- E.地黄饮子

9.患者眩晕头痛头胀，心烦口苦，渴不多饮，舌红苔黄腻，脉滑数。证属

- A.痰浊中阻
- B.肝阳上亢
- C.瘀血阻窍
- D.痰郁化火
- E.阴虚阳亢

三、中风

1.中风之发生，病理复杂，其根本在于

- A.气逆血滞
- B.肝火心火
- C.风痰湿痰
- D.肝肾阴虚
- E.肝风外风



配套名师高清视频

2.中风的病理因素是

- A.风火痰瘀
- B.气血逆乱
- C.心肝火旺
- D.肝阳上亢
- E.肝肾阴虚

3.中风之中脏腑与中经络的鉴别要点是

- A.神志不清
- B.半身不遂
- C.语言不利
- D.肢体软瘫
- E.口舌歪斜

4.患者突然昏仆，不省人事，肢体软瘫，目合口张，鼻鼾息微，手撒肢冷，汗多，二便自遗，舌痿，脉微欲绝。其中风属

- A. 中经络
- B. 阳闭证
- C. 阴闭证
- D. 脱证
- E. 后遗症

5. 患者平素头痛眩晕, 突发半身不遂, 口舌歪斜, 舌强语謇, 口苦, 尿赤便干, 舌红苔黄, 脉弦。治疗应首选

- A. 大秦苕汤
- B. 补阳还五汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 苏合香丸
- E. 地黄饮子

6. 下列除哪项外, 均是中风闭证的特点

- A. 突然昏仆
- B. 牙关紧闭
- C. 口噤不开
- D. 肢体强痉
- E. 尿便自遗

7. 下列哪项不是辨别中风闭证和脱证的依据

- A. 口开目合和口噤不开
- B. 手撒肢冷和两手握固
- C. 二便自遗和大小便闭
- D. 躁动不安和静卧不烦
- E. 肢体软瘫和肢体强痉

8. 患者, 男, 78 岁。素体丰盛, 眩晕常作, 近日眩晕加重, 头胀痛, 烦躁, 神志清楚, 面色潮红, 手足有轻微震颤, 舌红少苔, 脉弦。首先应考虑

- A. 眩晕
- B. 风中经络
- C. 肝阳头痛
- D. 中风先兆
- E. 中风阳闭

9. 治疗中风恢复期之风痰瘀阻证, 应首选

- A. 局方至宝丹
- B. 参附汤
- C. 解语丹

- D. 镇肝息风汤
- E. 补阳还五汤

10. 平素头晕头痛, 耳鸣目眩, 突然口眼喎斜, 舌强语謇, 舌质红苔黄, 脉弦。证属

- A. 中经络之风痰入络
- B. 中经络之风阳上扰
- C. 中经络之阴虚风动
- D. 风痰瘀阻
- E. 痰浊瘀闭

11. 治疗中风后遗症半身不遂, 气虚血瘀证, 治疗应选用

- A. 天麻钩藤饮
- B. 半夏白术天麻汤
- C. 镇肝息风汤
- D. 补阳还五汤
- E. 局方至宝丹

12. 患者平素头晕头痛, 突然昏倒, 不省人事, 有半侧身体不遂, 牙关紧闭, 面红身热, 舌红苔黄腻, 脉弦滑数。其诊断是

- A. 中风(中经络之络脉空虚风邪入中)
- B. 中风(中经络之肝肾阴虚风阳上扰)
- C. 中风(中脏腑闭证之阳闭)
- D. 中风(中脏腑闭证之阴闭)
- E. 中风(中脏腑脱证)

(13~14 题共用备选答案)

- A. 天麻钩藤饮
- B. 羚角钩藤汤
- C. 补阳还五汤
- D. 地黄饮子
- E. 牵正散

13. 中风后半身不遂首选

14. 中风后遗症失语首选

四、癫狂

1. 狂证火盛伤阴证, 其治法是

- A. 活血化瘀, 涤痰镇静
- B. 安神定志, 祛痰降火
- C. 降火豁痰, 安神宁心
- D. 镇心涤痰, 泻肝清火
- E. 育阴潜阳, 交通心肾



配套名师高清视频

2. 治疗狂证痰热瘀结证, 应首选

- A. 顺气导痰汤
- B. 越鞠丸
- C. 生铁落饮
- D. 琥珀养心丹
- E. 癫狂梦醒汤

3. 下列各项, 与癫狂发病无关的病因病机是

- A. 阴阳失调
- B. 情志抑郁
- C. 痰气上扰
- D. 气血凝滞
- E. 外感风寒

4. 治疗痰气郁结之癫证, 应首选

- A. 癫狂梦醒汤
- B. 二阴煎
- C. 顺气导痰汤
- D. 柴胡疏肝散
- E. 生铁落饮

(5~6 题共用备选答案)

- A. 生铁落饮
- B. 当归龙荟丸
- C. 柴胡疏肝散
- D. 丹栀逍遥散
- E. 朱砂安神丸

5. 狂证属于肝胆火热偏盛者, 治疗应首选

6. 郁证属于肝郁化火者, 治疗应首选

(7~8 题共用备选答案)

- A. 癫证
- B. 狂证
- C. 痫证
- D. 痉证
- E. 中风

7. 患者喧扰不宁, 躁妄打骂, 动而多怒。其诊断是

8. 患者沉默痴呆, 语无伦次, 静而多喜。其诊断是

9. 癫证的治疗应以下列哪项为主

- A. 清心泻火, 涤痰醒神
- B. 理气化痰, 活血化瘀
- C. 理气解郁, 化痰醒神
- D. 镇心祛痰, 安神定志
- E. 健脾养心, 益气安神

五、痫病

1. 患者突然仆倒, 昏不知人, 口吐白沫, 四肢抽搐, 口中喊叫, 无口眼歪斜及半身不遂。其诊断是

- A. 中风
- B. 痉证
- C. 痫证
- D. 厥证
- E. 眩晕

2. 患者突然跌倒, 神志不清, 口吐涎沫, 两目上视, 四肢抽搐, 口中如作猪羊叫声, 移时苏醒, 舌苔白腻, 脉弦滑。治疗应首选

- A. 定痫丸
- B. 导痰汤
- C. 二阴煎
- D. 涤痰汤
- E. 控涎丹

3. 患者, 女, 28 岁。平日情绪急躁, 心烦失眠, 口苦而干, 便秘, 突发昏仆抽搐, 尖叫吐涎, 牙关紧闭, 舌红苔黄腻, 脉弦滑数。治疗应首选

- A. 定痫丸
 - B. 六君子汤
 - C. 大补元煎
 - D. 甘麦大枣汤
 - E. 龙胆泻肝汤合涤痰汤
- (4~5 题共用备选答案)

- A. 七福饮
- B. 还少丹
- C. 转呆丹
- D. 知柏地黄丸
- E. 河车大造丸

4. 治疗痴呆髓海不足证, 应首选

5. 治疗痴呆脾肾两虚证, 应首选

(6~7 题共用备选答案)

- A. 风痰闭阻证
- B. 痰火扰神证
- C. 瘀阻脑络证
- D. 心脾两虚证
- E. 心肾亏虚证

6. 发病前常有眩晕、头昏、胸闷、乏力痰多, 见突然跌倒, 神志不清, 抽搐吐涎, 或伴尖叫与二便失禁, 舌质红, 苔白腻, 脉多弦滑有力。证属

7. 发作时昏仆抽搐, 吐涎或有吼叫, 心烦失眠, 咯痰不爽, 口苦咽干, 便秘溲黄, 彻夜难眠, 目赤, 舌红苔黄腻, 脉弦滑而数。证属

(8~9 题共用备选答案)

- A. 痫病
- B. 中风
- C. 厥证
- D. 痉证
- E. 痿证

8. 突然仆倒, 昏迷时间长, 醒后常有半身不遂。中医诊断为

9. 突然仆倒, 两目上视, 四肢抽搐, 口吐涎沫。中医诊断为

10. 患者, 女, 35 岁。有病证病史 15 年。近 1 年多来, 病证发作日益频繁, 自觉发作后神疲乏力, 平素头晕目眩, 心悸, 失眠多梦, 面色苍白, 体瘦纳呆, 大便溏薄, 舌苔腻, 脉沉而弱。该病例中医治法当为

- A. 补益气血, 健脾宁心
- B. 补益心肾, 健脾化痰
- C. 健脾补肾, 健脑宁神
- D. 平肝健脾, 补肾宁神
- E. 平肝息风, 健脾补肾

11. 在病病发病中最为重要的病邪是

- A. 火邪
- B. 湿邪
- C. 痰邪
- D. 热邪
- E. 寒邪

12. 病病发病的病机关键是

- A. 元神失控
- B. 气血逆乱
- C. 清窍蒙蔽
- D. 脏腑功能失调
- E. 肝阳上亢

13. 病病风痰闭阻证的代表方剂是

- A. 天麻钩藤饮
- B. 滚痰丸
- C. 顺气导痰汤
- D. 定痫丸
- E. 二陈汤

14. 病病瘀阻脑络证的治法是

- A. 理气化痰, 活血化痰
- B. 行气解郁, 化痰通络
- C. 活血化瘀, 息风通络
- D. 活血化瘀, 开窍醒神
- E. 理气化痰, 醒脑通窍

15. 患者, 男, 21 岁。有病证病史近 10 年。平素患者性急易怒, 心烦失眠, 夜梦纷纭, 发则昏不知人, 四肢抽动, 喉中痰鸣, 口吐涎沫, 舌红, 苔黄腻, 脉弦滑数。该病例中医辨证当为

- A. 风痰闭阻
- B. 心火扰动
- C. 痰火扰神
- D. 气逆痰阻
- E. 湿热阻滞

16. 病病七情失调主要责之于

- A. 喜
- B. 怒
- C. 悲忧
- D. 思
- E. 惊恐

17. 病病与五脏均有联系, 但最主要责之于

- A. 心脾
- B. 心肝
- C. 心肾

D.心肺

E.肝肾

18. 痲病心肾亏虚证的代表方剂为天王补心丹合

A.左归丸

B.右归丸

C.八珍汤

D.左归饮

E.右归饮

19. 患者,男,15岁。因为煤气中毒2月后,突然发生昏仆,肢体抽搐,口吐涎沫,约5分钟后神志转清,自述疲乏无力,查看舌苔白腻,脉象弦滑。此时的中医诊断应为

A.厥证

B.痫证

C.中风

D.痉证

E.郁证

第四章

脾胃病证

一、胃痛

(1~2 题共用备选答案)

- A. 健脾化湿
- B. 温中健脾
- C. 温中补肾
- D. 散寒止痛
- E. 散寒除湿



配套名师高清视频

1. 胃痛暴作,畏寒喜暖。脘腹得温则痛减,口不渴,喜热饮,舌苔薄白,脉弦紧。治法是

2. 胃痛隐隐,喜温喜按,空腹痛甚,得食痛减,泛吐清水,神疲乏力,大便溏薄,舌淡苔白,脉迟缓。其治法是

3. 阴虚胃痛的主要病机是

- A. 胃失温养
- B. 胃失濡养
- C. 气机不畅
- D. 胃腑积滞
- E. 瘀血内停

4. 外邪犯胃的胃痛最为常见的病邪是

- A. 风邪
- B. 暑邪
- C. 寒邪
- D. 湿邪
- E. 热邪

5. 载有“古方九种心痛详其所由。皆在胃脘,而实不在于心也”。此语出自

- A. 《医学入门》
- B. 《医学真传》
- C. 《医学正传》
- D. 《医学心悟》
- E. 《医宗必读》

6. 患者,男,28岁。近2天因恼怒后出

现胃脘胀痛,攻窜不定,暖气频作,大便不畅,舌苔薄白,脉弦。此时辨证属于

- A. 肝气犯胃
- B. 瘀血停胃
- C. 湿热中阻
- D. 饮食伤胃
- E. 寒邪客胃

7. 患者,男性,41岁。胃脘疼痛日久,疼痛有定处而拒按,食后痛甚,舌质紫暗,脉涩。此时辨证为

- A. 肝气犯胃
- B. 湿热中阻
- C. 瘀血停胃
- D. 饮食伤胃
- E. 脾胃虚寒

8. 患者,男,40岁。因胃脘胀满,攻撑作痛,脘痛连胁,暖气频繁,大便不畅,每因情志因素而痛作,苔薄白,脉弦。此时辨证属于

- A. 肝气犯胃
- B. 肝胃郁热
- C. 瘀血停滞
- D. 饮食停滞
- E. 脾胃气虚

(9~10 题共用备选答案)

- A. 寒邪客胃证
- B. 饮食伤胃证
- C. 肝气犯胃证
- D. 湿热中阻证
- E. 瘀血停胃证

9. 胃脘胀痛,痛连两胁,遇烦恼则痛作或痛甚,暖气、矢气则痛舒,胸闷暖气,喜长叹息,大便不畅,舌苔多薄白,脉弦。证属

10.胃痛暴作,恶寒喜暖,得温痛减,遇寒加重,口淡不渴,或喜热饮,舌淡苔薄白,脉弦紧。证属

11.湿热中阻胃痛的特点是

- A.隐痛
- B.灼痛
- C.胀痛
- D.暴痛
- E.刺痛

12.胃痛瘀血停胃证的疼痛特点是

- A.隐痛
- B.灼痛
- C.胀痛
- D.暴痛
- E.刺痛

13.胃痛发病的关键病机是

- A.气虚
- B.气怯
- C.气陷
- D.气滞
- E.气逆

14.下列有一项不是阴虚胃痛的主证

- A.胃痛隐隐
- B.口燥咽干
- C.口不渴
- D.舌红少苔
- E.脉弦细

15.患者,男,26岁。时因饮酒饱食后,出现胃脘胀满疼痛,嗝腐吞酸,大便不通,舌苔厚腻,脉滑。治法宜用

- A.疏肝理气,清热泻火
- B.疏肝理气,理气活血
- C.消食导滞,和胃止痛
- D.疏散风寒,消食导滞
- E.以上都不是

16.患者,男,47岁。胃部隐隐作痛,遇寒,饥饿,饮食生冷则疼痛加重,按之则舒,温熨、进食可使疼痛缓解。此时治疗应用何法

- A.温中健脾
- B.养阴益胃
- C.散寒止痛
- D.消食导滞
- E.行气散寒

(17~18题共用备选答案)

- A.柴胡疏肝散加减
- B.清中汤加减
- C.四君子汤
- D.保和丸
- E.黄芪建中汤

17.肝气犯胃型胃痛治宜

18.湿热中阻型胃痛治宜

二、痞满

(1~2题共用备选答案)

- A.枳实导滞丸
- B.保和丸
- C.柴胡疏肝散
- D.二陈平胃散
- E.香砂六君子汤

1.治疗痞满饮食内停证,应首选

2.治疗痞满肝胃不和证,应首选

3.患者脘腹痞塞不舒,胸膈满闷,头晕目眩,身重困倦,呕恶纳呆,口淡不渴,舌苔白厚腻,脉沉滑。治疗应首选

- A.保和丸
- B.泻心汤
- C.二陈平胃汤
- D.越鞠丸
- E.补中益气汤

三、呕吐

1.下列哪项不是痰饮内阻证呕吐的特征

- A.呕吐清水痰涎
- B.脘闷不食
- C.头眩心悸
- D.胸胁疼痛
- E.脉滑

2.患者,女,29岁。外感后突发呕吐,恶寒头痛,胸脘满闷,舌苔白腻,脉濡缓。治疗

应首选

- A.左金丸
- B.白虎汤
- C.小柴胡汤
- D.藿香正气散
- E.龙胆泻肝汤

3.患者,女,51岁。既往有胃病二十余年。每次均因饮食不慎,出现呕吐,时作时止,倦怠乏力,口干不欲饮,四肢不温,大便溏薄,舌质淡,脉濡弱。治疗宜选用的方剂是

- A.理中丸
- B.小半夏汤
- C.苓桂术甘汤
- D.大半夏汤
- E.藿香正气散

4.下列哪一项不是引起呕吐的主要原因

- A.外邪侵袭
- B.湿邪困脾
- C.饮食不节
- D.情志失调
- E.病后体虚

5.下列有一项不是胃阴不足型呕吐的主证

- A.呕吐反复或时作干呕
- B.似饥而不欲食
- C.暖气吞酸
- D.口干咽燥
- E.舌红少津

6.下列有一项不是肝气犯胃型呕吐的主证

- A.呕吐吞酸
- B.暖气频作
- C.胸胁胀满
- D.舌红苔薄
- E.脉沉细

7.治疗胃阴不足呕吐的主方为

- A.麦门冬汤
- B.益胃汤

- C.一贯煎
- D.玉女煎
- E.沙参麦冬汤

8.患者,女,28岁。昨日因受凉,突然出现呕吐,吐胃内容物及清水,伴有恶寒发热,头身疼痛,无汗,口不渴,胸脘满闷,舌苔白腻,脉濡缓。应诊断为

- A.呕吐脾胃虚寒证
- B.呕吐饮食停滞证
- C.呕吐痰饮内停证
- D.呕吐外邪犯胃证
- E.呕吐肝气犯胃证

9.患者,男,38岁,工人。午后突然出现呕吐,呕吐多为清水痰涎,胸闷脘胀,不思饮食,舌淡,苔白腻,脉滑。此时最佳治疗方剂为

- A.香砂六君子汤
- B.小半夏汤合苓桂术甘汤
- C.小半夏加茯苓汤
- D.理中汤
- E.温脾汤

10.下列有一项不是实证呕吐的特点

- A.发病较急
- B.病程较短
- C.多由外邪及饮食所伤而发
- D.有邪实之象
- E.时发时止

11.患者呕吐吞酸,暖气频繁,胸胁胀满,舌边红,苔薄腻,脉弦。治法宜用

- A.消食化滞,和胃降逆
- B.温中化饮,和胃降逆
- C.疏肝理气,和胃止呕
- D.温养脾胃,降逆止呕
- E.清肝泻火,和胃止呕

12.突然呕吐,脘闷不舒,兼见恶寒发热,头身疼痛,舌苔白腻,脉濡缓。主方为

- A.保和丸
- B.小半夏汤
- C.香苏散

- D.平胃散
- E.藿香正气散

13.治疗脾胃气虚呕吐的最佳方剂为

- A.小半夏加茯苓汤
- B.理中汤
- C.旋覆代赭汤
- D.香砂六君子汤
- E.平胃散

14.患者,女,52岁。患胃疾多年,呕吐反复发作,时作干呕,口燥咽干,似饥而不欲食,舌红苔少,脉细数。治法宜选用

- A.舒肝和胃,降逆止呕
- B.滋养胃阴,降逆止呕
- C.温中健脾,和胃降逆
- D.消食导滞,和胃降逆
- E.清肝泻火,和胃止呕

四、腹痛

1.从腹痛的部位辨证,胁痛,少腹疼痛者,多属

- A.肝胆病
- B.虫证
- C.肠痈
- D.胃痛
- E.膀胱病

2.大腹痛者,多属

- A.厥阴肝经病证
- B.膀胱病证
- C.脾胃病证
- D.虫病
- E.肠痈

3.寒邪内阻证腹痛的主要特点是

- A.腹部胀痛,攻窜不定
- B.腹痛绵绵,时痛时止
- C.饥则痛甚,得温稍减
- D.腹痛急暴,得温痛减
- E.腹部刺痛,痛处不移

4.下列有一项不是腹痛的常见病因

- A.外感时邪
- B.饮食不节

- C.情志失调
- D.阳气素虚
- E.它病转移

5.腹痛拒按,大便溏滞不爽,小便短赤,舌红苔黄腻,应辨为

- A.寒邪内阻
- B.湿热壅滞
- C.中虚脏寒
- D.气滞血瘀
- E.饮食积滞

6.寒邪内阻证腹痛的治法是

- A.散寒温里,理气止痛
- B.消食导滞,理气止痛
- C.疏肝解郁,理气止痛
- D.温中补虚,缓急止痛
- E.泄热通腹,行气导滞

7.湿热壅滞,腹痛拒按,治宜

- A.散寒温里,理气止痛
- B.消食导滞,理气止痛
- C.疏肝解郁,理气止痛
- D.温中补虚,缓急止痛
- E.泄热通腑,行气导滞

8.湿热壅滞证腹痛,治疗主方为

- A.小承气汤
- B.大承气汤
- C.甘露消毒丹
- D.龙胆泻肝汤
- E.三仁汤

9.腹痛发生的基本病机是

- A.食滞肠胃,痞塞不通
- B.外邪内传,阻塞气机
- C.肝脾湿热,络脉不和
- D.肝气郁结,胃失和降
- E.脏腑气机阻滞,经脉痹阻

10.下列各项,与腹痛发病无关的经脉是

- A.冲、任、带脉
- B.足三阴经
- C.足太阳经
- D.足少阳经

E.足阳明经

11.患者,男,21岁。因暴饮暴食诱发腹痛,脘腹胀满,按之不舒,暖腐吞酸,大便夹有不消化食物,苔厚腻,脉滑实。中医辨证为

- A.饮食积滞
- B.气滞食阻
- C.寒积食阻
- D.热结食滞
- E.食滞痰阻

12.患者,男,33岁。因天寒受风诱发腹痛,腹冷痛,得热稍减,小便清利,大便自可,舌苔白,脉沉紧。治疗应选方剂是

- A.黄芪建中汤
- B.附子理中丸
- C.良附丸合正气天香散
- D.乌头桂枝汤
- E.通脉四逆汤

13.王某,男,40岁。腹痛绵绵,时作时止,喜温喜按,形寒肢冷,大便溏薄,神疲气短,舌淡苔白,脉沉细。治疗主方为

- A.补中益气汤
- B.附子粳米汤
- C.保和丸
- D.小建中汤
- E.四逆汤

(14~15题共用备选答案)

- A.柴胡疏肝散
- B.逍遥散
- C.良附丸合正气天香散
- D.木香顺气散
- E.小建中汤

14.肝郁气滞型腹痛,治疗首选

15.寒邪内阻型腹痛,治疗首选

(16~17题共用备选答案)

- A.小承气汤
- B.枳实导滞丸
- C.大承气汤
- D.少腹逐瘀汤

E.大柴胡汤

16.湿热壅滞型腹痛,治疗首选

17.饮食积滞型腹痛,治疗首选

五、噎膈

(1~2题共用备选答案)

- A.反胃
- B.噎膈
- C.噫气
- D.呃逆
- E.梅核气



配套名师高清视频

1.自觉咽中如物梗塞,吐之不出,吞之不下,但不妨碍进食的病证是

2.吞咽时哽咽不顺,饮食不下,或食入即吐的病证是

(3~4题共用备选答案)

- A.胃失和降,逆气动膈
- B.胃气壅滞,气逆于中
- C.肝气犯胃,肝胃不和
- D.脾胃虚寒,胃中无火
- E.痰瘀互结,食道狭窄

3.噎膈的病机是

4.呃逆的病机是

5.指出噎膈的基本病理改变是食道狭窄的医家是

- A.张仲景
- B.李东垣
- C.朱丹溪
- D.张景岳
- E.叶天士

6.患者,男,67岁。饮食难下,下而复吐出,呕吐物如赤豆汁,胸膈疼痛,肌肤枯槁,形体消瘦,舌质紫暗,脉细涩。其证候是

- A.痰气交阻
- B.瘀血内结
- C.津亏热结
- D.气虚阳微
- E.肝肾阴虚

7.患者,男,39岁。呃逆频作,声音洪亮有力,冲逆而出,口臭烦渴,多喜冷饮,脘腹

满闷,大便秘结,舌苔黄燥,脉滑数。治疗应首选

- A. 竹叶石膏汤
- B. 橘皮竹茹汤
- C. 凉膈散
- D. 小承气汤
- E. 泻心汤

六、泄泻

(1~2 题共用备选答案)

- A. 藿香正气散
- B. 不换金正气散
- C. 葛根苓连汤
- D. 白头翁汤
- E. 芍药汤

1. 患者泄泻腹痛,泻下急迫,粪色黄褐,气味臭秽,肛门灼热,烦热口渴,舌质红,苔黄腻,脉滑数。治疗应首选

2. 患者腹痛拘急,痢下赤白黏冻,白多赤少,里急后重,脘腹胀满,舌苔白腻,脉濡缓。治疗应首选

(3~4 题共用备选答案)

- A. 连理汤
- B. 半夏泻心汤
- C. 乌梅丸
- D. 左金丸
- E. 温脾汤

3. 治疗休息痢,应首选

4. 治疗休息痢日久,脾阳极虚,肠中寒积不化,遇寒即发者,应首选

(5~6 题共用备选答案)

- A. 不换金正气散
- B. 芍药汤
- C. 驻车丸
- D. 桃花汤
- E. 连理汤

5. 治疗痢疾之休息痢,应首选

6. 治疗痢疾之湿热痢,应首选

7. 提出著名的“治泻九法”的医家是

- A. 张仲景

- B. 陈无择
- C. 张景岳
- D. 李中梓
- E. 叶天士

8. 治疗腹痛饮食积滞证,应选

- A. 保和丸
- B. 越鞠丸
- C. 枳实导滞丸
- D. 枳术丸
- E. 木香顺气丸

七、痢疾

1. 治疗寒湿痢,应首选

- A. 胃苓汤
- B. 桃花汤
- C. 连理汤
- D. 黄土汤
- E. 不换金正气散



配套名师高清视频

2. 患者,男,35岁。下痢3个月余,痢下稀薄白冻,腹部隐痛,里急后重,食少神疲,四肢不温,舌淡苔薄白,脉沉细。治疗应首选

- A. 桃花汤
- B. 驻车丸
- C. 芍药汤
- D. 胃苓汤
- E. 白头翁汤

3. 下列有一项不是痢疾的必有症状

- A. 里急后重
- B. 下痢赤白脓血
- C. 痢下白冻
- D. 腹痛
- E. 肛门下坠感

4. 下列有一项不是湿热痢的主症

- A. 腹痛,里急后重
- B. 下痢赤白相兼
- C. 肛门灼热
- D. 小便短赤
- E. 苔白腻,脉濡缓

5. 痢下白多赤少一般多重用

- A. 温药
- B. 寒药
- C. 气药
- D. 血药
- E. 补药

6. 患者,男,36岁。初秋患痢,证见下痢,赤多白少,高热,腹痛较甚,里急后重,口渴饮冷,舌红苔黄,脉滑数。此时辨证属于

- A. 疫毒痢
- B. 湿热痢
- C. 寒湿痢
- D. 噤口痢
- E. 阴虚痢

7. 患者,男,35岁。下痢2天,现下痢赤白黏冻,腹痛,里急后重,肛门灼热,小便短赤,舌红苔黄腻,脉滑数。首选治疗方为

- A. 葛根芩连汤
- B. 白头翁汤
- C. 连理汤
- D. 芍药汤
- E. 藿香正气丸

8. 痢疾在《千金要方》称为

- A. 下利
- B. 滞下
- C. 肠澼
- D. 大瘕泄
- E. 重下

9. 寒湿痢的表现是

- A. 痢下赤白脓血,不甚臭秽
- B. 痢下鲜紫脓血
- C. 痢下纯为白冻
- D. 痢下赤多白少
- E. 痢下脓血黏稠

10. 一般说来,初痢实则

- A. 通之
- B. 补之
- C. 濡之
- D. 燥之
- E. 温之

11. 下列选项中,疫毒痢的正确治法是

- A. 清热和中化湿
- B. 清热除湿调气
- C. 清热解毒凉血
- D. 清热化湿和中
- E. 温中燥湿调气

12. 患者,男,56岁。痢下已月余不愈。现下痢稀薄,带有白冻,甚则滑脱不禁,腹部隐痛,口淡不渴,食少神疲,腰酸肢冷,舌质淡,苔薄白,脉沉细弱。治法宜用

- A. 清热解毒,调气行血
- B. 清热除湿,凉血解毒
- C. 清热除湿,养阴和血
- D. 温补脾肾,收敛固涩
- E. 温中清肠,调气化滞

八、便秘

1. 患者大便艰涩,腹痛拘急,胀满拒按,胁下偏痛,手足不温,呃逆呕吐,舌苔白腻,脉弦紧。治疗应首选

- A. 麻仁丸
- B. 六磨汤
- C. 温脾汤
- D. 济川煎
- E. 更衣丸

2. 患者起病急骤,腹痛剧烈,大便频频,痢下鲜紫脓血,伴有壮热口渴,头痛烦躁,恶心呕吐,舌红绛,苔黄燥,脉滑数。治疗应首选

- A. 芍药汤
- B. 白头翁汤
- C. 藿香正气丸
- D. 连理汤
- E. 黄连阿胶汤

3. 患者,男,56岁。大便秘结,排出困难,面色无华,头晕目眩,心悸,舌淡,苔白,脉细涩。其诊断是

- A. 气虚便秘
- B. 血虚便秘
- C. 阴虚便秘

D.冷秘

E.气秘

4.下列有一项不属于便秘的病机

A.肠胃积热

B.痰气交结

C.气机郁滞

D.气血亏虚

E.阴阳亏虚

5.麻子仁丸主治

A.热秘

B.冷秘

C.气秘

D.气虚秘

E.阴虚秘

6.热秘伴易怒目赤,方选

A.麻子仁丸

B.青麟丸

C.麻子仁丸合更衣丸

D.六磨汤

E.半硫丸

7.患者,男,28岁。平素体壮,食欲良好,大便偏干,近期因感冒初愈,大便干结加重,数日一行,伴有腹中胀满,面红烦热,口干口臭,唇焦色红,舌红苔黄,脉滑数。中医辨证为

A.阴津不足,肠失濡润

B.肠腑燥热,津伤便秘

C.血液亏虚,肠道失荣

D.热结气滞,胃肠壅实

E.热结食滞,胃肠壅实

8.便秘之冷秘的临床特征是

A.大便干结,口干口臭

B.大便干结,欲便不得

C.大便艰涩,手足不温

D.大便不干,努挣乏力

E.大便干结,腰膝酸软

(9~10题共用备选答案)

A.大承气汤

B.青麟丸

C.五仁丸

D.补中益气汤

E.增液承气汤

9.热秘型便秘,若热势较盛,痞满燥实坚者,可用何方急下存阴

10.血虚型便秘,若阴血已复,便仍干燥,可用何方润肠通便

11.便秘的基本病机是

A.肠胃不和

B.肝气郁结

C.湿热下注

D.肺失开合

E.大肠传导失常

12.热秘的特征为

A.大便于结,小便短赤

B.大便秘结,欲便不得

C.虽有便意,努挣乏力

D.大便艰涩,排除困难

E.大便不干,小便清长

13.气虚秘若气虚下陷,肛门坠胀者,可用补中益气汤合用

A.麻子仁丸

B.更衣丸

C.六磨汤

D.黄芪汤

E.大补元煎

14.患者,男,80岁。久患便秘,屡用番泻叶治疗,疗效欠佳。主诉虽有便意,而临厕努挣乏力,甚至汗出淋漓,而大便并不干硬,神疲气怯,舌淡,苔薄,脉虚无力。中医治法当为

A.益气润肠

B.温阳通便

C.行气导滞

D.养血润肠

E.益气养血,润肠通便

15.患者,男,76岁。平素有胃疾,大便秘结,质干燥,数日一行,面色无华,头晕眼花,心悸失眠,爪甲色淡,唇舌淡,脉细。治

疗方剂宜选用

- A. 黄芪汤
- B. 麻子仁丸
- C. 五仁丸
- D. 润肠丸
- E. 八珍汤

(16~17 题共用备选答案)

- A. 黄芪汤
- B. 济川煎
- C. 化肝煎
- D. 木香顺气散
- E. 六磨汤

16. 气虚型便秘, 治疗首选

17. 气秘型便秘, 治疗首选

一、胁痛

1. 患者,男,60岁。久患胁痛,悠悠不休,遇劳加重,头晕目眩,口干咽燥,舌红少苔,脉弦细。治疗应首选

- A. 柴胡疏肝散
- B. 逍遥散
- C. 杞菊地黄丸
- D. 一贯煎
- E. 二阴煎



配套名师高清视频

2. 患者,男,45岁。胁痛口苦,胸闷纳呆。恶心呕吐,目黄身黄,舌苔黄腻,脉弦滑数。其证候是

- A. 肝气郁结
- B. 肝郁化火
- C. 肝胆湿热
- D. 肝阴不足
- E. 瘀血阻滞

3. 患者,男,55岁。3个月前因胸胁部撞伤后,而出现胁肋刺痛,痛有定处,夜痛甚,舌质紫暗,脉沉涩。治疗应首选

- A. 复元活血汤
- B. 少腹逐瘀汤
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 调营饮
- E. 香附旋覆花汤

4. 患者胸胁胀痛,走窜不定,情绪不佳则加重,胸闷气短,暖气频作,舌苔薄,脉弦。其证候是

- A. 肝胃不和
- B. 肝络瘀阻
- C. 肝郁气滞
- D. 肝郁化热
- E. 肝脾不调

二、黄疸

1. 黄疸形成的关键病理因素是

- A. 热邪
- B. 寒邪
- C. 疫毒
- D. 瘀血
- E. 湿邪

2. 治疗黄疸热重于湿证,应首选

- A. 茵陈蒿汤
- B. 茵陈五苓散
- C. 大柴胡汤
- D. 犀角散
- E. 茵陈术附汤

3. 患者黄疸日久,黄色晦暗如烟熏,纳少脘闷,大便溏,神疲畏寒,口淡不渴,舌淡苔腻,脉沉迟。治疗应首选

- A. 茵陈蒿汤
- B. 茵陈五苓散
- C. 甘露消毒丹
- D. 黄连温胆汤
- E. 茵陈术附汤

4. 患者,女,45岁。突发身目发黄,黄色鲜明,右胁胀闷疼痛,牵引肩背,寒热往来,口苦咽干,尿黄便秘,舌红苔黄,脉弦滑数。其证候是

- A. 热重于湿
- B. 湿重于热
- C. 疫毒炽盛
- D. 胆腑郁热
- E. 脾虚湿滞

三、积聚

1. 积聚的主要病位在

- A. 脾胃

- B. 肝脾
- C. 脾肾
- D. 肝肾
- E. 肺肝

2. 下列各项, 不属积聚病因的是

- A. 情志失调
- B. 饮食所伤
- C. 感受寒邪
- D. 病后所致
- E. 跌打损伤



配套名师高清视频

3. 患者, 女, 53 岁。腹中可及积块, 软而不坚, 固着不移, 胀痛并见, 舌苔薄, 脉弦。其证候是

- A. 肝气郁滞
- B. 瘀血内结
- C. 气滞血阻
- D. 气滞痰阻
- E. 气虚血瘀

4. 患者腹内积块明显, 硬痛不移, 面暗消瘦, 纳食减少, 时有寒热舌紫暗苔薄, 脉细涩。其证候是

- A. 肝气郁滞
- B. 食滞痰阻
- C. 气滞血阻
- D. 瘀血内结
- E. 正虚瘀结

5. 患者腹胀, 腹部时有条索状物聚起, 按之胀痛更甚, 便秘, 纳呆, 舌苔腻, 脉弦滑。治疗应首选

- A. 逍遥散
- B. 六磨汤
- C. 柴胡疏肝散合失笑散
- D. 膈下逐瘀汤合六君子汤
- E. 八珍汤合化积丸

(6~7 题共用备选答案)

- A. 气机阻滞, 瘀血内结
- B. 肝脾肾受损, 气滞血结, 水停腹中
- C. 脾肺肾功能失调, 水滞体内
- D. 心肝脾功能失常, 水结腹内

E. 肝脾肾受损, 血郁脾内

6. 积聚的病机主要是

7. 鼓胀的病机主要是

四、鼓胀

1. 治疗鼓胀水湿困脾证应首选

- A. 柴胡疏肝散合胃苓汤
- B. 实脾饮
- C. 中满分消丸
- D. 调营饮
- E. 附子理苓汤

2. 患者, 男, 60 岁。腹胀大如鼓, 按之如囊裹水, 有波动感。应首先考虑的是

- A. 水饮
- B. 痞满
- C. 积聚
- D. 水臌
- E. 内痛

3. 鼓胀的病机是

- A. 气滞血瘀
- B. 气滞血瘀水停
- C. 气滞湿阻血瘀
- D. 气滞痰凝血瘀
- E. 气虚饮停血瘀

4. 鼓胀的病位在

- A. 肺、脾、肾
- B. 心、脾、肾
- C. 肝、脾、肾
- D. 心、肝、肾
- E. 心、肺、肾

5. 患者腹大胀满, 按之如囊裹水, 颜面微浮肿, 胸脘胀闷, 遇热则舒, 精神困倦, 怯寒懒动, 小便少, 大便溏, 舌苔白腻, 脉缓。治疗应首选

- A. 柴胡疏肝散
- B. 济生肾气丸
- C. 实脾饮
- D. 调营饮
- E. 胃苓汤

6. 患者, 男, 60 岁。有长期饮酒史, 现症

腹大胀满,青筋显露。牙龈出血,口干咽燥,心烦失眠小便短少,舌红少津,脉细数。其证候是

- A. 湿热蕴结
- B. 寒湿困脾
- C. 脾肾阳虚
- D. 肝脾血瘀
- E. 肝肾阴虚

7. 患者腹大胀满不舒,早宽暮急,面色苍黄,嗜睡,语无伦次,逐渐昏迷,舌苔灰腻,脉弦细而滑。治疗应首选

- A. 温胆汤
 - B. 菖蒲郁金汤
 - C. 白金丸
 - D. 苏合香丸
 - E. 涤痰汤
- 五、疟疾

1. 疟疾患者.热多寒少,汗出不畅,头痛,骨节酸痛,口渴引饮,便秘,溲赤,舌红苔黄,脉弦数;其治法是

- A. 和解表里,温阳达邪
 - B. 祛邪截疟,和解表里
 - C. 解毒除瘴,清热保津
 - D. 益气养血,扶正祛邪
 - E. 清热解表,和解祛邪
- (2~3 题共用备选答案)

- A. 柴胡截疟饮
- B. 白虎加桂枝汤
- C. 柴胡桂枝干姜汤
- D. 加味不换金正气散
- E. 何人饮

2. 治疗正疟,应首选

3. 治疗劳疟,应首选

第六章

肾系病证

一、水肿

1. 水肿发病涉及的脏腑是

- A. 心肝肾
- B. 肝脾肾
- C. 肺脾肾
- D. 脾肾心
- E. 肾心肺



配套名师高清视频

2. 患者,女,15岁。浮肿3月余,下肢为甚,按之凹陷不易恢复,心悸,气促,腰部冷痛,尿少,四肢冷,舌质淡胖,苔白,脉沉。其证候是

- A. 湿毒侵袭
- B. 湿热壅盛
- C. 脾阳虚衰
- D. 水湿浸渍
- E. 肾阳衰微

3. 患者,女,42岁。全身水肿,下肢明显,按之没指,小便短少,身体困重,胸闷,纳呆,泛恶,舌苔白腻,脉沉缓。治疗应首选

- A. 五皮饮合胃苓汤
- B. 麻黄连翘赤小豆汤
- C. 越婢加术汤
- D. 实脾饮
- E. 疏凿饮子

4. 身肿,腰以下为甚,面色萎黄,神倦肢冷,小便短少,脘腹胀闷,应用何方治疗

- A. 黄芪建中汤
- B. 实脾饮
- C. 黄芪汤
- D. 真武汤
- E. 以上均不是

5. 水肿并见恶寒发热,肢节酸楚,脉浮,治疗主方为

- A. 麻黄连翘赤小豆汤
- B. 防己黄芪汤
- C. 五皮饮
- D. 越婢加术汤
- E. 五苓散

6. 下列哪项不是阳水的特点

- A. 多挟风邪
- B. 起病急,病程短
- C. 皮肤光亮而薄
- D. 按之凹陷难复
- E. 头面先肿

二、淋证

1. 以小腹胀满疼痛,小便涩滞,淋沥不尽为特征的病证是

- A. 热淋
- B. 血淋
- C. 石淋
- D. 气淋
- E. 劳淋

2. 尿血与血淋的鉴别,主要在于

- A. 尿色的深浅
- B. 尿量的多少
- C. 尿味的情况
- D. 有无尿痛
- E. 以上均非

3. 患者,男,40岁。病发于夏季,小便艰涩疼痛,尿道窘迫,曾排尿中断,腰腹绞痛难忍,舌红苔黄腻,脉弦数。应首先考虑的是

- A. 膏淋
- B. 石淋
- C. 热淋
- D. 劳淋
- E. 气淋

4. 治疗石淋,应首选

- A.程氏萆薢分清饮
- B.无比山药丸
- C.八正散
- D.沉香散
- E.石韦散

5.患者,女,45岁。因淋雨后突发小便频急短数,刺痛灼热,尿色黄赤,口苦,舌苔黄腻,脉濡数。治疗应首选

- A.八正散
- B.小蓟饮子
- C.导赤散
- D.石韦散
- E.茜根散

三、癃闭

1.患者小便点滴不畅,烦渴欲饮,咽干咳嗽,舌苔薄黄,脉数。治疗应首选

- A.八正散
- B.导赤散
- C.沉香散
- D.代抵挡丸
- E.清肺饮

2.治疗尿路阻塞之癃闭,应首选

- A.桃红四物汤
- B.失笑散
- C.丹参饮
- D.代抵挡丸
- E.血府逐瘀汤

第七章

气血津液病证

一、郁证

1. 患者,女,40岁。精神恍惚,心神不宁,多疑易惊,悲忧善哭,喜怒无常,舌质淡,脉弦。其证候是

- A. 肝气郁结
- B. 痰气郁结
- C. 心神失养
- D. 心脾两虚
- E. 心肾阴虚



配套名师高清视频

2. 郁证主要的病因是

- A. 情志内伤
- B. 感受外邪
- C. 饮食所伤
- D. 胃失和降
- E. 肝气上逆

3. 郁证的发生虽与五脏均有关,但主要受累之脏为

- A. 心、肝、肾
- B. 肝、心、脾
- C. 肺、心、肝
- D. 肺、脾、肾
- E. 心、肺、肾

4. 郁证肝气郁结证的最佳选方是

- A. 四逆散
- B. 柴胡疏肝散
- C. 越鞠丸
- D. 逍遥散
- E. 小柴胡汤

5. 患者,女,39岁。长期精神抑郁,刻下见多思善虑,心悸胆怯,少寐健忘面色不华,头晕神疲,食欲不振,舌质淡脉细弱。此时辨证属

- A. 肝气郁结

B. 气郁化火

C. 阴虚火旺

D. 心脾两虚

E. 心神失养

6. 患者,女,39岁。见咽中不适,如有物梗阻,咯之不出,咽之不下,胸中窒闷,且兼胁痛,舌苔白腻,脉弦滑。方剂宜选用

- A. 柴胡疏肝散
- B. 丹栀逍遥散合左金丸
- C. 半夏厚朴汤
- D. 甘麦大枣汤
- E. 平胃散

7. 郁证的形成常常以何者为先

- A. 血郁
- B. 火郁
- C. 痰郁
- D. 食郁
- E. 气郁

8. 各型郁证均可出现

- A. 血郁症状
- B. 湿郁症状
- C. 气郁症状
- D. 热郁症状
- E. 痰郁症状

9. 郁证之气郁化火证的治疗最适宜方剂是

- A. 知柏地黄丸
- B. 清金化痰汤
- C. 丹栀逍遥散
- D. 泻心汤
- E. 龙胆泻肝汤

10. 患者,男,36岁。平素性格较内向,沉默寡言,近日情志不遂,精神抑郁,情绪不

宁,善太息,胸胁胀痛,痛无定处,腕闷暖气,腹胀纳呆,大便时软时干,苔薄腻,脉弦。治法宜选用

- A.清泻肝火,解郁和胃
- B.化痰利气解郁
- C.疏肝理气解郁
- D.健脾养心,益气补血
- E.养心安神

二、血证

1.患者鼻衄,血色鲜红,口渴欲饮,鼻干口干臭秽,烦躁,便秘,舌红苔黄,脉数。治疗宜选

- A.白虎汤
- B.玉女煎
- C.泻白散
- D.茜根散
- E.化肝煎

2.鼻衄,目眩耳鸣,烦躁易怒,两目红赤者,首选

- A.大柴胡汤
- B.泻心汤
- C.黛蛤散
- D.龙胆泻肝汤
- E.滋水清肝饮

3.鼻衄,或兼齿衄,血色鲜红,口渴喜饮,口臭便干,舌红,苔黄,脉数。治法应选用

- A.滋阴清火,凉血止血
- B.滋阴润肺,凉血止血
- C.清肺泄热,凉血止血
- D.清热润肺,凉血止血
- E.清胃泻火,凉血止血

4.吐血,色红或紫暗,口苦胁痛,心烦易怒,首选

- A.大柴胡汤
- B.泻心汤
- C.黛蛤散
- D.龙胆泻肝汤
- E.滋水清肝饮

5.便血鲜红,大便不畅或稀薄,或有腹

痛,口苦,苔黄腻,脉濡数。宜选用何方

- A.连理汤
- B.驻车丸
- C.地榆散合槐角丸
- D.香连丸
- E.乌梅丸

6.胃痛日久未愈,症见便血紫暗,甚色泽黑,腹部隐痛,喜热饮,便溏,面色萎黄,神倦懒言,舌质淡,脉细弱。治宜选用

- A.补中益气汤
- B.黄芪建中汤
- C.当归补血汤
- D.黄土汤
- E.理中汤

7.小便短赤带血,头晕耳鸣,神疲,颧红潮热,腰膝酸软,舌红,脉细数。其治法是

- A.清热泻火,凉血止血
- B.清热化湿,凉血止血
- C.滋阴降火,凉血止血
- D.清热利湿,化瘀止血
- E.清热解毒,凉血止血

三、消渴

1.消渴的病理变化主要是

- A.肾阴亏损
- B.胃热炽盛
- C.肺热津伤
- D.阴虚燥热
- E.阴阳两虚



配套名师高清视频

2.消渴“上消”突出的症状是

- A.消谷善饥
- B.烦躁不安
- C.身体消瘦
- D.烦渴引饮
- E.尿频量多

3.患者,男,41岁。因情绪紧张诱发成疾,烦渴引饮,口干喜凉,舌红,苔黄少津液,脉象洪大。该病例中医辨证为

- A.肺热津伤
- B.肺热、气阴两伤

- C.胃热、气阴两伤
- D.肺胃热炽、气阴两伤
- E.胃热津伤

4.患者,女,48岁。近1个月以来,出现尿频量多,混浊如脂膏,时或尿甜,口干舌燥,舌红,脉沉细数。治法宜用

- A.清利湿热
- B.清热化湿
- C.滋阴固肾
- D.健脾益肾
- E.滋肾固涩

(5~6题共用备选答案)

- A.消渴方
- B.玉女煎
- C.七味白术散
- D.六味地黄丸
- E.金匱肾气丸

5.消渴病,口渴多饮,口舌干燥,尿频量多,舌边尖红,苔薄黄,脉数。宜选下述何方加减治疗

6.消渴病,多食易饥,口渴,尿多,形体消瘦,苔黄,脉滑实有力。宜选下述何方加减治疗

7.消渴的病变脏腑主要是

- A.肺、脾、肾
- B.肺、胃、肾
- C.心、肝、肾
- D.肝、脾、肾
- E.脾、胃、肾

8.患者,男,61岁。有糖尿病病史十余年。现症:小便频多,混浊如膏,夜尿尤多,伴有腰膝酸软,形寒畏冷,阳痿不举,双下肢轻度浮肿,舌淡有齿痕,苔白,脉沉细无力。该病例中医诊断为

- A.消渴病
- B.膏淋
- C.尿浊
- D.虚劳
- E.滑精

9.患者,女,47岁。因口渴多饮5月余,来诊。烦渴多饮,尿频量多,口干舌燥,舌红,苔薄黄,脉洪数。中医治法应为

- A.清热润肺,生津止渴
- B.清胃泻火,生津止渴
- C.滋养肺肾,泻热生津
- D.清泻肺胃,益气生津
- E.清泻肺胃,生津止渴

10.患者,男,49岁。多食易饥,口渴,尿多,形体消瘦,苔黄,脉滑实有力。证属

- A.上消肺热津伤证
- B.中消胃热炽盛证
- C.中消气阴亏虚证
- D.下消肾阴亏虚证
- E.下消阴阳两虚证

四、自汗、盗汗

1.治疗盗汗之阴虚火旺证,应首选的方剂是

- A.玉屏风散
- B.六味地黄丸
- C.一贯煎
- D.当归六黄汤
- E.生脉散

2.患者,女,48岁。时常汗出,恶风,周身酸楚,时寒时热,舌苔薄白,脉缓。其治法是

- A.益气固表
- B.调和营卫
- C.滋阴降火
- D.清肝泻热
- E.益气化湿

3.患者汗出恶风,稍劳汗出,易于感冒,体倦乏力,面色少华,苔薄白,脉细弱。治疗应首选

- A.桂枝汤
- B.四妙丸
- C.玉屏风散
- D.当归六黄汤
- E.龙胆泻肝汤

4. 邪热郁蒸型汗证的特点是

- A. 汗出恶风
- B. 蒸蒸汗出
- C. 手足心汗出
- D. 头汗出
- E. 汗出畏寒

五、内伤发热

1. 患者,女,43岁。每于劳累后即出现低热,头晕乏力,自汗,食少便溏,舌淡苔白,脉弱。治疗应首选

- A. 血府逐瘀汤
- B. 补中益气汤
- C. 小柴胡汤
- D. 清骨散
- E. 归脾汤



配套名师高清视频

2. 患者常在劳累后即出现低热,头晕乏力,自汗,食少便溏,舌淡苔白,脉弱。其治法是

- A. 滋阴清热
- B. 活血化瘀
- C. 清肝泻火
- D. 甘温除热
- E. 益气养血

3. 下列哪项不是内伤发热的病因

- A. 恼怒抑郁
- B. 跌打损伤
- C. 劳累过度
- D. 饮食不调
- E. 外邪袭表,入里发热

4. 自觉身体某处局部发热,且固定疼痛,按之有一肿块的治疗法应为

- A. 疏肝解郁,清肝解热
- B. 活血化瘀
- C. 益气健脾,甘温除热
- D. 益气养血
- E. 滋阴清热

5. 阳虚发热的特点是

- A. 发热常在劳累后发作或加重
- B. 午后或夜间发热

C. 热势随患者情绪变化而波动

D. 发热欲近衣

E. 骨蒸劳热

6. 将方药肾气丸转化为六味地黄丸,为阴虚内热的治疗提供了重要方剂的医家是

- A. 钱乙
- B. 朱丹溪
- C. 李东垣
- D. 张景岳
- E. 王清任

7. 患者,女,38岁。体虚久病,发热,体温 37.9°C ,在劳累后发热症状加重,体温最高 38.5°C ,伴有头晕乏力,气短懒言,自汗易感,食少便溏,舌质淡,苔薄白,脉细弱。其中医诊断应为

- A. 气虚外感
- B. 内伤发热
- C. 眩晕
- D. 汗证
- E. 虚劳

8. 患者,男,42岁。病已年余,每于午后发热,手足心发热,伴有心烦失眠,多梦健忘,两颧红赤,口干咽燥,盗汗,大便干,小便黄,舌红少苔,脉细数。中医方剂可选用

- A. 清骨散
- B. 加减葳蕤汤
- C. 银翘散加味
- D. 百合固金汤
- E. 六味地黄丸

(9~10题共用备选答案)

- A. 丹栀逍遥散
- B. 清骨散
- C. 补中益气汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 归脾汤

9. 治疗内伤发热气郁发热证的代表方剂是

10. 治疗内伤发热血瘀发热证的代表方剂是

11.对瘀血发热的治疗作较多论述提出相应方剂的医家是

- A.钱乙
- B.朱丹溪
- C.李东垣
- D.张景岳
- E.王清任

12.患者,女,42岁。久病肌衄,头晕心悸,身疲乏力,低热,体温最高37.9℃,面色无华,甲爪色淡,舌淡,脉细弱。中医病机为

- A.气血亏虚,外受风邪
- B.血虚失养,阴不配阳
- C.气虚血脱
- D.亡血气脱
- E.血瘀致虚,气血亏虚

13.患者,女,40岁。午后或夜间发热,自觉身体某些部位发热,口燥咽干,但不欲多饮,肢体疼痛,面色萎黄,舌有瘀点,脉弦。辨证应属

- A.阴虚发热证
 - B.气虚发热证
 - C.血虚发热证
 - D.血瘀发热证
 - E.气郁发热证
- 六、厥证

1.一患者因知晓丈夫背叛,突然昏倒,不知人事,呼吸气粗,口噤握拳,舌苔薄白,脉

伏,选用的治法为

- A.开窍,顺气,解郁
 - B.补气,回阳,醒神
 - C.平肝潜阳,理气通瘀
 - D.补养气血
 - E.行气豁痰
- (2~3题共用备选答案)

- A.导痰汤
- B.四味回阳饮
- C.通关散
- D.羚角钩藤汤
- E.独参汤

2.气厥实证常用治疗方药为

3.血厥实证常用治疗方药为

4.厥证主要的治疗原则是

- A.开窍、化痰
- B.辟秽、醒神
- C.顺气、解郁
- D.醒神、回厥
- E.回阳、救逆

5.厥证的主要病机是

- A.气机逆乱,气血阴阳不相顺接
- B.气随血脱,阳随阴消
- C.气机疏泄失常
- D.阴阳气血亏耗
- E.气机升降失调

一、痹证

1. 患者关节疼痛,以肩、肘、上肢关节为甚,治疗应首选的药物是

- A. 桑寄生、杜仲、巴戟天
- B. 土茯苓、车前子、薏苡仁
- C. 片姜黄、羌活、桂枝
- D. 独活、川牛膝、木瓜
- E. 穿山甲、白花蛇、乌梢蛇

2. 患者肢体关节疼痛,痛势较剧,部位固定,遇寒则痛甚,得热则痛缓,关节屈伸不利。局部皮肤或有寒冷感。舌质淡,舌苔薄白,脉弦紧。治疗应首选

- A. 防风汤
- B. 乌头汤
- C. 薏苡仁汤
- D. 双合汤
- E. 补血荣筋丸

3. 治疗行痹的首选方是

- A. 桂枝芍药知母汤
- B. 桂枝汤
- C. 防风汤
- D. 麻黄汤
- E. 越婢汤

4. 治疗风湿热痹首选方是

- A. 三痹汤
- B. 白虎加桂枝汤
- C. 桂枝汤
- D. 防风汤
- E. 桂枝芍药知母汤

5. 下列的选项中,有一项不是风湿热痹的特点

- A. 局部灼热红肿
- B. 关节、肌肤痛不可触

C. 得冷则舒

D. 肌肤麻木不仁

E. 游走性关节疼痛

6. 对膝关节肿大称为“鹤膝风”的医著是

- A. 《外台秘要》
- B. 《济生方·痹》
- C. 《格致余论》
- D. 《证治准绳》
- E. 《诸病源候论》



配套名师高清视频

7. 治疗痹证之着痹的代表方剂是

- A. 三仁汤
- B. 薏苡仁汤
- C. 宣痹汤
- D. 四妙散
- E. 二妙散

8. 患者,男,65岁。几个月前受凉后出现了四肢关节疼痛,游走不定,关节屈伸不利,起病之初曾有恶风、发热。舌淡红,苔薄白,脉浮紧。治疗处方应选用

- A. 乌头汤
- B. 薏苡仁汤
- C. 地黄饮子
- D. 防风汤
- E. 白虎桂枝汤

9. 双合汤主要用于痹证之

- A. 行痹
- B. 风湿热痹
- C. 痰瘀痹阻证
- D. 肝肾两虚证
- E. 痛痹

10. 痹证日久,可由经络累及脏腑,其多见

- A.肝痹
- B.心痹
- C.肺痹
- D.肾痹
- E.脾痹

11.患者,女,45岁。体型偏瘦,关节疼痛反复发作3年,双膝关节红肿热痛,刻下症见:膝关节灼热红肿,痛如刀割,筋脉抽掣,入夜更甚,壮热烦渴。舌红少津,脉弦数。应辨证为

- A.风湿热邪阻闭经络关节
- B.风寒湿邪化热内闭
- C.痰瘀痹阻关节
- D.热痹化火伤津
- E.以上都不是

12.患者,男,48岁。四肢关节酸楚,两膝关节灼热红肿,疼痛而强硬,屈伸不利,汗出口渴,苔黄燥,脉滑数,证属

- A.行痹
- B.着痹
- C.风湿热痹
- D.痛痹
- E.痰瘀痹阻证

(13~14题共用备选答案)

- A.补血荣筋丸
- B.双合汤
- C.犀黄丸
- D.蠲痹汤
- E.宣痹汤

13.痹证属痰瘀痹阻型代表方剂宜用

14.风湿热痹的代表方剂宜用

二、痿证

1.患者,男,40岁。肢体软弱无力,渐进加重,食少便溏,腹胀,神疲乏力,舌苔薄白,脉细。治疗应首选

- A.泻白散
- B.杏苏散
- C.参苓白术散
- D.清燥救肺汤

E.沙参麦冬汤

2.“治痿独取阳明”之说,最早出自何书

- A.《素问·痿论》
- B.《灵枢·经筋》
- C.《素问·骨空论》
- D.《素问·阳明脉解》
- E.《灵枢·热病》

3.除哪项外,均为形成痿证的病理

- A.肺热伤津
- B.湿热浸淫
- C.脾胃虚寒
- D.肝肾亏虚
- E.肝火犯肺

4.痿证,由肺热伤津而致者,其典型的舌苔、脉象为

- A.舌质红、苔黄腻,脉濡数
- B.舌质红、苔黄、脉细数
- C.舌质淡红、苔薄白、脉细无力
- D.舌质红、苔少、脉细数
- E.以上都不是

5.“治痿独取阳明”的含义是

- A.治疗痿证宜取阳明经穴
- B.治疗痿证宜疏通阳明经脉
- C.治疗痿证以补益脾胃为治则
- D.治疗痿证以养胃为治则
- E.治疗痿证一般采取补益先天为治则

6.刘某,男,26岁,为久居湿地渔民,半个月来肢体困重,痿软无力,步履艰难,并有下肢浮肿,麻木不仁之感,胸脘痞闷,纳食量少,食后总有饱胀泛恶,小便短赤干涩痛,苔黄厚腻,脉濡数。此属何型痿证

- A.肺热津伤,筋失濡润
- B.湿热浸淫,气血不运
- C.脾胃亏虚,精微不运
- D.肝肾亏损,髓枯筋痿
- E.以上都不是

7.赵某,女,52岁。半年前始觉下肢乏力,腰脊疲软,头晕耳鸣,口舌干燥,舌红少苔,脉沉细数。应选何方治疗

- A.左归饮
- B.左归丸
- C.大补阴丸
- D.知柏地黄丸
- E.虎潜丸

8.下列有一项不是痿证形成的病因

- A.感受温毒
- B.风寒外袭
- C.饮食不节
- D.跌仆瘀阻
- E.涉水冒雨

9.痿证见手足痿弱,形体瘦削,肌肤甲错者为瘀血久留,治疗可用

- A.补阳还五汤
- B.圣愈汤送服大黄蛰虫丸
- C.身痛逐瘀汤
- D.桃红四物汤
- E.六味地黄丸

10.患者,男,65岁。隐匿起病,下肢痿软无力,腰脊酸软,不能久立,目眩发落,咽干耳鸣,遗精遗尿,舌红少苔,脉细数。此时证属

- A.肝肾亏损证
- B.脾胃亏虚证
- C.湿热浸淫证
- D.肺热津伤证
- E.脉络瘀阻证

11.患者,男,48岁。患重症肌无力多年,近日劳累后肢体痿软无力逐渐加重,食少便溏,腹胀,面浮而色不华,气短,神疲乏力,苔薄白,脉细。治疗方剂宜选

- A.清燥救肺汤
- B.加味二妙散
- C.参苓白术散合补中益气汤
- D.虎潜丸
- E.归脾汤

12.患者,女,61岁。肢体困重,痿软无力,下肢痿弱为甚,手足麻木,扪及微热,喜凉恶热,胸脘痞闷者,治疗该证的代表方

剂为

- A.三仁汤
- B.茵陈蒿汤
- C.加味二妙散
- D.胃苓汤
- E.藿香正气散

13.下列有一项不是痿证脾胃虚弱证的主症

- A.其病较急
- B.肢体软弱无力
- C.神疲肢倦
- D.少气懒言
- E.面色白或萎黄无华

14.痿证多属五脏内伤,精血受损,阴虚火旺,临床少见

- A.虚证
- B.实证
- C.虚实错杂
- D.寒证
- E.热证

15.患者,男,24岁。病发热已五、六日,热略减退,突然出现肢体软弱无力,步履艰难,心烦口渴,咳呛不爽,咽喉干燥,小便黄少,大便干燥,舌质红苔黄,脉细数。治疗方法宜

- A.清热润燥,养阴生津
- B.滋阴清热,润肺止咳
- C.清肺化痰,降气平喘
- D.清肺润燥,化痰止咳
- E.清热解毒,宣肺止咳

16.患者,男,35岁。病起发热,热后突然出现肢体软弱无力,肌肉瘦削,皮肤干燥,心烦口渴,咳呛少痰,咽干不利者,治疗该证的代表方剂为

- A.桑杏汤
- B.六味地黄丸
- C.虎潜丸
- D.加味二妙散
- E.清燥救肺汤

(17~18 题共用备选答案)

- A.病起发热,皮肤干燥,咳呛少痰
- B.肢体困重,手足麻木,喜凉恶热
- C.神疲肢倦,肌肉萎缩,少气懒言
- D.腰膝酸软,眩晕耳鸣,舌咽干燥

E.手足麻木不仁,四肢青筋显露,舌痿不能伸缩

17.痿证之湿热浸淫证症见

18.痿证之脉络瘀阻证症见

三、腰痛

1.患者腰部冷痛重着,转侧不利,逐渐加重,静卧病痛不减,寒冷和阴雨天则加重。舌质淡苔白腻,脉沉而迟缓。其证候

- A.肾虚
- B.气滞
- C.寒湿
- D.湿热
- E.瘀血

2.下列哪项不是腰痛的主要病因

- A.感受寒湿
- B.感受湿热
- C.劳倦过度
- D.情志内伤
- E.跌打损伤

3.在导致腰痛的外感诸邪中,何者最为关键

- A.风邪
- B.寒邪

C.湿邪

D.热邪

E.燥邪

4.肾虚腰痛,日久不愈,无明显阴阳偏虚者,宜选方

- A.左归丸
- B.右归丸
- C.大补元煎
- D.大补阴丸
- E.青娥丸

5.张某,中年男性。因外伤诱发腰痛,腰痛甚,不能自转侧,痛有定位而拒按,舌暗有瘀斑,脉弦。治疗应选方

- A.身痛逐瘀汤
- B.丹参饮
- C.桃红四物汤
- D.复元活血汤
- E.独活寄生汤

6.李某,男,47岁。腰痛,劳累后加重,卧则稍减,反复发作,已5年余。伴见手足不温,少腹拘急,阳痿,舌淡,脉沉细。治疗最合适的方剂是

- A.左归丸
- B.右归丸
- C.青娥丸
- D.参芪地黄汤
- E.赞育丹

参考答案及重点试题解析

第五篇 中医内科学

第一章 肺系病证

一、感冒

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	E	C	B	E	B	B	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	E	B	C	D	E	B	E
21	22	23	24	25					
B	A	D	C	A					

1.【解析】时行感冒是指在一个时期内广泛流行,证候相类似者,其与感冒风热证的区别点在于是否有流行性。

12.【解析】暑湿感冒,暑热偏盛者,可加黄连、栀子、黄芩等清暑泄热,方剂可选用黄连香薷饮。

二、咳嗽

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	C	D	A	C	B	A	A	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	D	C	B	E	D	C	E	B
21	22	23	24	25	26	27	28		
A	D	B	A	D	A	B	A		

2.【解析】咳嗽有外感、内伤两类。外感为六淫外邪犯肺,内伤为脏腑功能失调,内邪干肺,如肺脏虚弱、情志刺激肝火犯肺、饮食不节痰湿蕴肺、久病伤阴肺肾阴虚。但是过劳努伤一般不导致咳嗽。

12.【答案】C

【解析】外感咳嗽为六淫外邪犯肺,内伤咳嗽为脏腑失调,内邪干肺,五脏六腑皆令人咳,病位主要在肺。但又主要与肝、脾、肾的关系最密切。

19.【解析】肝火犯肺可致咳嗽,脾失运化,痰湿蕴肺可致,肺阴亏耗可致,肾虚不纳可致。

22.【解析】B 项治表虚汗出易感,C 项治阴虚肺痿,A 项治燥热犯肺咳嗽,E 项治肺肾阴虚之虚火上炎咳血。

三、哮病

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	B	C	B	D	E	B	A	B

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	A	D	E	D	C	D	C	E
21	22	23	24	25	26	27			
B	E	D	A	D	B	C			

7.【解析】喘证的基本病机为实者邪壅于肺,宣降失司;咳嗽为邪犯于肺,肺气上逆;肺胀为肺虚为本,痰浊水饮淤血内结;肺癆为肺气虚弱,感染癆虫。

14.【解析】热哮发作期治宜清热宣肺,化痰定喘,用定喘汤。

19.【解析】辨证为肺脾气虚证,治法为健脾益气,补土生金,方剂选用六君子汤加减。

四、喘证

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	B	D	A	E	D	C	B	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	E	D	A	B	D	C	D	E	A
21	22	23	24	25					
D	B	D	D	E					

6.【解析】射干麻黄汤不是喘证的代表方剂。桑白皮汤为痰热遏肺证代表方剂;葶苈大枣泻肺汤合真武汤为水凌心肺的代表方剂;若寒饮内伏,复感外寒引发者可用小青龙汤。

15.【解析】辨证为肺气虚耗证,治法为补肺益气。

17.【解析】平素可口服逍遥散;柴胡疏肝散治肝气郁滞之胁肋胀痛及肝气犯胃型的胃痛;四磨汤治肝郁气逆证;喘证每遇情志刺激而诱发首选方药的是五磨饮子;四七汤是半夏厚朴汤加大枣而成,用于治疗痰气互结之梅核气。

五、肺癆

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	D	A	E	C	B	C	E	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	D	C	D	C	B	A	D	B

6.【解析】肺癆是肺叶生疮,形成脓疡的一种病证,属于内癆之一。临床以咳嗽、胸痛、发热、咯吐腥臭浊痰甚则脓血相兼为主要特征。

9.【解析】肺癆初期用银翘散,成癆期用千金苇茎汤合如金解毒散,溃脓期时用加味桔梗汤,恢复期用沙参清肺汤合桔梗杏仁煎。

六、肺癆

1	2	3	4	5	6	7			
B	B	A	A	B	C	B			

4.【解析】此题病历辨证为阴阳虚损型肺癆,方剂应当首选补天大造丸。

6.【解析】辨证为肺阴亏损型肺癆,方选月华丸。

7.【解析】A.肺阴亏虚证用月华丸治疗,B.虚火灼肺证用百合固金汤合秦艽鳖甲散治疗,C.气阴耗伤证用保真汤治疗,D.阴阳两虚证用补天大造丸治疗,E.肺肾亏虚,肺癆无此证型。

第二章 心系病证

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	D	E	E	C	A	A	A	B	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	B	B	E	B	D	A	D	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	A	C	D	E	A	C	B	D	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	
A	E	B	E	B	B	C	C	A	

15.【解析】辨证为心悸之心虚胆怯证,治疗应镇惊定志,养心安神,方药选择安神定志丸。

19.【解析】心阳虚衰,无以温养心神,治法为温补心阳,安神定悸。

20.【解析】胸痹寒凝心脉则见猝然心痛如绞,心痛彻背,喘不得卧,多因气候骤冷或骤感风寒而发病或加重,伴形寒,甚则手足不温,冷汗自出,胸闷气短,心悸,面色苍白,舌苔薄白,脉沉紧或沉细。欲太息,暴怒加重属于气滞心胸。

27.【解析】肝失疏泄,气机郁滞,心脉不和。中医治法为疏肝理气,活血通络。方选柴胡疏肝散加减。

31.【解析】老人夜寐早醒而无虚烦者,多属气血不足。脾虚血亏,心神失养,神不安舍。补益心脾,养血安神方,选归脾汤合酸枣仁汤。

37.【解析】辨证为痰热扰心证,治法应当清化痰热,和中安神。

第三章 脑系病证

一、头痛

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	B	A	E	E	E	E	D	B
11									
C									

5.【解析】痰浊头痛的证候:头痛昏蒙,胸脘满闷,纳呆呕恶,舌苔白腻,脉滑或弦滑。

二、眩晕

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
C	C	B	E	B	C	C	B	D	

8.【解析】痰浊中阻,上蒙清窍,清阳不升,治法应当化痰祛湿,健脾和胃,代表方剂为半夏白术天麻汤加减。

三、中风

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	A	D	C	E	D	D	C	B

11	12	13	14						
D	C	C	D						

9.【解析】风痰瘀阻证应搜风化痰,行瘀通络,方用解语丹加减。

四、癫狂

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
E	E	E	C	A	D	B	A	C	

4.【解析】癫证之痰气郁结证,治法为理气解郁,化痰醒神,方剂选用逍遥散合顺气导痰汤加减。

五、痫病

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	E	A	B	A	B	B	A	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
C	A	D	C	C	E	B	A	B	

10.【解析】痫发日久,耗伤气血,心脾两伤,心神失养。辨证为心脾两虚证。治法应当补益气血,健脾宁心。

第四章 脾胃病证

一、胃痛

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	B	C	C	A	C	A	C	A
11	12	13	14	15	16	17	18		
B	E	D	C	C	A	A	B		

12.【解析】胃痛初病在气,久病在血。在气者,有气滞、气虚之分,气滞者,多为胀痛,气虚者多为隐痛,在血者,痛如针刺,且痛有定处。

15.【解析】辨证为胃痛之饮食伤胃证,饮食积滞,阻塞胃气。治法为消食导滞,和胃止痛。

二、痞满

1	2	3							
B	C	C							

3.【解析】辨证为痞满之痰湿中阻证,用二陈平胃汤除湿化痰,理气宽中。

三、呕吐

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	A	B	C	E	A	D	B	E
11	12	13	14						
C	E	D	B						

1.【解析】痰饮内阻证的特点为呕吐清水痰涎、脘闷不食、头眩心悸、脉滑。胸胁疼痛一般为气滞血瘀引起,本证无。

2.【解析】外感后突发呕吐,胸脘满闷,舌苔白腻,兼见表证,为外感寒湿。治宜解表疏邪,和胃降逆,用藿香正气散。

6.【解析】肝气犯胃证的证候为:呕吐吞酸,暖气频繁,胸胁胀痛,舌淡红,苔薄,脉弦。

四、腹痛

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	D	E	B	A	E	B	E	C
11	12	13	14	15	16	17			
A	C	D	A	C	C	B			

6.【解析】寒邪凝滞,中阳被遏,脉络痹阻。治法为散寒温里,理气止痛。

10.【解析】腹中有肝、胆、脾、肾、大小肠、膀胱等脏腑,并为足三阴、足少阳、手足阳明、冲、任、带等经脉循行之处。足太阳膀胱经行于下肢及背部。

五、噎膈

1	2	3	4	5	6	7			
E	B	E	A	E	B	A			

5.【解析】叶天士在《临证指南医案》提出“脘管窄隘”,指出了噎膈的基本病理改变是食道狭窄。

六、泄泻

1	2	3	4	5	6	7	8		
C	B	A	E	E	B	D	C		

7.【解析】李中梓《医宗必读》概括出著名的治泻九法。

七、痢疾

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	A	E	E	C	B	D	B	C	A
11	12								
C	D								

3.【解析】痢疾是以腹痛,里急后重,大便次数增多,泻下赤白脓血便为主症

4.【解析】湿热痢证候:痢下赤白脓血,黏稠如胶冻,腥臭,腹部疼痛,里急后重,肛门灼热,小便短赤,舌苔黄腻,脉滑数。

5.【解析】下痢白多赤少,湿邪伤及气分;赤多白少,或以血为主者,热邪伤及血分。

八、便秘

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	B	B	A	C	B	C	A	C
11	12	13	14	15	16	17			
E	A	D	A	D	A	E			

14.【解析】脾肺气虚,传送无力,辨证为气虚秘。治法为益气润肠。

第五章 肝胆病证

一、胁痛

1	2	3	4						
D	B	A	C						

二、黄疸

1	2	3	4						
E	A	E	D						

三、积聚

1	2	3	4	5	6	7			
B	E	C	D	B	A	B			

3.【解析】患者腹中可及积块,软而不坚,固着不移,为气滞血瘀,脉络不和,积而成块。辨证为积证之气滞血阻证。

四、鼓胀

1	2	3	4	5	6	7			
B	D	B	C	C	E	D			

5.【解析】湿邪困遏,脾阳不振,寒水内停而致鼓胀,辨证为水湿困脾证。治法为温中健脾,行气利水。代表方剂为实脾饮。

五、疟疾

1	2	3							
E	A	E							

第六章 肾系病证

一、水肿

1	2	3	4	5	6				
C	E	A	B	A	D				

4.【解析】脾阳不振,运化无权,土不制水,辨证为脾阳虚衰证,治法:健脾温阳利水。代表方剂:实脾饮加减。

二、淋证

1	2	3	4	5					
D	D	B	E	A					

3.【解析】湿热蕴结下焦,尿液煎熬成石,膀胱气化失司。应诊断为石淋。

三、癃闭

1	2								
E	D								

第七章 气血津液病证

一、郁证

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	B	B	D	C	E	C	C	C

5.【解析】多思善虑,心悸胆怯,少寐健忘面色不华,头晕神疲,食欲不振,舌质淡脉细弱。为脾虚之证。脾伤气血生化不足,心神失养,而导致心脾两虚之证。

二、血证

1	2	3	4	5	6	7			
B	D	E	D	C	D	C			

5.【解析】湿热蕴结,脉络受损,血溢肠道。辨证为肠道湿热证,治法为清化湿热,凉血止血,方剂选用地榆散合槐角丸加减。

三、消渴

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	D	C	A	B	B	A	A	B

4.【解析】辨证为消渴之肾阴亏虚证,肾阴亏虚,肾失固摄。治法应当滋阴固肾。

四、自汗、盗汗

1	2	3	4						
D	A	C	B						

五、内伤发热

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	E	B	D	A	B	A	A	D
11	12	13							
E	B	D							

8.【解析】阴虚发热证,阴虚阳盛,虚火内炽,治法是滋阴清热,方剂当用清骨散加减

六、厥证

1	2	3	4	5					
A	C	D	D	A					

第八章 肢体经络病

一、痹证

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	C	B	D	D	B	D	C	B
11	12	13	14						
D	C	B	E						

7.

【解析】着痹是湿邪兼夹风寒,留滞经脉,闭阻气血。治法为除湿通络,祛风散寒,方用薏苡仁汤加减。

10.【解析】痹证日久不愈,病邪由经络而累及脏腑,出现脏腑痹的证候。其中以心痹较为多见。

二、痿证

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	E	B	C	B	E	B	B	A
11	12	13	14	15	16	17	18		
C	C	A	D	A	E	B	E		

5.【解析】《内经》提出“治痿者独取阳明”,是指从补脾胃、清胃火、祛湿热以调养五脏的一种重要措施。

15.答案:A

【解析】为肺热津伤证,肺燥伤津,五脏失润,筋脉失养,治法应清热润燥,养阴生津

三、腰痛

1	2	3	4	5	6				
C	D	C	E	A	B				

1.【解析】寒湿者,腰部冷痛重着,转侧不利,静卧病痛不减。

4.【解析】如无明显阴阳偏盛者,可服用青娥丸,补肾治腰痛。