

乡村全科执业助理医师资格考试 100 考题

1.全科医疗服务的主体形式是

A.病房医疗

B.舒缓医疗

C.门诊医疗

D.临终医疗

E.入户医疗

【答案】C

2.全科医生接诊高血压患者后，写出 SOAP 式接诊记录，在对于 S 的记录中，不符合要求的内容是

A.间断头晕 2 年

B.较少体力活动

C.高血压病史 8 年

D.心电图示左心室肥厚

E.母亲因脑卒中去世

【答案】D

3.《中药品种保护条例》规定，“对特定疾病有特殊疗效”，可申请中药品种保护级别是

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

E.六级

【答案】A

4.因抢救生命垂危患者等紧急情况，不能取得患者或其近亲属意见时，可以批准立即实施相应医疗措施的特定人员是

A.科室负责人或授权的负责人

B.医疗机构负责人或授权的负责人

- C.患者单位负责人或授权的负责人
- D.患者所在街道的负责人或授权的负责人
- E.患者所在街道派出所的负责人或授权的负责人

【答案】B

5.传统中医学诊断最主要的依据是

- A.体格检查和病性判定
- B.症状和影像检查结果
- C.整体状况和舌、脉等表象
- D.症状表现及实验室检查
- E.病因判定及心电图检查

【答案】C

6.不属于中医学与全科医学共同特征的是

- A.个体化的辨证论治
- B.发病机理的深入研究
- C.强调医患和医患关系
- D.因时因地制宜的处理
- E.养生预防康复的原则和措施

【答案】B

7.不宜引入全科医疗服务的中医干预措施是

- A.针刺
- B.按摩
- C.体疗
- D.艾灸
- E.中药输液

【答案】E

8.临床上观察发绀的常见部位是

- A.眼睑
- B.颈部

- C.胫前
- D.四肢近端
- E.口唇、指端（甲床）

【答案】E

18.下列关于发绀的说法错误的是

- A.发绀常发生在口唇、甲床等部位
- B.正常血液中含血红蛋白为 15 g/dl
- C.发绀是由于血液中还还原血红蛋白的绝对量减少所致
- D.中毒可引起发绀
- E.严重贫血常不表现发绀

【答案】C

9.引起咽痛的最常见病因是

- A.恶性肿瘤
- B.全身性疾病
- C.咽部炎症性疾病
- D.咽部创伤、异物
- E.咽部临近器官疾病

【答案】C

10.痰的性状与其对应疾病的描述，不正确的是

配套名师精讲课程

- A.果酱样痰——肺吸虫病
- B.脓性泡沫痰——支气管扩张
- C.铁锈色痰——肺炎链球菌肺炎
- D.粉红色泡沫痰——肺炎支原体肺炎
- E.红色胶冻样痰——肺炎克雷伯杆菌肺炎

【答案】D

11.男, 22 岁, 因急性病毒性心肌炎 5 天住院, 近 2 天出现心慌, 气短, 不能平卧, 查体: 心脏扩大, 心率: 132 次/分, 律齐, 心尖部可闻及舒张期奔马律, 肝肋下未触及, 下肢无水肿, 最可能诊断是

- A.急性左心衰竭
- B.急性右心衰竭
- C.慢性左心衰竭
- D.慢性右心衰竭
- E.慢性全心衰竭

【答案】A

12.男婴, 7 月龄。因受凉后低热、咳嗽、气促 4 天来诊。查体: T 37.8 °C, R 52 次/分, 两下肺可闻及细湿啰音。化验室: WBC $7.1 \times 10^9/L$, N 0.78, 胸部 X 线片显示双下肺斑片状阴影。最可能的诊断是

- A.肺结核
- B.肺水肿
- C.胸腔积液
- D.支气管炎
- E.支气管异物

【答案】D

13.男, 40 岁。胸闷, 憋气伴低热、盗汗 2 周。肺结核病史 10 年。胸部 X 线片显示右侧胸腔中等量积液。最可能出现的阳性体征是

- A.左肺呼吸音减弱
- B.气管向右侧移位
- C.胸壁皮下气肿体征
- D.右肺触觉语颤增强
- E.右下肺叩诊呈浊音

【答案】E

14.男, 59 岁。胸骨后疼痛伴烧心、反酸 2 个月, 餐后及卧位时加重, 伴轻度间歇性吞咽困难, 服用奥美拉唑可以减轻, 有长期吸烟饮酒史, 最可能的诊断是

A.食管癌

B.贲门癌

C.食管憩室

D.食管结核

E.胃食管反流病

【答案】E

15.男,72岁。体检心电图报告:窦性心律,心率:56次/分。偶发房性早搏,既往无慢性病史,目前无其他不适,对该患者的正确处理是

A.口服阿托品提高心率

B.心动过慢,应进一步检查

C.建议患者安置永久性起搏器

D.不必药物治疗,定期复查心电图

E.口服β受体拮抗剂,治疗房性早搏

【答案】D

16.女,30岁。半个月前因上腹痛就诊,被诊断为:十二指肠溃疡伴幽门螺杆菌感染,已经口服法莫替丁半个月,进一步治疗建议中错误的是

A.可配合口服胃黏膜保护剂

B.持续抗幽门螺杆菌治疗1个月

C.抑酸剂治疗疗程可为1个半月

D.无论溃疡是否愈合均需抗幽门螺杆菌治疗

E.若法莫替丁疗效欠佳,可改用PPI治疗

【答案】B

17.女40岁。上腹部疼痛伴恶心、呕吐7小时,1小时前疼痛转移至右下腹,查体:右下腹压痛,反跳痛(+).化验:血WBC $14.6 \times 10^9/L$,N 0.80。最可能的诊断是

A.急性胃炎

B.急性胰腺炎

C.急性阑尾炎

D.急性胆囊炎

E.急性肠梗阻

【答案】C

18.男,47岁。进食油腻饮食后中上腹持续疼痛7小时,频繁呕吐伴发热,排气排便正常,查体:T 38.7℃,巩膜无黄染,上腹部肌紧张,中上腹压痛(+),Murphy征(-),移动性浊音(-)。化验血WBC $17.1 \times 10^9/L$,立位腹平片检查:膈下未见游离性气体,未见肠管扩张及气液平。最可能的诊断是

A.急性胰腺炎

B.急性胆囊炎

C.胃溃疡穿孔

D.急性心肌梗死

E.绞窄性肠梗阻

【答案】A

19.女,21岁。未婚,月经来潮3小时,下腹疼痛不能平卧2小时,呕吐1次。既往有类似情况,疼痛发生于月经期第一天,第二天自然缓解。盆腔超声检查:子宫及双侧附件未见明显异常。最可能的诊断是

A.异位妊娠

B.急性盆腔炎

C.原发性痛经

D.急性胃肠炎

E.输尿管结石

【答案】C

20.男,34岁。间断水肿3年,加重1个月。既往体健。查体:BP 145/95 mmHg,双下肢中度凹陷性水肿。尿沉渣镜检红细胞10~15/高倍视野,尿蛋白定量2.8 g/h,血肌酐169 $\mu\text{mol/L}$ 。最可能的诊断是

A.肾病综合征

B.糖尿病肾病

配套名师精讲课程

C.高血压肾病

D.慢性肾盂肾炎

E.慢性肾小球肾炎

【答案】E

21.《医院感染管理办法》规定必须达到灭菌水平的医疗器械、器具和物品是

A.就诊场所的桌椅

B.接触黏膜的医疗器具

C.接触皮肤的医疗器械

D.接触双手的医疗物品

E.进入人体组织的医疗器具

【答案】E

22.男, 56岁。2年前因急性下壁心肌梗死接受急诊介入治疗, 手术成功。出院后病情稳定, 在乡镇卫生院接受冠心病 2 级预防。糖尿病病史 10 年, 口服二甲双胍治疗。慢性支气管炎病史 5 年, 近期无发作。患者自觉病情稳定, 提出停药观察。可停用的药物是

A.阿司匹林

B.普伐他汀

C.美托洛尔

D.二甲双胍

E.硝酸异山梨酯(消心痛)

【答案】C

23.男, 56岁。2年前因急性下壁心肌梗死接受急诊介入治疗, 手术成功。出院后病情稳定, 在乡镇卫生院接受冠心病 2 级预防。糖尿病病史 10 年, 口服二甲双胍治疗、慢性支气管炎病史 5 年, 近期无发作。【假设信息】患者近 2 周新出现活动后胸闷, 休息时可缓解。胸痛发作时心电图 V1~V5 导联出现 ST 段水平型下移 0.05~0.1 mV, 含服硝酸甘油可恢复正常。最可能的诊断是

A.左心衰竭

B.稳定性心绞痛

C.急性心肌梗死

- D.不稳定型心绞痛®
E.慢性支气管炎合并肺功能不全

【答案】D

24.男, 56岁。2年前因急性下壁心肌梗死接受急诊介入治疗, 手术成功。出院后病情稳定, 在乡镇卫生院接受冠心病 2 级预防。糖尿病病史 10 年, 口服二甲双胍治疗。慢性支气管炎病史 5 年, 近期无发作。对该患者最恰当的处理是

- A.留院吸氧
B.使用利尿剂
C.使用支气管扩张剂
D.静脉使用硝酸酯类药物
E.尽快转至上级医院诊治

【答案】E

25.女, 32 岁。因发现皮肤出血点和多处瘀斑, 3 天就诊, 既往体健, 门诊化验: 血红蛋白 118, WBC $4.5 \times 10^9/L$, 血小板 $35 \times 10^9/L$ 。目前患者一般不常出现的临床表现是

- A.鼻出血
B.牙龈出血
C.视物模糊
D.月经量增多
E.轻微损伤出血

【答案】C

26.女, 32 岁。因发现皮肤出血点和多处瘀斑 3 天就诊, 既往体健, 门诊化验: 血红蛋白 118, WBC $4.5 \times 10^9/L$, 血小板 $35 \times 10^9/L$ 。目前不恰当的处理是

- A.注意休息
B.避免外伤
C.复查血常规
D.忌用阿司匹林
E.血小板成分输液

【答案】E

27. 女孩, 7 岁, 尿色红 3 天入院。患儿 10 天前曾患“急性扁桃体炎”。查体: BP 130/80 mmHg, 颜面、眼睑水肿, 心肺无异常。尿常规: 蛋白(+), 尿沉渣镜检红细胞 30~40/高倍视野。血清 C3 下降。最可能的诊断是

A. IgA 肾病

B. 泌尿系结核

C. 急性尿路感染

D. 急性肾小球肾炎

E. 原发性肾病综合征

【答案】D

28. 中医学道德传统中, 要求医家对待患者的是

A. 至亲之想

B. 至精至微

C. 一心赴救

D. 端正纯良

E. 谦和谨慎

【答案】A

29. 女, 20 岁。受凉后发热伴鼻塞、流涕、咽痛 3 天。既往反复发作, 经治疗后可好转。对该患者今后预防措施的建议中不正确的是

A. 加强锻炼

B. 避免受凉

C. 避免劳累过度

D. 生活饮食规律

E. 长期口服小剂量抗生素

【答案】E

30. 男, 28 岁。体育锻炼时突然右侧胸痛、胸闷, 伴呼吸困难, 干咳。查体: 右侧触觉语颤消失, 右肺叩诊呈鼓音。最可能的诊断是

配套名师精讲课程

A.自发性气胸

B.急性肺栓塞

C.急性心肌炎

D.急性支气管炎

E.结核性胸膜炎

【答案】A

31.男,29岁。车祸后左上腹疼痛半小时入院,查体:T 36℃,P 120次/分,BP 90/60 mmHg。面色苍白,出冷汗,腹部移动性浊音可疑阳性,为明确诊断最有价值的检查是

A.血常规

B.尿常规

C.消化道内镜

D.腹部X线平片

E.诊断性腹部穿刺

【答案】E

32.某家庭4人在门窗紧闭的室内围着炭火烤炉吃火锅后不久,均出现头痛、头晕、乏力等症状,随后口唇呈樱桃红色,多汗,意识模糊。最可能的原因是

A.砷中毒

B.硫化氢中毒

C.二氧化碳中毒

D.一氧化碳中毒

E.亚硝酸盐中毒

【答案】D

33.属于“阳”的属性的是

A.下降的

B.静止的

C.寒凉的

D.上升的

E.晦暗的

【答案】D

34.主热证的面色多为

A.青色

B.赤色

C.黄色

D.白色

E.黑色

【答案】B

35.主里热亢盛，阴虚火旺的舌象

A.淡白舌

B.淡红舌

C.红舌

D.绛舌

E.青紫舌

【答案】D

36.苔薄白而滑，所主病证是

A.燥热伤津

B.痰热内蕴

C.痰饮、食积

D.外感风热

E.外感寒湿

【答案】E

37.突然感觉怕冷，且体温不高，伴有四肢不温，脘腹冷痛者，其临床意义是

A.风寒表证

B.风热表证

C.里实热证

D.里实寒证

E.里虚热证

【答案】D

38.臀、肋、腰、腹等部位出现刺痛，其临床意义是

A.气滞作痛

B.瘀血致痛

C.寒湿阻滞

D.精血亏虚

E.火邪窜络

【答案】B

39.滑脉的临床意义是

A.表证

B.里证

C.食积

D.疼痛

E.寒证

【答案】C

40.属于表证的症状是

A.腹痛吐泻

B.但热不寒

C.恶寒不热

D.寒热往来

E.发热恶寒

【答案】E

41.循行手上肢内侧前缘的经脉是

A.手太阴肺经

B.手少阴心经

C.手厥阴心包经

D.手阳明大肠经

E.手太阳小肠经

【答案】A

42.不属于普通感冒特征的是

A.恶寒发热

B.呈流行性

C.头身疼痛

D.鼻塞流涕

E.喷嚏频作

【答案】B

43.不属于胁痛瘀血阻络证特点的是

A.胁肋刺痛

B.胸闷腹胀

C.入夜痛甚

D.痛有定处

E.舌质紫暗

【答案】B

44.不寐心肾不交证的治法是

A.疏肝泻火

B.补益心脾

C.滋阴降火

D.益气镇惊

E.安神定志

【答案】C

45.疔病好发的部位是

A.颈部、前臂内侧

B.颜面部、下肢外侧

C.头颈部、上肢外侧

D.前胸、腹部、足部

E.项后发际、背部、臀部

【答案】E

46.关于月经先后无定期的描述错误的是

A.经乱

B.月经愆期

C.月经周期紊乱

D.经水先后无定期

E.月经提前或延后 3 天

【答案】E

47.推拿疗法以清补脾土，清大肠，清小肠，退六腑为原则。治疗小儿泄泻的适应证是

A.风寒泄泻

B.风热泄泻

C.湿热泄泻

D.伤食泄泻

E.脾虚泄泻

【答案】C

48.关于针刺注意事项的叙述正确的是

A.小儿囟门可针刺

B.自发性出血不止的患者，可以针刺

C.皮肤有感染、溃疡、瘢痕的部位可以针刺

D.妇女怀孕 3 个月者可以针刺小腹部的穴位

E.胸、胁、腰、背处腧穴，不宜直刺、深刺

【答案】E

49.中成药与西药合用时，建议采取的方法是

A.先用西药，再用中成药

B.先用中成药，再用西药

C.中成药与西药同时使用

D.中成药与西药间隔使用

E.中成药与西药随意使用

【答案】D

50.不属于儿童用药注意事项的是

A.尽量缩短用药疗程

B.避免滥用滋补类药物

C.应根据体重或年龄计算用药剂量和给药途径

D.禁止使用含有兴奋剂成分的药物

E.尽量避免使用含有毒性较大成分的中成药

【答案】D

51.中成药调服法主要适用的患者是

A.儿童患者

B.老年患者

C.咽痛患者

D.口糜患者

E.神志昏迷患者

【答案】A

52.通宣理肺丸治疗的症状

A.发热恶寒，头痛身重

B.发热恶寒，无汗头痛

C.发热头痛，咳嗽口干

D.高热恶寒，肌肉酸痛

E.发热恶寒，咳嗽咽痒

【答案】B

53.患者着凉后出现咳嗽，痰稀薄色白，咽痒，伴鼻塞，恶寒，发热，苔薄白，脉浮紧，应首选的药物是

A.金荞麦片

B.半夏糖浆

C.橘红痰咳液

D.桂龙咳喘宁胶囊

E.蛇胆川贝枇杷膏

【答案】D

54.患者经行而不畅，色紫暗有块，乳房胀痛，有瘀点，西医诊断为子宫内膜异位症，应首选的中成药是

A.逍遥散

B.痛经丸

C.乌鸡白凤丸

D.少腹逐瘀颗粒

E.血府逐瘀胶囊

【答案】E

55.患者李博研经期小腹冷痛，月经推后，量少，色暗有块，面色青白，肢冷畏寒，舌暗苔白，脉沉紧，其治法是

A.温肾助阳，暖宫止痛

B.补肾扶脾，养血止痛

C.理气行滞，化瘀止痛

D.温经散寒，化瘀止痛

E.散寒利湿，化瘀止痛

【答案】D

56.患者带下量多，质清稀，腰膝酸软，畏寒肢冷，小腹冷感，面色晦暗，小便清长，大便溏薄，舌质淡，苔白，脉沉迟，其治法是

A.温肾培元，固涩止带

B.清利湿热，解毒杀虫

C.清利湿热，固涩止带

D.温肾培元，解毒杀虫

E.温肾培元，清利湿热

【答案】A

57.患者突发左眼睑闭合不全，口角喎斜 3 天，伴头痛恶风，无发热，舌淡红，苔薄白，脉浮，诊断为面瘫，针刺治疗应选取的主穴是

- A.阳白、颧髎、颊车、地仓、翳风、合谷
- B.攒竹、颊车、地仓、风府、列缺
- C.水沟、人中、颊车、地仓、内关、曲池
- D.迎香、瞳子髎、颊车、地仓、神门、后溪
- E.印堂、四白、颊车、地仓、足三里、外关

【答案】A

58.患者右肩部疼痛伴活动不利 1 个月余，肩部疼痛拒按，活动后加重，夜间痛甚，穿衣服、上举困难，伴神疲乏力，纳呆，四肢乏力，舌淡暗，有瘀点，苔白，脉细弱，针刺治疗除局部阿是穴外，还应选取的经穴是

- A.手足少阳经、督脉
- B.手足阳明经、阳跷脉
- C.手足太阳经、奇经八脉
- D.手阳明、手少阳、手太阳经
- E.手太阳、足阳明、足太阳经

【答案】D

59.患者反复发作左肩关节疼痛 2 个月，左上肢抬举受限，肩前部有明显的压痛，遇风寒痛增，得温痛缓，畏风恶寒，舌淡苔白，脉缓。刺络拔罐治疗的方法是

- A.梅花针叩刺远端穴，使少量出血，加拔罐
- B.三棱针点刺肩髃穴，使少量出血，加拔罐
- C.皮肤针叩刺肩部压痛点，使少量出血，加拔罐
- D.皮肤针叩刺肩关节周围，使少量出血，加拔罐
- E.肩部拔罐后，再用皮肤针叩刺拔罐处，使少量出血

【答案】C

60.患者于 2017 年 7 月 15 日就诊，身热，汗出不解，鼻塞流浊涕，头昏胀痛，身重倦怠，心烦口渴，胸闷欲呕，大便秘结，小便短赤，舌苔薄黄而腻，脉濡数，其治法是

A.疏风宣肺散寒

B.宣肺祛邪利气

C.辛温解表散寒

D.清暑祛湿解表

E.辛凉解表清热

【答案】D

61.根据《中医药条例》的要求，对中药材资源管理的规定描述不正确的是

A.促进短缺中药材的生产

B.保护野生药材资源，禁止利用

C.鼓励建立中药材培育、种植基地

D.鼓励开发濒危动植物中药材人工代用品

E.县以上地方人民政府应加强中药材的合理开发

【答案】B

62.《中药品种保护条例》规定在保护期内的中药保护品种向国外申请注册的部门是

A.省级中医药管理部门

B.省级药品监督管理部门

C.国务院中医药管理部门

D.国务院卫生计生管理部门

E.国务院药品监督管理部门

【答案】E

62.不属于中医预防与养生保健基本原则的是

A.定期检查，见微知著

B.健脾补肾，防病未然

C.重视先兆，截断逆转

D.安其未病，防其所传

E.三因制宜，各司法度

【答案】B

63.属于中医药预防与养生保健主要服务方式的是

- A. 适量运动
- B. 针对季节性易感疾病开展中医药教育
- C. 孕期保健
- D. 开展“治未病”服务
- E. 冬病夏治、夏病冬治

【答案】E

64. 下列哪项不属于在社区中开展中医药养生保健科普活动，传授养生保健和健康生活方式的运动

- A. 扇舞
- B. 瑜伽
- C. 五禽戏
- D. 八段锦
- E. 太极拳

【答案】B

65. 在流感易发期可采取的中医干预措施是

- A. 情志调摄
- B. 中药熏鼻
- C. 开展食疗
- D. 指导运动训练
- E. 发放板蓝根等中药煎水服用

【答案】E

66. 产后恶露不净者可服食的药膳是

- A. 猪蹄汤
- B. 羊肝粥
- C. 猪腰子菜末粥
- D. 山药扁豆粳米粥
- E. 当归生姜羊肉汤

【答案】E

67.根据《国家基本公共卫生服务规范》要求,乡镇卫生院和村卫生室每个机构每年提供的健康教育印刷材料不少于

- A.6 种
- B.8 种
- C.10 种
- D.12 种
- E.20 种

【答案】D

68.不属于艾滋病高危人群的是

- A.吸毒
- B.同性恋
- C.年轻学生
- D.卖淫
- E.艾滋病家属

【答案】C

69.不属于中医养生保健常用方法的是

- A.时令养生
- B.辟谷养生
- C.情志养生
- D.经穴养生
- E.运动养生

【答案】B

70.导致传染病人群易感性降低的因素是

- A.隐性感染
- B.新生儿增加
- C.免疫力消退
- D.易感人口迁入
- E.免疫力人口死亡

【答案】A

71.属于影响传染病流行过程的自然因素是

A.生活水平

B.文化水平

C.人口移动

D.气候变化

E.卫生习惯

【答案】D

72.保护乙型脑炎易感人群最有效的措施是

A.隔离

B.消毒

C.杀虫

D.中药预防

E.预防接种

【答案】E

73.某村医发现 1 例疑似风疹病例，但该村卫生室不具备网络直报条件，该村医填写好传染病报告卡后正确的做法是

A.无条件就不需要网络直报

B.等以后有网络直报条件再报告

C.只需将传染病报告卡存档备查

D.传染病报告卡传真或者送至属地乡镇卫生院代报

E.让家属带传染病报告卡去当地疾病预防控制中心报告

【答案】D

74.医生为急性乙型肝炎患者肌内注射后，手指不慎被针头刺伤，该医生应立即采取的措施是

A.针灸治疗

B.接种乙肝疫苗

C.注射丙种球蛋白

- D. 抗生素预防服药®
E. 注射乙肝免疫球蛋白

【答案】E

75. 某幼儿在预防接种门诊接种麻疹疫苗 9 天, 被市儿童医院诊断为过敏性紫癜, 该门诊及时进行了报告。不属于该案例报告内容的是

- A. 上报单位
B. 一般基本情况
C. 父母健康状况
D. 临床症状及诊断
E. 接种疫苗基本情况

【答案】C

76. 某小学因发生麻疹疫情, 对一年级全部 135 名学生接种麻疹疫苗, 接种后 1 小时, 一年级 3 班 32 名学生中, 7 人陆续出现头晕、头痛、乏力、恶心、手麻等不适症状, 其他各班未出现上述情况。一年级 3 班最可能的疑似预防接种异常反应是

- A. 全身反应®
B. 一般反应
C. 疫苗事故
D. 接种事故
E. 心因性反应

【答案】D

77. 某年 6 月, 某村民李博研在家自办宴席, 就餐者 60 人, 随后陆续有 16 人出现腹痛、腹泻, 为黏液脓血便, 伴里急后重, 患者被诊断为细菌性痢疾。经调查, 该村环境卫生较差, 苍蝇较多, 使用镇水厂统一供水, 未就餐者无发病, 就餐者中未食用凉菜者无发病。此案例中, 主要传播途径是

- A. 经体液传播
B. 经食物传播
C. 经接触传播
D. 经虫媒传播

E.经土壤传播

【答案】B

78.某年 6 月,某村民李博研在家自办宴席,就餐者 60 人,随后陆续有 16 人出现腹痛、腹泻,为黏液脓血便,伴里急后重,患者被诊断为细菌性痢疾。经调查,该村环境卫生较差,苍蝇较多,使用镇水厂统一供水,未就餐者无发病,就餐者中未食用凉菜者无发病。如对该村民家庭进行卫生处理,正确的方式是

A.先消毒后灭苍蝇

B.先采集样品再消毒

C.重点做好空气消毒

D.消毒顺序为先内后外

E.先消毒污染房间再消毒清洁房间

【答案】B

79.高血压患者健康管理的服务对象是

A.辖区内 18 岁及以上原发性高血压患者

B.辖区内 35 岁及以上原发性高血压患者

C.辖区内 35 岁及以上继发性高血压患者

D.辖区内 65 岁及以上原发性高血压患者

E.辖区内 65 岁及以上继发性高血压患者

【答案】B

80.男,40 岁。自测血压升高 2 周,多次测量均为 150/90 mmHg 左右,无不适症状,既往无高血压病史,首诊医生处理不正确的是

A.体格检查

B.做心电图

C.检查尿常规

D.检查电解质、肾功能

E.建议口服降压药物治疗

【答案】E

81.对确诊的 2 型糖尿病患者,按要求每年提供面对面随访的次数至少是

A.8次

B.6次

C.4次

D.3次

E.2次

【答案】C

82.不属于中风常见病因的是

A.劳逸失度

B.情志不遂

C.饮酒饱食

D.外邪侵袭

E.房事不节

【答案】E

83.中风中经络的辨证干预原则是

A.救阴回阳固脱

B.息风清火，豁痰开窍

C.化痰祛瘀，滋养肝肾

D.通腑泄热，醒神开窍

E.平肝息风，化痰祛瘀通络

【答案】E

84.属于痹证常见病因的是

A.饮酒过量

B.外邪侵表

C.情绪波动

D.过度吸烟

E.经常熬夜

【答案】B

85.治疗痹证，在祛邪通络的基础上治湿宜结合的方法是

A.温阳补火

B.补益肝肾

C.健脾益气

D.祛风散寒

E.活血通络

【答案】C

86.女,68岁。在老年人年度体检中被诊断为2型糖尿病,检查结果:空腹血糖 10.2 mmol/L,餐后2小时血糖为 16.9 mmol/L,BP 162/110 mmHg,根据患者情况,医生进行预防管理的内容不包括

A.了解患者用药情况

B.建议患者做血常规检查

C.询问患者病情及生活方式

D.测量体重,计算 BMI,检查足背动脉搏动

E.测量空腹血糖和血压,并评估是否存在危机情况

【答案】B

87.医生在对高血压患者随访过程中,对连续2次出现原有并发症加重的患者,建议其转诊到上级医院。患者转诊后该医生主动随访转诊情况的时间不能超过

A.3天

B.7天

C.14天

D.30天

E.60天

【答案】C

88.按照《国家基本公共卫生服务规范》要求,应该建立居民健康档案的人群是

A.临时在某社区居住超过2个月

B.临时在某社区居住超过4个月

C.户籍迁到某社区并且居住超过2个月

D.户籍迁到某社区并且居住超过4个月

E.户籍迁到某社区并且居住超过 6 个月

【答案】E

89.按照《国家基本公共卫生服务规范》中关于学龄前儿童健康管理的要求，血常规检查的频次为

A.每 3 个月一次

B.每 6 个月一次

C.每 12 个月一次

D.每 18 个月一次

E.每 24 个月一次

【答案】C

90.按照小儿年龄分期，22 月龄小儿处于

A.新生儿期

B.婴儿期

C.婴儿晚期

D.幼儿期

E.学龄前期

【答案】D

91.医疗保健机构提供孕产期保健服务的时间范围是从准备妊娠开始至产后

A.7 天

B.14 天

C.28 天

D.42 天

E.56 天

【答案】D

92.老年人健康管理服务的内容不包括

A.疾病治疗

B.健康指导

C.生活方式评估

- D.健康状况评估
- E.生活自理能力评估

【答案】A

93.基本公共卫生服务中所有的严重精神障碍不包括

- A.双相障碍
- B.精神分裂症
- C.脑器质精神病
- D.癫痫所致精神病
- E.精神发育迟滞伴发精神病

【答案】C

94.根据《中国老年人膳食指南》要求,某乡镇卫生院对辖区老年人进行合理膳食的健康指导,其合理膳食的建议不包括

- A.根据喜好安排饮食
- B.控制食盐及油脂的摄入
- C.重视预防营养不良和贫血
- D.合理安排饮食,提高生活质量
- E.食物粗细搭配,松软,易于消化吸收

【答案】A

95.平和质的形体特征是

- A.肌肉松软不实
- B.体型匀称健壮
- C.形体瘦者为多
- D.形体中等或偏瘦
- E.体型肥胖,腹部肥满松软

【答案】B

96.按揉四神聪穴的功效是

- A.消食化积
- B.醒神益智

C.健脾和胃

D.疏通经络

E.宣通鼻窍

【答案】B

97.男，50岁。癫痫所致精神障碍患者，居家治疗30年，随访时家属报告患者睡眠颠倒，记忆力差，经常怀疑其外甥偷拿自己的东西，本次随访可记录的症状是

A.猜疑

B.意识障碍

C.夸大妄想

D.思维刻板

E.无自知力

【答案】A

98.室内空气污染物的来源，不包括

A.装饰材料

B.建筑材料

C.交通噪音

D.人的活动

E.燃料燃烧

【答案】C

99.某地开展宣传，动员农民参加新农合，农民以家庭为单位参加，并缴纳一定的费用，乡镇、村集体以及各级人员政府再给予一定的经费支持，该举措符合的新农合医疗制度原则是

A.便民、利民、为民

B.以收定支，保障适度

C.自愿参加，多方筹资

D.先行试点，逐步推广

E.积极推进农村医疗卫生体制改革

【答案】C

100.按照现代医学心理学的观点，原发性高血压、冠心病、消化性溃疡等疾病所属类型是

A.躯体疾病

B.心身疾病

C.精神疾病

D.心理障碍

E.行为障碍

【答案】B