

基础知识

题号	预测题干	预测答案	星级考点 (★) 最高五星
1	全科医疗与专科医疗的区别	提供以急诊及住院的服务	★ ★ ★ ★
2	全科医学与全科医疗取得良好效果的关键是	良好的医患关系	★ ★ ★ ★
3	全科医学的理论基础是	生物—心理—社会医学模式	★ ★ ★ ★
4	以下哪项不是全科医疗的特征	以疾病为中心	★ ★ ★ ★
5	社区卫生诊断专项调查内容	卫生人员满意度调查、居民卫生调查、服务对象满意度	★ ★
6	疾病的三间分布	年龄分布、季节分布、地区分布	★ ★
7	初级卫生保健的特征	社会性、群众性、艰巨性、长期性	★ ★
8	流行病学研究方法使用最多的是	观察法	
9	流行病学研究中所指的群体是	一定范围内的人群	★ ★ ★ ★
10	在统计学中, 定量指标是指	数值变量	★ ★ ★
11	均数与标准差适用于	正态分布	★ ★ ★
12	中位数与四分位间距	偏态分布资料	★ ★ ★
13	变异系数越大说明	以均数为准变异程度大	★ ★ ★
14	社区卫生诊断的基本原则	政府主导原则、科学完整原则、适宜可行原则、求实特异原则	★ ★
15	某地区在一周内进行高血压的普查, 可以计算当地高血压的	患病率	★ ★ ★ ★
16	暴发调查常用的流行病学的指标是	罹患率	★ ★ ★ ★
17	关于传播的叙述错误的是	传播是一种单向行为	★ ★ ★ ★
18	反映小儿营养状况最易获得的灵敏指标是	体重	★ ★ ★ ★
19	出生后半年身长每月平均增长	1.5cm	★ ★ ★ ★
20	一个5岁儿童的正常身高、体重约为	105cm、18Kg	★ ★ ★ ★
21	觅食反射消失的年龄为	3-4个月	★ ★

22	小儿何月龄克氏征阳性是正常的	3-4 个月前	★ ★
23	小儿有主动有意识地叫“爸爸”、“妈妈”的年龄是	10 个月	★ ★
24	有关全科医学的主旨,说法正确的是	以人为中心, 以家庭为单位	★ ★ ★ ★
25	全科医学从其特征来看,是一门	即是基础学科又是临床学科	★ ★ ★ ★
26	下列表示疾病流行强度的术语是	散发、暴发、流行、大流行	★ ★ ★ ★
27	均数与标准差之间的关系是	标准差越小, 均数代表性越大	★ ★ ★ ★
28	卡介苗的初种年龄	出生 2 天--2 个月	★ ★ ★ ★
29	脊髓灰质炎初种的年龄应是	2 个月	★ ★ ★
30	百白破的初种年龄应是	3 个月	★ ★ ★
31	出生前半年身长每月平均增长	2.5cm	★ ★ ★
32	若出生体重为 3.5Kg, 一个 4 个月大的婴儿体重大约为	6.7Kg	★ ★ ★
33	健康促进的主体是	社会各个领域和部门	★ ★ ★
34	健康教育要提供人们行为改变所必须的	知识、技能与服务	★ ★ ★ ★
35	下列关于人际传播叙述正确的是	是一种双向传播	★ ★ ★ ★
36	以下不属于传播的六要素之一的是	时间	★ ★ ★ ★
37	传播关系的三个基本条件是	共同的经验范围、契约关系、反馈	★ ★
38	不属于影响传播效果的因素的是	传播时机	★ ★ ★ ★
39	人胚胎发育中对致畸物最敏感的阶段是受孕	3-8 周	★ ★
40	产妇系统管理是指以下哪个时期内的管理	从妊娠早期开始到产后 6 周末	★ ★ ★ ★
41	孕妇整个妊娠期的体重增加平均为	12.5Kg	★ ★
42	孕妇蛋白质需要量的高峰期是妊娠	后 10 周	★ ★ ★ ★
43	产褥期的时间为产后	6 周	★ ★
44	产褥期变化最大的器官是	子宫	★ ★ ★

45	产后开始学习和练习护理孩子，约在产后	3-14 天	★ ★
46	下列哪一量表主要通过 14 项日常生活状态来评定被试者的日常生活能力	日常生活能力量表	★ ★
47	关于合理用药，叙述正确的是	应用同一的治疗方案	★ ★
48	下部量过长见于	生殖腺功能不全症	★ ★ ★
49	药物在体内开始作用的快慢取决于	吸收	★ ★
50	下列哪项不是婴儿期保健的重点	保温	★ ★ ★

相关专业知

题号	预测题干	预测答案	星级考点 (★) 最高五星
1	早期流产最常见的原因是	胎儿染色体异常	★ ★ ★ ★
2	流产治疗的恰当是	流产感染应立即刮宫清除宫腔内组织	★ ★ ★ ★
3	先兆流产恰当的出来是	卧床休息	★ ★
4	足月新生儿生理性黄疸多发生于	生后 2-5 天出现黄疸，10-14 天消退	★ ★ ★
5	新生儿胆红素生成过多的原因不是	新生儿经常处于饥饿、缺氧的状态	★ ★ ★ ★
6	新生儿破伤风治疗的原则不包括	出生后马上打预防针	★ ★ ★ ★
7	下列细菌性角膜溃疡发展最迅速的是	铜绿假单胞性角膜溃疡	★ ★ ★
8	角膜病致盲原因中占首位的是	单纯疱疹病毒性角膜炎	★ ★ ★
9	睑缘炎的常见原因不包括	老年人	★ ★ ★
10	发现患者存在意识障碍的重要标志是	定向力障碍	★ ★ ★
11	下列哪种症状不是精神分裂症的特征性症状	思维不连贯	★ ★ ★ ★
12	精神分裂症的情感障碍主要表现为	情感不协调	★ ★ ★ ★
13	康复的手段主要是	功能训练	★ ★ ★
14	下列属于反治法则的是	热因热用	★ ★ ★
15	尿常规分析标本必须在多长时间内完成检验	2h	★ ★ ★ ★

16	我国恶性肿瘤发病率第一位的是	肺癌	★ ★
17	肿瘤的 TNM 分期中, M 是指	远处转移情况	★ ★ ★
18	关于 CT 值的描述, 哪项是错误的	CT 值没有单位	★ ★
19	属于卵巢良性肿瘤的是	卵泡膜细胞瘤	★ ★ ★
20	治疗新生儿破伤风, 首选的抗生素是	青霉素	★ ★ ★ ★
21	引起疱疹性咽峡炎的病原体是	柯萨奇病毒	★ ★ ★ ★
22	一般不做鼻咽活检的是	鼻咽纤维血管瘤	★ ★
23	冻疮皮损一般不会出现	风团	★ ★ ★
24	心境障碍的临床分型不包括	木僵	★ ★ ★
25	重度抑郁发作的睡眠障碍的主要特点是	早醒	★ ★ ★
26	游离性胸腔积液在胸部 X 线平片上可见到, 一般体积应为	300ml	★ ★ ★ ★
27	诊断青光眼应选择上述那种检查	眼压和前房角镜	★ ★
28	引起咽结合膜热的病原体是	腺病毒	★ ★ ★
29	视网膜深层出血呈圆点状, 色暗红, 位于	外丛状层和内核层之间	★ ★ ★ ★
30	怀疑食管异物时, 应首先做哪项检查	食管钡餐 X 线检查	★ ★ ★ ★
31	星烁征可见于	急性化脓性中耳炎	★ ★ ★ ★
32	脑卒中偏瘫的功能训练主要靠	患肢的主动活动	★ ★
33	解表药的煎法是	武火急煎	★ ★
34	下列对胰腺癌诊断最有价值的肿瘤相关抗原是	CA19-9	★ ★
35	原发性肝癌最易转移的脏器是	肝内	★ ★
36	风湿性心脏病二尖瓣狭窄时, 心形呈	梨形	★ ★ ★
37	胃溃疡好发于	胃窦部小弯侧	★ ★ ★
38	儿童传染性软疣好发部位为	手背、四肢、躯干及面部	★ ★ ★ ★
39	传染性软疣的特征性皮损是	半球形丘疹, 中央有脐凹, 蜡样光泽	★ ★ ★

40	带状疱疹的病原微生物为	水痘——带状疱疹病毒	★ ★ ★
41	关于手癣下列说法不正确的是	皮损多对称发生	★ ★ ★ ★ ★
42	关于体癣,下列说法错误的是	皮损初起为大水疱	★ ★ ★
43	慢性湿疹不正确的描述是	无渗出倾向	★ ★ ★ ★
44	关于难免流产哪项是错误的	有部分胎盘嵌顿于宫颈口,部分胎盘排出	★ ★ ★
45	新生儿惊厥最常见的原因是	新生儿缺血缺氧性脑病	★ ★ ★
46	夏秋劳作时,被植物擦伤角膜应高度警惕发展为	真菌性角膜炎	★ ★
47	阻塞性呼吸暂停是指在7小时睡眠中,呼吸暂停在	30次以上	★ ★ ★
48	食管异物最好发的部位是	食管入口	★ ★ ★
49	下列哪项不是慢性龈缘炎的病因	牙齿慢性磨损	★ ★ ★ ★
50	痤疮的最主要好发部位为	面部	★ ★ ★

专业知识

题号	预测题干	预测答案	星级考点 (★) 最高五星
1	稽留热常见于下列哪个疾病	伤寒	★ ★ ★ ★
2	体温常在 39℃以上,波动幅度大,24 小时内波动范围超过 2℃,但都在正常水平以上的是	弛张热	★ ★ ★
3	弛张热最常见于下列哪项疾病	败血症	★ ★ ★ ★
4	短暂性脑缺血发作导致的神经功能缺损症状、体征应在多少小时内完全消失	24 小时	★ ★ ★
5	不属于短暂性脑缺血发作的高危因素是	脑动脉瘤	★ ★ ★
6	符合短暂性脑缺血发作影像学改变的是	MRI 弥散加权成像高信号	★ ★
7	脑血栓形成最重要的临床表现	安静中发病	★ ★ ★
8	用刺激迷走神经的方法可以终止哪种心律失常	阵发性室上性心动过速	★ ★
9	急性上呼吸道感染最常见的病原体是	病毒	★ ★ ★

10	支气管哮喘的本质是	气道慢性炎症	★ ★ ★ ★
11	控制支气管哮喘的首选药物	糖皮质激素	★ ★ ★ ★
12	食管癌最常见的好发部位	中段	★ ★
13	糖尿病患者失明的主要原因是	视网膜剥离	★ ★ ★
14	主要通过增加外周组织对葡萄糖摄取和利用降糖药物是	双胍类	★ ★ ★
15	下列有关风湿性疾病的描述,哪项是错误的	风湿性关节炎常导致关节畸形	★ ★ ★
16	传染病的基本特征是	有感染中毒症状	★ ★
17	发生腹腔脏器实质性破裂时,最主要的临床表现是	内出血征象	★ ★ ★
18	影响心搏骤停患者预后最主要的因素是	开始 CPR 的时间	★ ★ ★
19	心搏骤停最常见的原因	冠心病	★ ★ ★
20	心肺复苏用药首选	肾上腺素	★ ★ ★
21	脑栓塞的病因中最常见的是	心源性栓子	★ ★ ★ ★
22	高血压脑出血最常见的部位	基底节区	★ ★ ★
23	蛛网膜下腔出血最常见的病因	先天性动脉瘤	★ ★ ★
24	慢性肺源性心脏病心衰时,以下哪项是右心扩大的体征	剑突下抬举样搏动	★ ★ ★
25	再生障碍性贫血病因不包括	碳酸锂	★ ★ ★
26	哪项不是甲状腺功能亢进的患者的临床表现	便秘	★ ★ ★
27	Graves 病良性突眼的原因主要是	上眼睑肌的痉挛和回缩	★ ★
28	关于风湿热错误的是	风湿热是金葡菌感染引起的一种疾病	★ ★ ★
29	下列哪种肝炎病毒基因组为 DNA	乙型肝炎	★ ★ ★
30	以下哪种疾病不宜做膀胱镜检查	尿道狭窄	★ ★ ★
31	内脏痛觉的冲动主要是由于哪种神经传导的	交感神经	★ ★
32	椎-基底动脉 TIA 一般不出现	一过性黑矇	★ ★
33	急性心肌梗死合并三度房室传导阻滞时,最好使用	临时心脏起搏器	★ ★ ★
34	最早能反应急性心肌梗死发生的酶学检查是	血清肌红蛋白	★ ★ ★

35	医院获得性肺炎最常见的致病菌是	革兰氏阴性杆菌	★ ★ ★
36	慢性肾小球肾炎治疗的主要目的是	延缓肾功能衰退	★ ★
37	再生障碍性贫血典型的血象特点为	全血细胞减少	★ ★ ★
38	有关对痛风的描述，不正确的是	尿酸生成过多是导致高尿酸血症的主要因素	★ ★ ★
39	类风湿关节炎最先受累的组织是	滑膜组织	★ ★ ★ ★
40	点击伤是指	电与人体接触造成的损伤	★
41	上呼吸道感染治疗原则不正确	早期应用抗生素	★ ★
42	肺栓塞血症的栓子多来源于	下肢深静脉	★ ★ ★
43	血源性肺脓肿的常见病原菌	金黄色葡萄球菌	★ ★
44	尿毒症患者高血压最常见的原因是	水钠潴留	★ ★ ★
45	成人型多囊肾是	常染色体显性遗传	★ ★ ★
46	反应机体缺铁最敏感的指标为	血清铁蛋白	★ ★ ★
47	缺铁性贫血治疗的目标为	血清铁蛋白恢复正常	★ ★
48	淡漠型甲亢，那一项是错误的	病情较轻，不易发生甲状腺危象	★ ★
49	霍乱最重要的传播途径是	水型传播	★ ★
50	流行性出血热病理改变最明显的地方是	肾脏	★ ★ ★

专业实践能力

题号	预测题干	预测答案	星级考点 (★)最高五星
1	女性，24岁未孕，月经规律，曾有盆腔炎史，现停经34天，阴道出血淋漓7天，下腹痛3小时就诊。为确诊首选做的检查	妇科检查、尿妊娠试验、血hCG、B超了解子宫及双附件的情况	★ ★ ★ ★
2	应与哪些疾病相鉴别	先兆流产、不全流产、功血	★ ★ ★
3	最可能诊断	异位妊娠	★ ★
4	下一步应做的处理	立即行剖腹探查术	★ ★ ★
5	男性，50岁，既往有胃溃疡病史10年，口服药物无效，考虑何种疾病	胃溃疡癌变	★ ★

6	需做哪些检查进一步鉴别	X线钡餐检查、内镜超声检查、胃镜检查结合活检	★ ★
7	胃癌的并发症有	呕血、贲门梗阻、幽门梗阻、贫血	★ ★
8	患者，男性，68岁，冠脉造影后出现恶心、食欲缺乏。尿量350ml/24h, BP:140/80mmHg, 血红蛋白118g/l, 血尿素氮22mmol/l, 肌酐230umol/l。		★ ★ ★
9	临床初步诊断可能为	急性肾衰竭，少尿期	★ ★ ★
10	导致该患者肾脏损伤最可能原因是	肾脏中毒导致肾小管坏死	★ ★
11	病情继续发展，可能会出现哪些临床表现	水、电解质和酸碱平衡紊乱，血肌酐和尿素氮继续升高、全身各系统并发症	★ ★ ★
12	患者，男性，45岁，1小时前饮酒后出现头痛，全身抽搐约2分钟，考虑哪些疾病	病毒性脑炎、脑栓塞、蛛网膜下腔出血	★ ★
13	右侧内囊后肢受损，可能出现的病症是	双眼左侧半视野偏盲	★ ★ ★
14	应用尿激酶早期溶栓是指脑梗死后多少小时内溶栓	6小时	★ ★
15	患者，男，25岁，右足癣并感染1周2天气出血右小腿有片状红疹，颜色鲜红，中间较淡，边缘清楚，右腹股沟淋巴结肿大，该病考虑	丹毒	★ ★ ★
16	该治病菌是	溶血性链球菌	★ ★
17	为预防复发在全身和局部症状消失后仍继续使用抗生素	3-5天	★ ★ ★
18	患者，男性，乙肝病史10年，近1月出现牙龈出血增多，乏力、尿少，考虑哪种疾病	肝硬化	★ ★
19	牙龈出血最可能的原因	肝合成凝血因子减少	★ ★
20	尿量减少的原因是	腹水	★ ★ ★
21	支气管哮喘急性发作，不推荐使用哪种药物	长效β肾上腺素受体激动剂	★ ★ ★
22	支气管肺炎自行消失的时间	3-4周	★ ★ ★
23	肺炎链球菌肺炎抗菌治疗首选	青霉素	★ ★
24	干性支气管扩张主要临床表现	长期反复咯血	★ ★

25	鳞癌的肺外表现可见	杵状指	★ ★
26	引起糜烂出血性胃炎的常见药物是	吲哚美辛	★ ★ ★
27	慢性胃炎，有胆汁返流，治疗上最好用	甲氧氯普胺	★ ★
28	浅表性胃窦炎胃镜下所见，错误的是	粘膜皱襞变平或变细	★ ★ ★
29	中性粒细胞碱性磷酸酶积分明显减低常见于	慢性粒细胞白血病	★ ★
30	淋巴瘤最典型的临床表现是	无痛性、进行性淋巴结肿大	★ ★
31	慢性肺源性心脏病患者急性加重期慎用	镇静剂	★ ★ ★
32	对脑血管具有较强扩张作用的钙拮抗药是	尼莫地平	★ ★ ★
33	哪项不是主动脉瓣关闭不全的周围血管征	脉短绌	★ ★ ★
34	隐睾对人体的危害不包括	影响患儿的生长发育	★ ★ ★
35	下腹部、会阴部手术后，缝线拆除时间一般为	术后 6-7 天	★ ★
36	健康成人一次性失血代偿极限是	800ml	★ ★
37	自发性气胸的诱因，常见以下哪项	剧咳、用力屏气、剧烈运动、提取重物	★ ★ ★ ★
38	挤压综合征主要是伤后出现	肾衰竭	★ ★ ★ ★
39	无痛性间歇性肉眼血尿常见于	膀胱肿瘤	★ ★ ★
40	破伤风患者注射大量破伤风抗毒素的目的是	中和游离毒素	★ ★
41	老年人发生大肠梗阻时，首先想到的疾病是	肿瘤	★ ★
42	考核抗结核疗效的主要指标	痰菌转阴	★ ★ ★
43	我国规定管理的传染病是	三大类 35 种	★ ★ ★
44	用于某些传染病的早期诊断的免疫学检查，主要测定血清中的	IgM	★ ★
45	不属于弥漫性结缔组织病的是	强直性脊柱炎	★ ★
46	系统性红斑狼疮患者典型的皮肤损害为	面部蝶形红斑	★ ★ ★
47	使用环磷酰胺治疗系统性红斑狼疮的指征是	肾炎	★ ★ ★
48	风湿热最常见的皮肤表现	皮下结节	★ ★ ★

49	风湿热的发病年龄多见于	5-15 岁	★ ★ ★
50	在我国，诱发再障性贫血的主要原因	药物滥用	★ ★

金英杰医学教育