

## 护考知识点总结 ---珍藏版

001. 食管癌最主要的转移途径是（淋巴转移）
002. 食管癌患者最典型的临床表现是（进行性吞咽困难）
003. 护士应指导入院准备手术的食管癌患者的饮食为（高热量、高蛋白、高维生素半流食）
004. 某患者因胃癌行胃大部切除术。术后第一天除生命体征外，护士最应重点观察的是（胃管引流液）
005. 在我国诱发原发性肝癌最主要的疾病是（乙型肝炎）
006. 原发性肝癌肝区疼痛的特点是（持续性胀痛）
007. 原发性肝癌患者最常见和最主要的症状是（肝区疼痛）
008. 严重肝脏疾病病人手术前，最需要补充的维生素是（维生素 K）
009. 胰腺癌的好发部位是（胰头）
020. 患者，女性，56岁。诊断胰头癌入院。住院行胰头十二指肠切除术，术后出现高血糖。出院饮食指导原则正确的是（低脂、高糖、高维生素）
022. 直肠癌的早期症状是（排便习惯改变）
023. 直肠癌最简便有效的检查是（直肠指检）
024. 患者，男性，45岁。直肠癌行根治术（Miles术）后，造口周围皮肤保护的健康指导不包括（常规使用乙醇清洁）
025. 患者，男性，55岁。因直肠癌入院治疗，择期行结肠造口。错误的宣教内容是（术后5天左右开放造口）
026. 结肠造口患者出院后可以进食的蔬菜是（菜花）
027. 泌尿系肿瘤患者排尿的特点是（无痛性全程肉眼血尿）
028. 诊断膀胱癌最可靠的方法是（膀胱镜和活组织检查）
029. 膀胱癌手术后留置导尿管的护理中，错误的是（导尿管每日更换一次）
030. 患者，女性，40岁。因患子宫肌瘤入院。护士在采集病史时，应重点追溯的内容是（是否长期使用雌激素）
031. 患者，女性，42岁。患有子宫肌瘤，引起经量增多，与经期延长最密切的因素是（肌瘤的生长部位）
032. 葡萄胎患者清宫术后，护士对其健康教育，错误的是（行安全期避孕）
033. 5-氟尿嘧啶化疗，可能出现的最严重的不良反应是（骨髓抑制）
034. 急性白血病患者出血的主要原因是（血小板质和量的异常）
035. 急性白血病患者出现血小板 $<20 \times 10^9 / L$ 时，应着重观察患者的（颅内出血征兆）

036. 患者，男性，55岁。患急性淋巴细胞白血病。医嘱静脉推注长春新碱。护理措施错误的是（**输注时若发现外渗，立即拔针**）
037. 在环磷酰胺化疗期间要特别加强监测的项目是（**血常规**）
038. 慢性粒细胞白血病患者脾大至脐平，护士健康指导时应向患者特别强调的是（**避免腹部受压**）
039. 骨肉瘤最容易发生转移的脏器是（**肺**）
040. 护士给予颅内肿瘤病人床头抬高 $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$ ，其主要目的是（**有利于颅内静脉回流**）
041. 乳腺癌特征性的乳腺体征是（**肿块**）
042. 患者，女性，34岁。为左侧乳腺癌根治术后第2天，左上肢康复训练中正确的是（**作转绳运动**）
043. 乳腺癌患者乳房皮肤出现“橘皮样”改变，是由于（**癌细胞堵塞皮下淋巴管**）
044. 乳腺癌患者术后第2天，护理措施不正确的是（**指导患侧肩关节的活动**）
045. 原发性支气管肺癌的起源部位是（**支气管腺体或黏膜**）
046. 胰腺癌患者拟行手术治疗，术前给予注射胰岛素的作用是（控制血糖）
047. 行肾部分切除术后2天的患者，绝对卧床休息的主要目的是（防止出血）
048. 因膀胱癌行保留膀胱术的患者，术后应用膀胱灌注法治疗预防肿瘤复发。常用的灌注药物为（卡介苗）
049. 子宫颈刮片细胞学检查结果为巴氏Ⅲ级的意义是（可疑癌症）
050. 引起足趾麻木、腱反射消失等神经炎副作用的化疗药物为（长春新碱）
051. 应用柔红霉素等化疗药物后，护士应重点观察的副作用是（心脏毒性）
052. 在对乳腺癌患者进行护理评估时，应重点关注的部位是（腋窝）
053. 乳腺癌扩大根治术后咨询护士可以妊娠的时间是术后（5年）
054. 支气管鳞状细胞肺癌最常见的类型是（中央型）
055. 患者治疗过程中，白细胞低于多少时应停止化疗或减量（ $3.5\times 10^9/L$ ）