

# 国家执业药师资格考试药学综合知识与技能 高频必备50考点

考点1.是否有重复用药现象——中成药含化学药成分

## 【降糖药】

消渴丸、消糖灵胶囊;格列本脲

## 【降压药】

降压避风片、脉君安片、珍菊降压片(可乐定);氢氯噻嗪

## 【抗感冒药】

(1)“感”、维C银翘片、银菊清热片、复方大青叶;对乙酰氨基酚、氯苯那敏

(2)速克感冒片、菊蓝抗流感片、金羚感冒片;阿司匹林、氯苯那敏

(3)新癆片;吡哌美辛

## 【维生素】

(1)脂降宁片、冠通片、脉络通颗粒;维生素C

(2)益康胶囊、维尔康胶囊、于金康胶囊(片);维生素E

考点2.药物相互作用对药效学的影响

(1)作用相加或增加疗效

①作用不同的靶位:SMZ+TMP(磺胺甲噁唑+甲氧苄啶);阿托品+胆碱酯酶复活药;甲氧氯普胺+硫酸镁;普萘洛尔+美西律

②保护药品免受破坏:亚胺培南+西司他丁; $\beta$ -内酰胺类+ $\beta$ -内酰胺酶抑制剂;左旋多巴+苄丝肼/卡比多巴

③促进吸收:铁剂+维生素C

④延缓或降低抗药性:青蒿素/磷霉素+乙胺嘧啶/磺胺多辛;磷霉素+大环内酯类/氨基糖苷类/ $\beta$ -内酰胺类/氟喹诺酮类

(2)减少药品不良反应:普萘洛尔+硝酸酯类;普萘洛尔+硝苯地平;普萘洛尔+阿托品;阿托品+吗啡

(3)敏感化作用:排钾利尿剂(氢氯噻嗪)+强心苷类;利血平/胍乙啶+拟肾上腺素药

(4)拮抗作用:毛果芸香碱+阿托品;吗啡+纳洛酮;甲苯磺丁脲+氢氯噻嗪

(5)增加毒性或药品不良反应:

——氨基糖苷类+呋塞米/万古霉素/依他尼酸:耳毒性、肾毒性

——甲氧氯普胺+吩噻嗪类抗精神病药:加重锥体外系反应

——肝素+阿司匹林、非甾体抗炎药、右旋糖苷、双嘧达莫:增加出血的危险

——山莨菪碱+哌替啶:增加毒性

## 考点3.处方缩写词

外文缩写	中文含义	外文缩写	中文含义	外文缩写	中文含义
Ac.	餐前	Aq.	水,水剂	Aa.	各、各个
pc.	餐后	Cap.	胶囊(剂)	Ad.	加生理盐水
Am.	上午,午前	gtt.	滴、量滴、滴剂	NS	单位
pm.	下午	Inj.	注射剂	U	非处方药
hs.	临睡时	mist.	合剂	OTC	稀释的,稀释
prn.或 sos.	必要时	Tab.	片剂	Dil	复方的、复合的
St.	立即	ung.	软膏剂	Co.	
		Sol./Liq	溶液剂		
外文缩写	中文含义	外文缩写	中文含义		
qd.	每日一次	H.	皮下		
bid.	每日两次	im.	肌内注射		
tid.	每日三次	iv.	静注		
qid.	每日四次	iv.gtt.	静滴		
qod.	隔日一次	OD.	右眼		
qh	每小时	OS.	左眼		
q4h	每四个小时	OL.	左眼		
qn.	每晚	OU.	双眼		
qs.	适量	po.	口服		
ss.	一半				

## 考点4.药物的理化配伍禁忌(体外)

——曲松遇钙,红霉素;两性霉素遇盐(白色沉淀)

——青霉素遇糖,效价下降;

## 考点5.肝药酶诱导剂:

卡马西平、利福平、灰黄霉素、苯巴比妥、苯妥英钠、螺内酯、地塞米松、水合氯醛

## 考点6.肝药酶抑制剂:

大环内酯类、咪唑类抗真菌药、西咪替丁、异烟肼、依诺沙星、甲硝唑、胺碘酮、氯霉素

## 考点7.有禁忌证用药:

①抗胆碱药、抗过敏药用于青光眼、前列腺肥大患者

②伪麻黄碱用于高血压患者

③脂肪乳用于急性肝损伤、急性胰腺炎、脂质肾病、脑卒中、高血脂、肿瘤患者

④抗帕金森药司来吉兰用于前列腺增生患者

## 考点8.宜多饮水的药物:

①平喘药;②利胆药;③蛋白酶抑制剂;④双膦酸盐;⑤抗痛风药;⑥抗尿结石药;⑦电解质;⑧磺胺类;⑨氨基糖苷类;⑩氟喹诺酮类

## 考点9.ADR 因果关系评价-评价等级

①肯定←再接触再出现

②很可能←无重复给药

③可能←不能排除并用药品、病情进展的影响

④可能无关←时间关系不合理、与已知 ADR 类型不符合、不能排除并用药品、病情进展的影响

⑤待评价←需补充,能补充

⑥无法评价←需补充但无法补充

考点10.药源性肾脏疾病

①顺铂

②阿昔洛韦:结晶

③非甾体抗炎药:抑制肾脏 COX,使 PGs ↓

④去甲肾上腺素:收缩肾血管

⑤氨基糖苷类:直接肾毒性

⑥马兜铃酸:肾间质纤维化

⑦其他:一、二代头孢菌素类、磺胺类、喹诺酮类、多肽类、两性霉素 B

考点11.药物妊娠毒性分级

①β-内酰胺类:亚胺培南 C,其余 B

②大环内酯类:红霉素、阿奇霉素 B,克拉霉素 C

③林可霉素类:B

④四环素类:D

⑤降糖药:正规胰岛素、阿卡波糖、二甲双胍 B;其余 C

⑥降压药:ACEI、ARB 均为 D 级

⑦X 级:利巴韦林,他汀类,前列腺素,缩宫素,甲氨蝶呤,碘甘油,戈舍瑞林,华法林

考点12.

阶段	目的	试验对象	样本数	
I 期	初步的临床药理学及安全性评价试验阶段	观察人体对于新药的耐受程度和药动学	健康志愿者	20~30 例
II 期	治疗作用的初步评价阶段	观察药物的治疗作用和安全性	目标适应证患者	多发病 ≥300 例 多中心 ≥3 个医院 主病种 ≥100 例
III 期	扩大临床试验阶段(批准试生产后进行)	进一步验证药物的治疗作用和安全性	目标适应证患者	
IV 期	上市后药品临床再评价阶段	考察药品在广泛使用条件下的疗效与不良反应	普通或特殊人群	常见病 ≥2000 例

考点13.治疗药物的经济性评价

①最小成本分析:只对成本进行量化分析,但也需考虑效果

——可为总体医疗费用的控制和医疗资源优化配置提供基本信息

②成本-效益分析:成本、效益均以货币表示

③成本-效果分析:效果以客观临床指标表示(量化),如延长生命时间(年)、治愈率、降低血压的单位

④成本-效用分析:效用以患者偏好(主观满意程度)为指标,主要有质量调整生命年、质量调整预期寿命两种

## 考点14.血常规检查意义

- ①贫血:血红蛋白↓;大面积烧伤:血红蛋白↑
- ②细菌感染:中性粒细胞↑
- ③病毒感染、百日咳:淋巴细胞↑
- ④过敏性疾病、药物(头孢拉定、头孢氨苄、头孢呋辛、头孢哌酮):嗜酸性粒细胞↑
- ⑤铅、铋中毒:嗜碱性粒细胞↑
- ⑥急性传染病恢复期:单核细胞↑

## 考点15.肝功能检查指标

丙氨酸氨基转移酶(ALT,GPT);天冬氨酸氨基转移酶(AST,GOT);碱性磷酸酶(ALP)

考点16.乳果糖适用于:慢性功能性便秘、长期卧床老年患者、妊娠期患者、透析患者、长期使用镇痛药患者

## 考点17.口腔溃疡的用药注意事项和患者教育

①甲硝唑含漱液引起食欲不振、口腔异味,长期应用引起念珠菌感染;使用甲硝唑口腔黏贴片不饮酒

②地塞米松黏贴片引起局部组织萎缩、继发真菌感染

## 考点18.维生素C:预防坏血病,突然停药导致坏血病

## 考点19. 阴道炎的分型、临床表现

①真菌性阴道炎(白色念珠菌):白带量多并有臭味,黏稠呈奶酪或豆腐渣样或白色片,阴道壁有白色伪膜状物

②滴虫性阴道炎(阴道毛滴虫):泡沫样白带,为黏液或脓性,有腥臭味

③细菌性阴道炎:白带为灰色或灰绿色,有烂鱼样恶臭

## 考点20.咳嗽的药物治疗——非处方药

①刺激性干咳或阵咳:苯丙哌林、喷托维林

②苯丙哌林(剧咳)>右美沙芬(中等)>喷托维林(较弱)

③白日咳嗽为主:苯丙哌林;夜间咳嗽为主:右美沙芬

④感冒伴随咳嗽:右美沙芬复方制剂

## 考点21.消化不良的治疗药物——非处方药

①食欲减退:维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>6</sub>、干酵母片

②胰腺分泌功能不足、肝胆疾病(脂肪摄入过多):胰酶片、多酶片

③偶然性或进食蛋白质过多:乳酶生、胃蛋白酶

④伴有恶心、呕吐:甲氧氯普胺、多潘立酮

## 考点22.肺炎的抗菌药物治疗

肺炎		治疗药物
社区获得性肺炎	青壮年、无基础疾病	青霉素、一代头孢(耐药者:氟喹诺酮类)
	老年人、有基础疾病	二、三代头孢、氟喹诺酮类、厄他培南、β-内酰胺类+β-内酰胺酶抑制剂
医院获得性肺炎		二、三代头孢、氟喹诺酮类、碳氢霉烯类、β-内酰胺类+β-内酰胺酶抑制剂

考点23.肺结核的药物不良反应

- ①异烟肼:周围神经病;补维生素 B6
- ②利福平:肝损害、排泄物呈橘红色;
- ③乙胺丁醇:视神经炎

考点24.肺结核的用药注意事项与患者教育

- ①密切接触者接种卡介苗
- ②异烟肼、利福平:早晨空腹顿服
- ③乙胺丁醇、对氨基水杨酸:餐中
- ④患者增加高蛋白、维生素的摄入,日光浴

考点25.目前控制哮喘最常用方案:ICS+LABA

考点26.高血压治疗—RAS 抑制剂不良反应

- ①妊娠期;②高钾血症;③双侧肾动脉狭窄;④肾功能不全晚期

考点27.脑血管病的二级预防:阿司匹林 75~150mg/d

(不能耐受阿司匹林者,可换用氯吡格雷)

考点28.他汀类:

- ①睡前给药(阿托伐他汀、瑞舒伐他汀除外)
- ②妊娠毒性 X 级;血脂康中含有洛伐他汀
- ③肝药酶抑制剂、葡萄柚汁、贝丁酸类、烟酸类均会导致肌毒性↑

考点29.妊娠期用药:

常用:硫酸镁(严重先兆子痫的首选药,iv./深部 im.)、甲基多巴、拉贝洛尔

禁用:ACEI/ARB、利血平

考点30.缺血性脑卒中——药物治疗

- ①脱水治疗:甘露醇:首选,30min 内 125~250ml
- ②溶栓治疗:阿替普酶:3h 内,禁忌证:既往颅内出血、3 个月内有心肌梗死或脑梗死、血小板计数 $<100 \times 10^9/L$ 、妊娠期
- ③抗血小板药、抗凝:溶栓 24h 后

考点31.防脑血管痉挛:尼莫地平 40~60mg,4~6 次/d

考点32.癫痫持续状态:静注地西洋(10~20mg),若无效可于 20min 后同一剂量再次

静注

考点33.5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂:文拉法辛、度洛西汀

考点34.根除 Hp 治疗

药物	四联	三联	剂量、用法			疗程
PPI(埃索美拉唑)	√	√	20mg/次	Ac.	bid.	7~14d
铋剂(枸橼酸铋钾)	√		600mg/次			
克拉霉素	√	√	500mg/次	pc.		
阿莫西林/甲硝唑	√	√	1g 次,0.4g/次			

考点35.糖尿病合并肾病首选格列喹酮

考点36.口服降糖药—给药时间:

①餐中:格列美脲、二甲双胍、阿卡波糖

②其余餐前

考点37.别嘌醇:①急性期禁用②不宜过度限制蛋白质摄入③导致眩晕,驾驶员工作前禁用

考点38.雷洛昔芬:雌激素受体调节剂,用于治疗绝经后妇女的骨质疏松症

考点39.尿路感染-抗感染药物治疗-磺胺类、喹诺酮类、半合成青霉素、头孢菌素类

考点40.尿路感染-致病菌-大肠埃希菌(G 杆菌)

考点41.疼痛控制具体原则包括:①口服给药:能口服尽量口服,提倡无创的给药方式;②按时给药:不是按需给药;③按阶梯给药:按照疼痛的程度和质选用不同阶梯的止痛药物;④用药个体化;⑤注意具体细节。

考点42.三阶梯止痛

①第一阶梯:非阿片类药物,多指 NSAIDs 药物②第二阶梯:弱阿片类药物,如可待因、二氢可待因、曲马多等。③第三阶梯:强阿片类,以吗啡为代表。无封顶效应、芬太尼透皮贴剂、美沙酮、哌替啶、二氢埃托啡、羟考酮。

考点43.甲氨蝶呤用药过量易造成再生障碍性贫血

考点44.类风湿性关节炎的治疗:有溃疡史老年人,宜选用 COX-2 抑制剂,但应注意血栓风险

考点45.阿昔洛韦用于治疗带状疱疹,适宜的用法与用量是口服,0.4g,每日5次。

考点46.MHT 禁忌证:

①妊娠、原因不明阴道出血

②激素依赖性肿瘤——乳腺癌、子宫内膜癌

③近6个月内血栓栓塞性疾病

④严重肝肾功能障碍

⑤血卟啉病

⑥耳硬化症

⑦脑膜瘤(禁用孕激素)

考点47.紧急避孕药

①单孕激素:左炔诺孕酮;②抗孕激素:米非司酮

考点48.氟马西尼:用于苯二氮类药过量或中毒。

考点49.碘解磷定、氯磷定、双复磷(能通过血脑屏障)、双解磷(不能通过血脑屏障):用于有机磷中毒。

考点50.①纳洛酮:用于急性阿片类中毒及急性乙醇中毒。

②亚甲蓝(美蓝):用于氰化物中毒,小剂量可治疗高铁血红蛋白血症(亚硝酸盐中毒等);硫代硫酸钠(次亚硫酸钠):主要用于氰化物中毒,也用于砷、汞、铅中毒等;亚硝酸钠:治疗氰化物中毒。

③乙酰胺(解氟灵):用于有机氟杀虫农药中毒。

④乙酰半胱氨酸:用于对乙酰氨基酚过量所致的中毒。

⑤盐酸烯丙吗啡:用于吗啡、哌替啶急性中毒。

## 国家执业药师资格考试药学综合知识与技能 高频必备50考题

1. 下列中药-化学药联合应用,不存在重复用药的是
- A. 新癬片+吡哌美辛胶囊  
B. 曲克芦丁片+维生素C片  
C. 脉君安片+氢氯噻嗪片  
D. 消渴丸+格列本脲片  
E. 珍菊降压片+氢氯噻嗪片
2. 在处方适宜性审核时,应特别注意是否有潜在临床意义的相互作用和配伍禁忌。下列药物何用会有不良相互作用的是
- A. 阿莫西林和克拉维酸钾  
B. 头孢哌酮和舒巴坦  
C. 苯丝肼和左旋多巴  
D. 甲氧氯普胺和氯丙嗪  
E. 亚胺培南和西司他丁钠
- A. ac  
B. pc  
C. po  
D. qn  
E. prn
3. 处方中“餐后给药”的外文缩写是
4. 处方中“餐前给药”的外文缩写是
5. 处方中“必要时”的外文缩写是
- A. 头孢曲松钠与0.9%氯化钠注射液  
B. 头孢曲松与复方氯化钠注射液  
C. 胰岛素与0.9%氯化钠注射液  
D. 青霉素与5%葡萄糖注射液  
E. 维生素C与0.9%氯化钠注射液
6. 两种药物配伍之后容易形成白色沉淀的是
7. 两种药物配伍之后将导致效价降低的是
8. 应告知患者服药后宜多饮水的药物有
- A. 熊去氧胆酸片  
B. 阿仑磷酸钠  
C. 苯溴马隆  
D. 复方磺胺甲恶唑  
E. 甘草合剂
9. 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗,服用4小时后,面部出现皮疹,无其他不适,停药后皮疹消失,排除其他疾病的可能,该病例用药与不良反应的因果关系评价是
- A. 肯定  
B. 很可能  
C. 可能  
D. 可能无关  
E. 无法评价
10. 含有马兜铃酸的中药,可引起的典型药源性疾病是
- A. 粒细胞减少症  
B. 消化性溃疡  
C. 慢性肾衰竭  
D. 溶血性贫血  
E. 呼吸抑制
11. 卡托普利在妊娠中晚期使用属于药物妊娠毒性分级
- A. A级  
B. B级  
C. C级  
D. D级  
E. X级
- A. I期临床试验  
B. II期临床试验

- C.III 期临床试验  
D.IV 期临床试验  
E.临床前试验
- 12.上市后药品临床再评价阶段是
- 13.观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是
- 14.可引起嗜酸性粒细胞增多的药物是
- A.氯苯那敏  
B.碳酸氢钠  
C.坎地沙坦  
D.头孢氨苄  
E.地塞米松
- 15.患者,男,58岁。患有高胆固醇血症,长期服用辛伐他汀 40mgqd.,患者用药期间应定期监测的生化指标是
- A.BUN  
B.HB  
C.ALT  
D.RBC  
E.PLT
- 16.治疗癌症疼痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘,宜选择的药物是
- A.比沙可啶  
B.乳果糖  
C.硫酸镁  
D.东莨菪碱  
E.阿托品
- 17.频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是
- A.西地碘含片  
B.替硝唑含漱液  
C.地塞米松粘贴片  
D.氯己定含漱液  
E.左旋咪唑片
- 18.孕妇过量服用可诱发新生儿坏血病的药物是
- A.维生素 AD 复方制剂  
B.维生素 C  
C.复合维生素 B  
D.葡萄糖酸钙  
E.硫酸亚铁
- A.甲硝唑  
B.咪康唑  
C.头孢曲松钠  
D.青霉素钠  
E.克拉霉素
- 患者,女,28岁,近1个月出现阴道分泌物增多
- 19.痛痒明显,阴道检查时发现黏稠的奶酪样分泌物,经验治疗首选的药物是
- 20.阴道检查时发现大量泡沫样分泌物,经验治疗首选的药物是
- 21.阴道分泌物培养为衣原体,经验治疗首选的药物是
- A.左氧氟沙星  
B.乙胺丁醇  
C.利福平  
D.吡嗪酰胺  
E.链霉素
- 22.抗结核联合治疗方案中,可引起球后视神经炎不良反应的药物是
- 23.抗结核联合治疗方案中,可引起耳蜗神经损伤不良反应的药物是
- 24.患者,男,28岁。2天前因淋雨后出现发热,体温最高达 39℃,经实验室和胸片检查,临床诊断为社区获得性肺炎,无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是
- A.头孢拉定  
B.阿米卡星  
C.亚胺培南-西司他丁  
D.头孢哌酮-舒巴坦  
E.甲硝唑
- 25.支气管哮喘的长期维持治疗宜选用
- A.沙丁胺醇片  
B.福莫特罗吸入剂  
C.沙丁胺醇气雾剂  
D.沙美特罗-氟替卡松粉吸入剂  
E.茶碱片



26、患者,男,50岁,血压170/95mmHg,伴有双侧肾动脉狭窄,单药治疗控制血压效果不佳,宜选用的联合用药方案是

- A.利尿剂+ARB
- B.β受体阻滞剂+ARB
- C.利尿剂+CCB
- D.α受体阻滞剂+ACEI
- E.ACEI+CCB

27、患者,男,59岁,哮喘病史8年,近日因急性脑梗死就诊,住院治疗2周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防,宜首选的抗血小板药物是

- A.氯吡格雷
- B.阿司匹林
- C.对乙酰氨基酚
- D.华法林
- E.依诺肝素

28、羟甲戊二酰辅酶A还原酶抑制剂与贝丁酸类调节血脂药联合应用时,可能引起死亡的严重不良反应是

- A.输尿管结石
- B.十二指肠溃疡
- C.横纹肌溶解症
- D.急性心肌梗死
- E.糖尿病性坏疽

29、患者,女,28岁。妊娠27周,头晕3天。入院查体:血压160/100mmHg,诊断为妊娠高血压,该患者降压治疗首选的药物是

- A.福辛普利
- B.卡托普利
- C.缬沙坦
- D.拉贝洛尔
- E.特拉唑嗪

30、下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法,正确的是

- A.急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是48小时内
- B.血小板计数 $<100 \times 10^9/L$ 时应禁用溶栓药

C.甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快  
D.应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林

E.应在使用溶栓药的同时联合使用抗凝药

31、患者,男,59岁。高血压病史5年,因头痛伴有恶心、呕吐就诊,MRI检查结果显示蛛网膜下腔出血。为防治脑血管痉挛,早期宜选用的药物是

- A.尼莫地平
- B.硝苯地平
- C.氨氯地平
- D.缬沙坦
- E.氢氯噻嗪

32、癫痫持续状态首选的治疗方案是

- A.口服丙戊酸钠200mg
- B.静脉注射地西洋10mg
- C.静脉注射丙戊酸钠200mg
- D.口服地西洋10mg
- E.肌内注射地西洋10mg

33、下列药物属于5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂的药品是

- A.雷尼替丁
- B.奥美拉唑
- C.阿米替林
- D.度洛西汀
- E.氟西汀

34、可作为根治幽门螺杆菌感染的一线治疗方案是( )

- A.埃索美拉唑20mgbid+克拉霉素500mgqd+阿莫西林0.5gtid
- B.埃索美拉唑20mgbid+克拉霉素500mgtid+枸橼酸铋钾0.6gbid
- C.埃索美拉唑20mgqd+阿莫西林1.0gqd+枸橼酸铋钾0.6gqd
- D.埃索美拉唑20mgbid+克拉霉素500mgbid+阿莫西林1.0gbid+枸橼酸铋钾0.6gbid
- E.埃索美拉唑20mgtid+克拉霉素

500mg tid + 阿莫西林 1.0g tid + 枸橼酸铋钾 0.6g tid

35、患者,男,65岁,身高170cm,体重60kg。经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测(肌酐清除率45ml/min),诊断为2型糖尿病、肾功能不全。该患者应首选的药物是

- A. 格列本脲
- B. 格列齐特
- C. 格列喹酮
- D. 格列吡嗪
- E. 格列美脲

36、患者,女,64岁,患2型糖尿病、高脂血症,给予二甲双胍肠溶片 0.5g tid po、瑞格列奈片 1mg tid po、阿托伐他汀钙片 20mg qd po 等药物治疗,药师对该患者的用药指导中错误的是

- A. 二甲双胍肠溶片应于餐后服用
- B. 瑞格列奈片应于餐前服用
- C. 阿托伐他汀钙片可在一天中任何时间以固定时间给药
- D. 一旦出现低血糖症状,应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等
- E. 用药期间应注意监测肝肾功能

37、痛风急性发作期应禁用的药物是

- A. 碳酸氢钠
- B. 别嘌醇
- C. 吡罗昔美
- D. 布洛芬
- E. 秋水仙碱

38、患者,男,70岁,近期发现骨痛,疲乏,驼背。临床诊断为老年性骨质疏松症。该患者不宜选用的药物是

- A. 降钙素
- B. 维生素 D
- C. 阿仑膦酸钠
- D. 碳酸钙
- E. 雷洛昔芬

39、治疗大肠埃希菌所致的尿路感染,不宜选用的抗菌药物是

- A. 左氧氟沙星
- B. 阿莫西林
- C. 头孢呋辛
- D. 阿奇霉素
- E. 复方磺胺甲恶唑

40、细菌性尿路感染,最常见的致病菌是

- A. 肠球菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 克雷伯杆菌
- D. 大肠埃希菌
- E. 葡萄球菌

41、下列关于癌痛患者的镇痛药物使用原则,错误的是

- A. 按患者疼痛程度分阶段给药
- B. 按时给药,而不是按需给药
- C. 提倡无创的给药方式
- D. 用药须个体化
- E. 疼痛时用药,不疼痛时不给药

42、癌症疼痛的治疗,应按照疼痛的不同程度选用不同阶段的镇痛药物,下列属于第三阶梯的镇痛物质是

- A. 双氯芬酸
- B. 塞来昔布
- C. 可待因
- D. 布桂嗪
- E. 吗啡

43、治疗类风湿关节炎时,必须提醒患者每周用药一次,避免用药过量造成再生障碍性贫血等药源性疾病的药物是

- A. 来氟米特
- B. 泼尼松
- C. 雷公藤多苷
- D. 白芍总苷
- E. 甲氨蝶呤

44、患者,女,55岁。关节痛半年,临床诊断为类风湿关节炎,既往有十二指肠溃疡病史,应首选的 NSAIDs 的药物是

- A. 塞来昔布

- B. 吡哌美辛
- C. 布洛芬
- D. 双氯芬酸
- E. 萘普生

45、患者,男,67岁。因带状疱疹前来就诊,实验室检查肌酐清除率 100ml/min,医生处方阿昔洛韦片治疗,对于该患者,适宜的用法用量是

- A. 0.4g, 每日 5 次
- B. 0.4g, 每日 4 次
- C. 0.4g, 每日 3 次
- D. 0.4g, 每日 2 次
- E. 0.4g, 每日 1 次

46、患者,女,50岁。近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状,临床诊断为围绝经期综合征,在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况不属于禁忌证但属于慎用的是

- A. 乳腺增生

B. 近 6 个月内患活动性静脉栓塞性疾病

- C. 严重肝功能障碍
- D. 耳硬化症
- E. 脑膜瘤

47. 可用于紧急避孕的药物是

- A. 左炔诺孕酮
- B. 黄体酮
- C. 甲睾酮
- D. 罗格列醇
- E. 丁螺环酮

A. 阿托品+碘解磷定

B. 氟马西尼

C. 硫代硫酸钠

D. 乙酰半胱氨酸

E. 纳洛酮

48. 地西洋中毒的解救药物是

49. 有机磷中毒的解救药物是

50. 阿片类药物中毒的解救药物是

## 参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	B	A	E	B	D	ABCD	B	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	D	A	D	C	B	C	B	B	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	B	E	A	D	C	A	C	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	B	D	D	C	A	B	D	D	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
E	E	E	A	A	A	A	B	A	E