


中西医执业医师资格考试
考前全真模拟试卷（二）
（医学综合笔试部分）

报考类别：中西医结合执业医师
第一单元考试日期：2021 年 8 月
考试时间： 9：00—11：00 考生姓名： 
准考证号：
考场号：

A1 型题答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。1.叶天士认为，温病斑出热不解，若其人素体肾水亏，治宜

- A.甘寒
- B.苦寒
- C.甘寒之中加入咸寒
- D.苦寒之中加入咸寒
- E.甘寒之中加入苦寒

2.根据《温热论》，关于温病治疗大法，以下表述不确切的是

- A.在卫汗之可也
- B.到气才可清气
- C.入营犹可透热转气，如银花、连翘、竹叶等
- D.入血就恐耗血动血，直需凉血散血，如生地、丹皮、阿胶、赤芍等物
- E.卫之后方言气，营之后方言血

3.《温热论》中提到“营分受热”的情况，以下哪项描述不恰当

- A.胃津受劫
- B.心神不安
- C.夜甚无寐
- D.斑疹隐隐
- E.撤去气药

4.关于营分证的治法，以下哪项不恰当

- A.撤去气药
- B.急急透斑
- C.透热转气

D.凉营清热

E.当用苦泄

5.据《灵枢·决气》所述，脉的作用是

A.熏肤充身泽毛

B.宣五谷味

C.补益脑髓

D.发泄腠理

E.壅遏营气，令无所避

6.《素问·至真要大论》认为“皆属于心”的病证为

A.诸热瞤瘛

B.诸痛痒疮

C.诸躁狂越

D.诸禁鼓慄，如丧神守

E.诸厥固泄

7.《素问·评热病论》中“劳风”的症

A.强上冥视，唾出若涕，恶风振寒

B.汗出烦满，烦满不为汗解，恶风

C.汗出辄复热，恶风

D.面足俱肿，恶风

E.全身浮肿，恶风，口干，溺黄

8.据《素问·咳论》“五藏各以其时受病，非其时，各传以与之”，冬季肺受邪而病，是从何脏传来

A.心

B.太阳

C.肝

D.脾

E.肾

9.《素问·痹论》所述“脾痹”的症状是

A.烦满而呕

B.饮食不下，腹善满

C.四肢解堕，发咳呕汁，上为大塞

D.中气喘争，时发维泄

E.腹满下利

10.据《素问·痿论》所述，具有“主束骨而利机关”作用的是

A.经脉

B.宗筋

C.经筋

D.肌肉

E.络脉

11.神分属于五脏，肝藏

A.魂

B.神

C.意

D.魄

E.志

12.气虚引起血虚的理论基础是

- A.气能生血
- B.气能行血
- C.气能摄血
- D.血能载气
- E.血能养气

13.与精的生成密切相关的脏腑是

- A.心、肾
- B.心、肺
- C.脾胃、肾
- D.心、脾胃
- E.肺、胃

14.具有加强十二经脉相为表里两经在体表联系的是

- A.经别
- B.经筋
- C.别络
- D.皮部
- E.奇经

15.奇经八脉中，与脑、髓、肾关系密切的是

- A.带脉
- B.任脉
- C.冲脉
- D.督脉
- E.维脉

16.先天禀赋决定体质的相对

- A.可变性
- B.连续性
- C.复杂性
- D.普遍性
- E.稳定性

17.具有亢奋、偏热、多动等特征的体质为

- A.阳虚质
- B.偏阴质
- C.偏阳质
- D.肝郁质
- E.阴阳平和质

18.下列病邪致病最易出现发热恶风、汗出等症状的是

- A.风邪
- B.寒邪
- C.火邪
- D.湿邪
- E.燥邪

19.寒邪的性质和致病特征是

A.凝滞而主痛

B.黏滞而病程缠绵

C.病证善行而数变

D.病状沉重而易困

E.升散而袭阳位

20.七情内伤致病，首先损伤的脏是

A.肝

B.心

C.脾

D.肺

E.肾

21.偏食生冷寒凉之品，最易耗伤

A.心肾阳气

B.脾胃阳气

C.肺胃阳气

D.脾肾阳气

E.肺肾阳气

22.“重阴必阳”所体现的阴阳关系是

A.阴阳交感

B.阴阳互根

C.阴阳对立

D.阴阳消长

E.阴阳转化

23.外感温热病初期，伤津较轻的临床表现是

A.口渴咽干，鼻干唇燥，发于秋季

B.口干微渴，兼发热

C.大渴，喜冷饮，兼见壮热面赤，汗出，脉洪数

D.口渴多饮，伴小便量多，多食易饥，体渐消瘦

E.口渴咽干，夜间尤甚，兼颧红盗汗，舌红少津

24.里热炽盛，津液大伤的临床表现是

A.口渴咽干，鼻干唇燥，发于秋季

B.口干微渴，兼发热

C.大渴，喜冷饮，兼见壮热面赤，汗出，脉洪数

D.口渴多饮，伴小便量多，多食易饥，体渐消瘦

E.口渴咽干，夜间尤甚，兼颧红盗汗，舌红少津

25.病人自觉口中有甜味的临床意义是

A.脾胃虚弱

B.脾胃湿热或脾虚

C.痰热内盛、湿热蕴脾或寒湿困脾

D.肝胃郁热或饮食停滞

E.燥热伤津或脏腑热盛

26.患者大便中含有脓血黏液的临床意义是

A.脾虚、肾虚或食滞胃肠

B.肝脾不调

- C. 湿热疫毒，阻滞肠道，肠络受损
- D. 气不摄血或胃肠积热、湿热蕴脾、气血瘀滞
- E. 脾虚中气下陷

27. 切脉指法中，不轻不重，委曲求之，称为

- A. 总按
- B. 举
- C. 按
- D. 寻
- E. 单按

28. 浮大中空，如按葱管的脉象是

- A. 伏脉
- B. 革脉
- C. 芤脉
- D. 虚脉
- E. 弱脉

29. 妇人闭经，痰湿阻于胞宫的脉象是

- A. 尺脉虚细而涩
- B. 尺脉弦或涩
- C. 脉象弦滑
- D. 脉滑数动甚
- E. 脉洪大

30. 按肌肤干瘪的临床意义是

- A. 气血不足
- B. 阳虚有寒
- C. 津液不足
- D. 湿热蕴结
- E. 瘀血内停

31. 腹部高度胀大如鼓，称为

- A. 虚痞
- B. 结胸
- C. 水饮
- D. 食积
- E. 鼓胀

32. 肢体关节游走性疼痛，见于

- A. 风水犯肺证
- B. 风客肌肤证
- C. 风盛行痹证
- D. 风毒窜络证
- E. 风邪袭表证

33. 下列各项，属于中医诊断基本原则的是

- A. 整体审察
- B. 司外揣内
- C. 辨病论治
- D. 辨证论治

E.望闻问切

34.病人表现为假神的临床意义是

- A.脏腑虚衰，功能低下
- B.阴盛于内，格阳于外
- C.气血不足，精神亏损
- D.精气衰竭，虚阳外越
- E.机体阴阳严重失调

35.白芷的功效是

- A.疏散风热
- B.消肿排脓
- C.透疹消疮
- D.行气宽中
- E.胜湿止痛

36.治疗外感风寒所致巅顶头痛，应选用的药物是

- A.白芷
- B.羌活
- C.藁本
- D.苍耳子
- E.细辛

37.下列各项，属辛凉解表药的是

- A.薄荷、桑叶、荆芥
- B.蝉衣、柴胡、菊花
- C.柴胡、淡豆豉、防风
- D.牛蒡子、苍耳子、升麻
- E.蔓荆子、辛夷、葛根

38.薄荷与牛蒡子均具有的功效是

- A.疏散风热，透疹利咽
- B.疏散风热，解毒消肿
- C.疏肝解郁，利咽透疹
- D.清利头目，疏肝解郁
- E.利咽透疹，清利头目

39.具有利水消肿、渗湿健脾、除痹，清热排脓功效的药物是

- A.薏苡仁
- B.车前子
- C.木通
- D.茯苓
- E.滑石

40.车前子入汤剂的用法是

- A.先煎
- B.后下
- C.另煎
- D.烊化
- E.包煎

41.治疗湿热黄疸，应选药物是

- A.车前子
- B.泽泻
- C.茵陈
- D.木通
- E.石韦

42. “十八反”中，与白及相反的药物是

- A.甘草
- B.乌头
- C.藜芦
- D.甘遂
- E.芫花

43.治疗虚寒崩漏下血，应选用的药物是

- A.白茅根
- B.大蓟
- C.炮姜
- D.茜草根
- E.艾叶炭

44.外用祛湿止痒，可以用治皮肤瘙痒的药物是

- A.艾叶
- B.地榆
- C.槐花
- D.茜草
- E.仙鹤草

45.活血祛瘀药具有的共同功效是

- A.活血行气
- B.活血消痛
- C.活血疗伤
- D.活血祛瘀
- E.活血通经

46.治疗头痛，无论风寒、风热、风湿、血虚、血瘀，均可选用的药物是

- A.羌活
- B.延胡索
- C.白芷
- D.郁金
- E.川芎

47.下列有关流脑暴发型败血症休克型的叙述，错误的是

- A.口唇发绀、低血压
- B.精神萎靡、意识障碍
- C.突发高热、头痛、呕吐
- D.皮肤瘀斑迅速扩大并融合成片
- E.脑膜刺激征明显、脑脊液呈化脓性改变

48.目前我国流脑流行的主要菌群是

- A.A 群
- B.B 群

- C.C 群
- D.D 群
- E.W135 群

49.诊断急性菌痢必做的检查是

- A.血常规
- B.粪便常规
- C.直肠镜
- D.血培养
- E.悬滴检查

50.细菌性痢疾的病原体属于

- A.志贺菌属
- B.沙门菌属
- C.弧菌属
- D.弯曲菌属
- E.螺旋菌属

51.菌痢的确诊依据是

- A.粪培养阳性
- B.粪检有巨噬细胞
- C.粪便免疫学检查抗原阳性
- D.粪便镜检有大量脓细胞
- E.典型菌痢临床症状

52.下列关于菌痢发病特点的说法，正确的是

- A.终年散发，夏季流行
- B.是由沙门菌感染引起的肠道传染病
- C.感染后可获得免疫，不易复发
- D.一般为急性，而后迁延成慢性
- E.主要表现为腹痛腹泻、排黏液脓血便和里急后重

53.霍乱典型症状是

- A.发热
- B.呕吐
- C.腹泻
- D.腹痛
- E.肌肉痉挛

54.肺结核患者的哪种标本传染性最强

- A.痰液
- B.血液
- C.尿液
- D.汗液
- E.泪液

55.空洞性肺结核有巨大空洞时的听诊表现是

- A.带金属调的空瓮音
- B.支气管呼吸音
- C.细湿啰音
- D.呼吸音降低

E.局限性哮鸣音

56.下列对于布鲁菌病易感人群的说法,正确的是

- A.老人和儿童易感染
- B.男性易感染
- C.身体衰弱或有慢性疾病的人易感染
- D.人群普遍易感
- E.女性易感染

57.下列属于乙类传染病的是

- A.鼠疫
- B.流行性腮腺炎
- C.麻风病
- D.布鲁菌病
- E.霍乱

58.诊断病毒性肝炎最可靠的依据是

- A.发病季节
- B.起病方式
- C.症状及体征
- D.接触史
- E.病原学及肝功能检查结果

59.下列传染病,根据传染病防治法要求,不按甲类传染病管理的是

- A.AIDS
- B.SARS
- C.肺炭疽
- D.鼠疫
- E.霍乱

60.一般来说,对于肠道传染病起主导作用的预防措施是

- A.隔离患者
- B.治疗带菌者
- C.预防性服药
- D.预防接种
- E.切断传播途径

61.在感染过程中,最常见的表现形式是

- A.病原体被消灭或排出体外
- B.隐性感染
- C.显性感染
- D.病原携带状态
- E.潜伏性感染

62.潜伏期是指

- A.自病原体侵入机体至典型症状出现
- B.自病原体侵入机体至排出体外
- C.自病原体侵入机体至临床症状开始出现
- D.自接触传染源至患者开始出现症状
- E.自接触传染源至典型症状出现

63.下列肝炎病毒,属 DNA 病毒的是

- A.HAV
- B.HBV
- C.HCV
- D.HDV
- E.HEV

64.下列有关丙型肝炎的叙述，正确的是

- A.丙型肝炎只通过输血传播
- B.抗-HCV 属保护性抗体
- C.丙型肝炎黄疸型发生率较高
- D.丙型肝炎不易演变为慢性
- E.急性丙型肝炎的治疗可使用干扰素

65.有明显出血倾向的肝炎是

- A.急性黄疸型肝炎
- B.急性无黄疸型肝炎
- C.淤胆型肝炎
- D.重型肝炎
- E.慢性肝炎

66.流感传染性最强的时期是

- A.潜伏期
- B.发病 3 日内
- C.发病 1 周内
- D.发病 10 日内
- E.全病程

67.抗流感病毒药奥司他韦作用机制是

- A.抑制 RNA 聚合酶
- B.阻滞离子通道 M2
- C.抑制血凝素
- D.抑制神经氨酸酶
- E.激活神经氨酸酶

68.下列关于禽流感病毒的叙述，错误的是

- A.属正黏病毒科
- B.加热可灭活
- C.人对其不易感
- D.包括甲型流感病毒的全部亚型
- E.在自然环境中存活时间短暂

69.确诊人禽流感的依据是

- A.血常规
- B.肝功能
- C.病毒分离
- D.骨髓穿刺
- E.胸部 X 线检查

70.预防人禽流感病情恶化有较高价值的是

- A.阿司匹林
- B.利巴韦林

- C.奥司他韦
- D.金刚烷胺
- E.干扰素

71.下列各项，不属人禽流感并发症的是

- A.肺炎
- B.脑炎
- C.休克
- D.胸腔积液
- E.ARDS

72.阿司匹林的作用是

- A.抗炎、免疫抑制
- B.镇痛、镇静
- C.镇痛、抗炎
- D.解热、镇静
- E.抗炎、抗休克

73.下列关于对乙酰氨基酚的叙述，错误的是

- A.镇痛作用较强
- B.解热作用较强
- C.抗炎作用与阿司匹林相近
- D.用于神经痛、关节痛、肌肉痛
- E.用于感冒发热

74.H₁受体阻滞药的药理作用是

- A.收缩支气管平滑肌
- B.降低毛细血管通透性
- C.收缩胃肠平滑肌
- D.扩张血管
- E.降低血压

75.氢氯噻嗪增加钙重吸收的部位是

- A.近曲小管
- B.远曲小管
- C.髓袢升支
- D.髓袢升支粗段
- E.集合管

76.关于脱水药特点的叙述，错误的是

- A.易经肾小球滤过
- B.不易从血管透入组织液
- C.易被肾小管重吸收
- D.不易透过毛细血管
- E.在体内不易被代谢

77.不属于呋塞米的临床应用的是

- A.严重水肿
- B.尿崩症
- C.药物中毒
- D.急慢性肾功能衰竭

E.高血钙症

78.关于哌唑嗪作用的描述，错误的是

A. α 受体阻滞药

B.对突触前膜 α_2 受体也有影响

C.降压作用中等偏强

D.出现“首剂现象”

E.长期应用致水钠潴留

79.普萘洛尔具有的作用是

A.减少心输出量

B.促进肾素分泌

C.不引起支气管收缩

D.引起血管收缩

E.增强心肌收缩力

80.禁用于消化性胃溃疡患者的降压药是

A.可乐定

B.卡托普利

C.硝普钠

D.利血平

E.硝苯地平

81.强心苷中毒心脏反应中最多且早见的不良反应是

A.室上性心动过速

B.窦性心动过缓

C.室性早搏

D.室性心动过速

E.房室传导阻滞

82.下列原因导致的慢性心功能不全，强心苷疗效较好的是

A.高血压、心脏瓣膜病、先天性心脏病

B.甲状腺功能亢进

C.缩窄性心包炎、严重二尖瓣狭窄

D.肺源性心脏病、活动性心肌炎

E.重度贫血

83.能防止和逆转 CHF 病人的心室肥厚并能改善心肌的顺应性的药物是

A.地高辛

B.硝普钠

C.氢氯噻嗪

D.呋塞米

E.卡托普利

84.关于硝酸甘油作用的叙述，错误的是

A.降低心肌耗氧量

B.降低心脏前、后负荷

C.直接扩张冠脉，减少心肌供血

D.改善缺血区心肌供血

E.抑制血小板聚集、黏附

85.不宜使用普萘洛尔的是

- A.稳定型心绞痛
- B.变异型心绞痛
- C.不稳定型心绞痛
- D.高血压伴心绞痛
- E.心律失常伴心绞痛

86.硝苯地平对下列哪类心绞痛最有效

- A.卧位型心绞痛
- B.稳定型心绞痛
- C.急性冠状动脉功能不全
- D.变异型心绞痛
- E.梗死后心绞痛

87.治疗恶性贫血，宜选用的药物是

- A.维生素 B12
- B.维生素 B6
- C.硫酸亚铁
- D.右旋糖酐铁
- E.维生素 K

88.香豆素类药物的抗凝作用机制是

- A.激活纤溶酶原
- B.妨碍肝脏合成 II、VII、IX、X 凝血因子
- C.激活血浆中的 ATIII
- D.抑制凝血酶原转变成凝血酶
- E.耗竭体内的凝血因子

89.用于生长发育期需求增加和慢性失血而引起的贫血，宜选用的药物是

- A.叶酸
- B.维生素 B12
- C.亚叶酸钙
- D.维生素 K
- E.硫酸亚铁

90.雷尼替丁抑制胃酸分泌的机制是

- A.阻断 H1 受体
- B.阻断 H2 受体
- C.阻断 M1 受体
- D.促进 PGE2 合成
- E.抑制胃壁细胞质子泵活性

91.硫糖铝治疗消化性溃疡的主要机制是

- A.中和胃酸
- B.抑制胃酸分泌
- C.抗幽门螺杆菌
- D.保护胃肠黏膜
- E.抑制胃壁细胞的质子泵

92.多潘立酮止吐的作用机制是

- A.通过血脑屏障，阻断纹状体 D 受体
- B.脑内抗胆碱

- C.激动胃肠平滑肌 5-HT₄ 受体
- D.阻断中枢及迷走神经传入纤维的 5-HT₃ 受体
- E.阻断胃肠 D₂ 受体, 促进其顺向运动

93.下列哪个药物是外周性镇咳药

- A.可待因
- B.喷托维林
- C.右美沙芬
- D.苯佐那酯
- E.氯哌斯汀

94.仅用于预防过敏性哮喘发作的药物是

- A.沙丁胺醇
- C.氨茶碱
- B.特布他林
- D.色甘酸钠
- E.异丙肾上腺素

95.下列关于糖皮质激素用法的描述, 错误的是

- A.大剂量突击疗法
- B.一般剂量长期疗法
- C.小剂量替代疗法
- D.隔周疗法
- E.隔日疗法

96.下列关于糖皮质激素所引起的不良反应, 错误的是

- A.高血压
- B.高血钾
- C.高血糖
- D.低血钙
- E.低血磷

97.硫脲类药物的临床应用, 不包括

- A.甲亢轻症
- B.甲亢手术前准备
- C.甲状腺危象的治疗
- D.甲亢不宜手术者
- E.单纯性甲状腺肿

98.对尿崩症有效的降血糖药是

- A.降糖灵
- B.优降糖
- C.氯磺丙脲
- D.胰岛素
- E.降糖片

99.可引起肝损害的是

- A.阿霉素
- B.氟尿嘧啶
- C.环磷酰胺
- D.顺铂

E.阿糖胞苷

100.青霉素 G 治疗何种疾病时可引起赫氏反应

A.大叶性肺炎

B.梅毒或钩端螺旋体病

C.草绿色链球菌心内膜炎

D.回归热

E.破伤风

101.大环内酯类抗生素不包括

A.克拉霉素

B.螺旋霉素

C.阿奇霉素

D.林可霉素

E.罗红霉素

102.霍乱的典型临床表现是

A.只泻不吐

B.先泻后吐

C.先吐后泻

D.腹泻伴腹痛

E.吐泻同时发生

A2 型题答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。103.患者，大病之后症见精神疲乏而嗜睡的临床意义是

A.心肾不交

B.痰湿困脾，清阳不升

C.脾失健运，清阳不升

D.正气未复

E.心肾阳虚，神失温养

104.患者，症见困倦嗜睡，伴头目昏沉，胸闷脘痞，肢体困重的临床意义是

A.心肾不交

B.痰湿困脾，清阳不升

C.脾失健运，清阳不升

D.正气未复

E.心肾阳虚，神失温养

105.患者，男性，48 岁。5 年前曾患肺结核，近 2 月咳嗽，右胸痛，少量咳痰，间断咳痰带血，三次痰涂片阴性，X 线胸片示无活动性肺结核病变。进一步应首先检查

A.胸部 CT

B.血沉

C.结核菌素试验

D.右肺门 X 线断层

E.支气管造影

106.患者，女。暴发型流脑休克型后迅速出现大片瘀斑，血小板减少，顽固性休克时，除抗休克外，其重要对症治疗是

A.止血

- B.纠正酸中毒
- C.使用抗菌药物
- D.及早应用肝素抗凝治疗
- E.20%甘露醇脱水, 预防脑疝

107.患者, 男性, 45 岁。发热, 咳嗽, 胸部 X 线片示片状阴影, 抗感染治疗 2 周后, 应采取的措施是

- A.痰涂片镜检
- B.复查胸部 X 线片
- C.结核菌素试验
- D.纤维支气管镜刷检和灌洗液找结核杆菌
- E.胸部 CT

108.患者, 女性, 40 岁。既往糖尿病病史 3 年, 未治疗, 咳黄痰伴发热 10 天, 消瘦, 乏力, 诊断首先考虑

- A.肺癌
- B.自发性气胸
- C.支气管扩张
- D.肺结核
- E.肺脓肿

B1 型题答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。(109~110 题共用选项)

- A.饮停胸胁
- B.饮停胸膈
- C.饮停胃肠
- D.饮停四肢肌肤
- E.饮停膀胱

109.四饮中, 痰饮的病机是

110.四饮中, 悬饮的病机是

(111~112 题共用选项)

- A.元气
- B.宗气
- C.营气
- D.卫气
- E.中气

111.贯心脉而行气血的气是

112.推动人体生长发育的气是

(113~114 题共用选项)

- A.气能生津
- B.气能行津
- C.气能摄津
- D.津能载气
- E.津血同源

113.“夺血者无汗”的理论基础是

114. “吐下之余，定无完气”的理论基础是
(115~116 题共用选项)

- A.推动作用
- B.温煦作用
- C.防御作用
- D.中介作用
- E.固摄作用

115.血行脉中，不逸出脉外依靠气的

116.津液运行依靠气的

(117~118 题共用选项)

- A.上肢内侧前缘
- B.上肢外侧前缘
- C.上肢内侧后缘
- D.上肢外侧中线
- E.上肢外侧后缘

117.手阳明大肠经分布在

118.手少阳三焦经分布在

(119~120 题共用选项)

- A.太阳经
- B.少阳经
- C.阳明经
- D.厥阴经
- E.少阴经

119.两侧头痛属于

120.前额连眉棱骨痛属于

(121~122 题共用选项)

- A.汗出蒸蒸
- B.睡时汗出
- C.动则汗出
- D.战栗汗出
- E.冷汗淋漓

121.里热亢盛证汗出可见

122.正邪相持汗出可见

(123~124 题共用选项)

- A.身热不扬
- B.日晡潮热
- C.骨蒸发热
- D.长期微热
- E.壮热汗出

123.肠道燥热内结，腑气不通的热型是

124.阴虚火旺的热型是

(125~126 题共用选项)

- A.胁肋胀痛，太息易怒
- B.胁肋灼痛，面红目赤

- C.胁肋刺痛，固定不移
- D.胁痛，患侧肋间饱满
- E.胁肋胀痛，身目发黄

125.肝火炽盛的临床表现是

126.肝气郁结的临床表现是

(127~128 题共用选项)

- A.涩肠止痛
- B.涩肠安蛔
- C.涩肠降火
- D.涩肠止带
- E.涩肠安神

127.乌梅的功效是

128.罂粟壳的功效是

(129~130 题共用选项)

- A.五倍子
- B.五味子
- C.山茱萸
- D.莲子
- E.椿皮

129.治疗湿热下注，赤白带下，应选用的药物是

130.治疗肝肾亏虚诸证，应选用的药物是

(131~132 题共用选项)

- A.热痰喘咳
- B.寒痰癫狂
- C.痰厥癫狂
- D.虚喘冷哮
- E.阴虚燥咳

131.白矾的主治病证是

132.硫黄的主治病证是

(133~134 题共用选项)

- A.射干
- B.牛蒡子
- C.蝉蜕
- D.山豆根
- E.桑叶

133.治疗咽喉肿痛，兼有痰热壅盛者，应选用的药物是

134.治疗咽喉肿痛，证属热毒塞结者，应选用的药物是

(135~136 题共用选项)

- A.黄连
- B.黄芩
- C.黄柏
- D.苦参
- E.栀子

135.善清上焦之火的药物是

136.善清下焦之火的药物是

(137~138 题共用选项)

- A.高热、剧烈头痛、皮肤瘀斑、脑膜刺激征
- B.高热、休克、惊厥、呼吸衰竭
- C.高热、低血压休克、出血、肾损害
- D.高热、目红、腿痛、淋巴结肿大
- E.高热、相对缓脉

137.流行性脑脊髓膜炎表现为

138.流行性出血热表现为

(139~140 题共用选项)

- A.脑脊液涂片镜检
- B.血液涂片镜检
- C.胸水涂片镜检
- D.痰涂片镜检
- E.大便涂片镜检

139.流脑实验室检查首选

140.阿米巴痢疾实验室检查首选

(141~142 题共用选项)

- A.氟喹诺酮类
- B.复方磺胺甲噁唑
- C.头孢菌素类
- D.氯霉素
- E.阿莫西林

141.伤寒病原治疗首选的抗菌药物是

142.菌痢治疗首选的抗菌药物是

(143~144 题共用选项)

- A.干酪样坏死
- B.玫瑰疹
- C.脾肿大
- D.高热
- E.皮肤瘀点瘀斑

143.结核病的特征性表现是

144.伤寒的典型表现是

(145~146 题共用选项)

- A.链霉素
- B.红霉素
- C.青霉素 G
- D.氯霉素
- E.羧苄西林

145.治疗烧伤继发铜绿假单胞菌感染的药物是

146.用于治疗伤寒杆菌感染的药物是

(147~148 题共用选项)

- A.呋塞米
- B.氨苯蝶啶

- C.螺内酯
D.氢氯噻嗪
E.甘露醇

147.颅脑外伤引起的脑水肿宜选用的药物是

148.醛固酮增高性水肿病人宜选用的药物是

(149~150 题共用选项)

- A.多巴胺
B.肾上腺素
C.间羟胺
D.去甲肾上腺素
E.异丙肾上腺素

149.用于氯丙嗪中毒时的药物是

150.用于过敏性休克抢救的首选药物是

12345678910CCAEEBAECB11121314151617181920AACCDECAAB21222324252627282930BEBBCB
CDCCC31323334353637383940ECADBCBAAE41424344454647484950CBEADEEABA51525354555
657585960AECAADDEAE61626364656667686970BCBEDBDECC71727374757677787980BCCBBC
BBAD81828384858687888990CAECBDABEB919293949596979899100DEDDDBECCB1011021031
04105106107108109110DBDBADBDCA111112113114115116117118119120BAEDEABDBC12112
2123124125126127128129130ADBCBABAEC131132133134135136137138139140CDADBCACAE1
41142143144145146147148149150AAABEDECDB150-2 试卷标码: 1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中西医执业医师资格考试
考前全真模拟试卷(二)
(医学综合笔试部分)

报考类别: 中西医结合执业医师

第二单元考试日期: 2021 年 8 月

考试时间: 14:00—16:00

考生姓名:

准考证号:

考场号:

金英杰医学教育研究院编

第二单元全国免费热线: 400-900-9392 网址: www.jinyingjie.com 中西医结合执业医师资格考试考前全真模拟卷(二) 全国免费热线: 400-900-9392 网址: www.jinyingjie.com 第二单

元

A1 型题答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。1. 下列各项中，属于“使药”功用范畴的是

- A. 缓和君、臣药之峻烈
- B. 消除或减少君、臣药之毒性
- C. 协助君臣药治疗兼证
- D. 针对某一症状发挥治疗作用
- E. 引药至病所或特定部位

2. 参苏饮与败毒散组成中均不含有的药物是

- A. 柴胡、前胡
- B. 羌活、苏叶
- C. 茯苓、半夏
- D. 黄连、黄柏
- E. 人参、甘草

3. 小青龙汤的功用是

- A. 温肺化痰，止咳平喘
- B. 解表散寒，温肺化饮
- C. 宣肺降气，祛痰平喘
- D. 温肺化痰，降气定喘
- E. 解表化饮，降气平喘

4. 下列哪项不是大承气汤的主治范围

- A. 热结旁流
- B. 热厥
- C. 痉病
- D. 发狂
- E. 下利清谷

5. 四逆散中一升一降配伍的药物是

- A. 柴胡配芍药
- B. 柴胡配甘草
- C. 柴胡配枳实
- D. 芍药配甘草
- E. 枳实配芍药

6. 功用为清泻肺热，止咳平喘的方剂是

- A. 止嗽散
- B. 泻白散
- C. 麻黄汤
- D. 定喘汤
- E. 麻杏石膏汤

7. 六一散的功用是

- A. 清暑通络
- B. 清暑化湿
- C. 解暑除烦
- D. 清暑利湿

E.祛暑清热

8.理中丸的功用是

A.温中祛寒，补气健脾

B.温中祛寒，和胃止呕

C.健脾益气，养胃和中

D.健脾益气，渗湿止泻

E.温中健脾，和里缓急

9.大柴胡汤的功用是

A.和解少阳，内泻热结

B.疏肝止痛，清热散结

C.透邪解郁，疏肝理脾

D.解肌疏表，清泻里实

E.疏肝解郁，健脾和营

10.参苓白术散的功用是

A.健脾益气，和中养胃

B.健脾益气，渗湿止泻

C.健脾益气，升阳举陷

D.健脾养胃，理气化痰

E.健脾助运，养胃渗湿

11.真人养脏汤的功用是

A.温中祛寒，补益脾胃

B.温中补虚，降逆止呕

C.益气健脾，缓急止痛

D.温补脾肾，涩肠止泻

E.涩肠固脱，温补脾肾

12.天王补心丹的辨证要点是指

A.失眠，惊悸，舌红苔黄，脉细数

B.失眠，心悸，手足心热，舌红少苔，脉细数

C.虚烦失眠，咽干口燥，舌红，脉弦细

D.精神恍惚，悲伤欲哭，舌红苔少，脉细

E.心悸失眠，体倦食少，舌淡，脉细弱

13.苏合香丸主治

A.心绞痛属痰浊气滞血瘀者

B.寒闭证

C.暑秽

D.热闭证

E.痰热内闭心包证

14.以通阳散结、行气祛痰为主要功用的方剂是

A.小半夏汤

B.小陷胸汤

C.半夏厚朴汤

D.贝母瓜蒌散

E.栝蒌薤白白酒汤

15.血府逐瘀汤的功用是

- A.活血祛瘀，养血清热
- B.活血祛瘀，行气止痛
- C.活血祛瘀，疏肝通络
- D.活血祛瘀，散结止痛
- E.活血祛瘀，温经止痛

16.体温下降呈渐降形式的是

- A.疟疾
- B.输液反应
- C.风湿热
- D.肺炎球菌性肺炎
- E.急性肾盂肾炎

17.下列可引起反射性呕吐的是

- A.晕动病
- B.脑膜炎
- C.幽门梗阻
- D.休克
- E.有机磷中毒

18.下列各项，可引起腹痛伴休克的是

- A.溃疡性结肠炎
- B.肝破裂
- C.慢性胰腺炎
- D.胃癌
- E.急性阑尾炎

19.肺气肿时，呼吸困难的主要特点是

- A.呼吸深快
- B.吸气费力
- C.呼吸深慢
- D.呼气费力
- E.吸气和呼气均感费力

20.可引起混合性呼吸困难的疾病是

- A.肺气肿
- B.支气管哮喘
- C.急性喉炎
- D.重症肺炎
- E.支气管异物

21.引起咯血最常见的疾病是

- A.肺结核
- B.肺淤血
- C.肺部恶性肿瘤
- D.肺炎球菌性肺炎
- E.肺梗死

22.可引起咯血伴黄疸的疾病是

- A.流行性出血热
- B.肺炎支原体肺炎

C.钩端螺旋体病

D.支气管肺癌

E.肺吸虫病

23.血管壁异常所致的出血的特点是

A.男性多见

B.多有家族史

C.多有内脏出血

D.关节腔出血罕见

E.多有皮肤大瘀斑、血肿

24.可引起阻塞性黄疸的疾病是

A.原发性胆汁性肝硬化

B.系统性红斑狼疮

C.毒蕈中毒

D.蚕豆病

E.病毒性肝炎

25.显性黄疸的诊断标准是

A.超过 $1.7 \mu\text{mol/L}$

B.超过 $8.55 \mu\text{mol/L}$

C.超过 $17.1 \mu\text{mol/L}$

D.超过 $34.2 \mu\text{mol/L}$

E.超过 $51.3 \mu\text{mol/L}$

26.意识障碍伴瞳孔散大的是

A.巴比妥类中毒

B.吗啡类中毒

C.颠茄类中毒

D.有机磷农药中毒

E.毒蕈类中毒

27.水肿多表现为局部性的是

A.心性水肿

B.肝性水肿

C.营养不良性水肿

D.肾性水肿

E.血管神经性水肿

28.可出现水肿伴颈静脉怒张、肝颈静脉反流征阳性的是

A.右心衰竭

B.肾小球肾炎

C.肝硬化

D.甲状腺功能减退症

E.肾病综合征

29.下列各项, 不属机械性肠梗阻表现的是

A.腹部绞痛

B.频繁呕吐

C.无排气、排便

D.肠蠕动波

E.肠鸣音减弱或消失

30.可引起胆囊肿大伴有压痛的疾病是

A.急性胆囊炎

B.慢性胆囊炎

C.胆囊癌

D.胰头癌

E.肝癌

31.下列各项,可引起紫纹的是

A.肥胖者

B.经产妇

C.皮质醇增多症

D.Addison 病

E.流行性出血热

32.当实质性器官被含气组织覆盖时,其叩诊音为

A.清音

B.浊音

C.实音

D.鼓音

E.过清音

33.伤寒患者可见的面容是

A.无欲貌

B.水肿面容

C.面具面容

D.急性热病容

E.慢性病容

34.引起身体外露部分皮肤色素沉着增加的疾病是

A.库兴综合征

B.阿狄森病

C.糖尿病

D.帕金森病

E.黏液性水肿

35.下列可以引起全身淋巴结肿大的疾病是

A.急性化脓性扁桃体炎

B.肺炎球菌性肺炎

C.肺癌

D.再生障碍性贫血

E.系统性红斑狼疮

36.下列关于中枢性瘫痪的描述,正确的是

A.肌张力降低

B.肌肉萎缩明显

C.深反射消失

D.不出现病理反射

E.肌张力增强

37.可见匙状甲的疾病是

- A.发绀型先天性心脏病
- B.缺铁性贫血
- C.支气管扩张
- D.肝硬化
- E.支气管扩张症

38.在胸骨左缘第3、4肋间触及收缩期震颤，应考虑的疾病是

- A.二尖瓣狭窄
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.三尖瓣狭窄
- D.肺动脉瓣狭窄
- E.室间隔缺损

39.乳腺皮肤呈“橘皮样”改变伴有乳头血性分泌物，最可能的疾病是

- A.急性乳腺炎
- B.乳腺增生
- C.乳腺结核
- D.乳腺囊肿
- E.乳腺癌

40.严重的代谢性酸中毒常出现的呼吸类型为

- A.Biot's 呼吸
- B.间停呼吸
- C.Cheyne-Stokes 呼吸
- D.叹息样呼吸
- E.Kussmaul 呼吸

41.引起手足搐搦的常见疾病是

- A.低钙血症
- B.小脑疾患
- C.肝性脑病
- D.帕金森病
- E.儿童的脑风湿病

42.肢体可做水平移动但不能抬起，此时的肌力为

- A.1 级
- B.2 级
- C.3 级
- D.4 级
- E.5 级

43.下列各项，不出现水冲脉的是

- A.贫血
- B.高热
- C.甲状腺功能亢进症
- D.主动脉瓣狭窄
- E.主动脉瓣关闭不全

44.心尖区触及舒张期震颤，可提示的疾病是

- A.二尖瓣狭窄
- B.二尖瓣关闭不全

- C.肺动脉瓣狭窄
- D.主动脉瓣狭窄
- E.室间隔缺损

45.急性纤维蛋白性心包炎最具特征的体征是

- A.颈静脉怒张
- B.心尖搏动减弱
- C.心包叩击音
- D.心包摩擦音
- E.腹水

46.正常成人的脉压的范围是

- A.11~15 mmHg
- B.20~26 mmHg
- C.30~40 mmHg
- D.40~49 mmHg
- E.45~55 mmHg

47.判断成年女性贫血的血红蛋白含量应低于

- A.120 g/L
- B.115 g/L
- C.105 g/L
- D.100 g/L
- E.90 g/L

48.引起白细胞总数及中性粒细胞增多的疾病是

- A.伤寒
- B.流行性感冒
- C.化脓性感染
- D.脾功能亢进
- E.系统性红斑狼疮

49.引起血浆凝血酶原时间延长的疾病是

- A.心肌梗死
- B.多发性骨髓瘤
- C.严重肝病
- D.脑血栓形成
- E.深静脉血栓形成

50.尿胆原减低或缺如，尿胆红素强阳性的疾病是

- A.胰头癌
- B.溶血性贫血
- C.蚕豆病
- D.中毒性肝炎
- E.病毒性肝炎

51.提示病毒复制，传染性强，持续阳性,表明肝细胞损害较重，且可转为慢性乙型肝炎的指标是

- A.HBsAg
- B.HBeAg
- C.HbcAg

D.抗-HBs

E.抗 Hbe

52.关于化脓性脑膜炎脑脊液特点的叙述,错误的是

A.外观呈毛玻璃样混浊

B.压力显著增高

C.细胞数显著增加

D.可发现致病菌

E.细胞分类以中性粒细胞为主

53. II 型肺结核是指

A.浸润型肺结核

B.原发型肺结核

C.血型播散型肺结核

D.慢性纤维空洞型肺结核

E.结核性胸膜炎

54.皮肤变厚、干燥、脱屑属

A.风胜

B.湿胜

C.热胜

D.虫淫

E.血虚

55.疮疡溃后脓水不净,经内服、外敷治疗无效而形成的瘻管和窦道,其治法是

A.挂线法

B.结扎法

C.砭镰法

D.挑治法

E.针灸法

56.手术区皮肤消毒的范围,应距切口周围

A.5 cm

B.10 cm

C.15 cm

D.20 cm

E.25 cm

57.局麻药内加肾上腺素的主要目的是

A.预防过敏反应

B.延缓药物吸收,延长作用时间

C.使局部血管收缩,减少出血

D.预防术中血压下降

E.预防术中脉搏减慢

58.普鲁卡因局麻的一次性限量是

A.400 mg

B.600 mg

C.800 mg

D.1000 mg

E.1200 mg

59.高钾血症的表现是

- A.表情淡漠，倦怠嗜睡或烦躁不安
- B.肌肉软弱无力，腱反射迟钝或消失
- C.心悸，心动过速，心律失常，传导阻滞
- D.心电图 P 波消失、QRS 波增宽、QT 间期延长
- E.膀胱收缩无力而排尿困难

60.病人在不进食的情况下一般采取

- A.肠内营养
- B.肠外营养
- C.外科补液
- D.静脉输液
- E.胃肠造瘘

61.关于溶血性反应的治疗，下列哪项是错误的

- A.抗休克
- B.保护肾功能
- C.防治弥散性血管内凝血
- D.换血治疗
- E.使用抗组胺药物

62.用来治疗休克的血管扩张剂是

- A.去甲肾上腺素
- B.间羟胺
- C.多巴胺
- D.异丙肾上腺素
- E. α 受体阻滞剂

63.经常哮喘发作者，术前可选用（）以减轻气管黏膜水肿

- A.麻黄素
- B.地塞米松
- C.氨茶碱
- D.抗生素
- E.多巴胺

64.心跳骤停的诊断不包括

- A.意识突然消失，呼之不应
- B.颈动脉或股动脉搏动摸不到
- C.血压测不到
- D.心音听不到
- E.针尖样瞳孔

65.多器官功能障碍综合征的治疗措施不包括

- A.控制感染
- B.维持氧的供需平衡
- C.保护肝肾功能
- D.免疫学治疗
- E.化痰止咳

66.下列属于催眠镇静药的是

- A.双氯芬酸钠

- B.阿米替林
- C.吲哚美辛
- D.丙米嗪
- E.艾司唑仑

67.下列哪项为腹腔镜术后 CO₂ 气腹相关并发症

- A.肠粘连
- B.胆漏
- C.内出血
- D.下肢静脉瘀血和血栓形成
- E.腹壁血肿

68.锁喉痈临床治疗宜用

- A.五神汤
- B.仙方活命饮
- C.萆薢渗湿汤
- D.清瘟败毒饮
- E.普济消毒饮

69.发生于口底颌下的急性蜂窝织炎最严重的后果是

- A.面部蜂窝织炎
- B.纵隔化脓性感染
- C.呼吸困难、窒息
- D.吞咽困难
- E.脓毒血症

70.下列哪项属闭合性损伤

- A.刺伤
- B.挫伤
- C.割伤
- D.切伤
- E.裂伤

71.成人头、面、颈部全部烧伤，其面积约为全身面积的

- A.3%
- B.6%
- C.9%
- D.18%
- E.20%

72.张力性气胸最确切的诊断依据是

- A.伤侧肺呼吸音消失
- B.广泛而严重的皮下气肿
- C.胸膜腔穿刺抽出高压气体
- D.胸部 X 线检查见伤肺完全萎陷
- E.严重缺氧导致呼吸循环衰竭

73.神经纤维瘤的特点不包括

- A.数目不定，几个甚至上千个不等
- B.大者可达十数千克
- C.肿瘤沿神经干走向生长

- D.呈圆形、扁圆形或分叶状
E.皮肤出现咖啡斑，大小不定
74.恶性程度最高的甲状腺癌是

- A.鳞状上皮癌
B.滤泡状腺癌
C.髓样癌
D.未分化癌
E.乳头状腺癌

75.下列哪项不属于急性穿孔的诊断要点

- A.有溃疡病史，且近期有溃疡病活动症状
B.突然发生的持续性上腹部剧烈疼痛，迅速发展到全腹
C.检查时有明显的腹膜刺激征，并多有肝浊音界缩小或消失
D.X线检查发现膈下有游离气体
E.莫菲征阳性

76.急腹症病人腹腔内穿刺液为带臭味的血性液，最可能为

- A.肠套叠
B.绞窄性肠梗阻
C.急性胰腺炎
D.胃、十二指肠溃疡穿孔
E.胆囊穿孔

77.带状疱疹的最主要的症状是

- A.瘙痒
B.神经痛
C.乏力
D.寒战高热
E.少尿

78.动脉硬化性闭塞症的西医治疗原则主要是

- A.应用血管扩张剂
B.降低血液黏稠度
C.治疗高血压
D.治疗糖尿病
E.降低血脂，改善血压，改善血液高凝状态

79.医生义务和权利中不包括

- A.保证治疗效果
B.保证患者平等的医疗权
C.保证患者医疗权的实现
D.促进和维护患者身心健康
E.履行自己的义务

80.下列关于医患冲突的防范的叙述，正确的是

- A.公平、公开、公正地处理纠纷
B.发现矛盾，尽快向上级和有关部门报告，有效处置
C.出现纠纷，及时沟通化解
D.完善医院管理体制
E.理解患者、患者家属的紧张焦虑心情，避免误解

81. 下列符合药物治疗的道德要求的是

- A. 对症下药、合理配伍
- B. 联合用药、尽量周全
- C. 知情同意、免担风险
- D. 灵活用药、观察疗效
- E. 少用药物、减少费用

82. 人体试验中应放在首位的是

- A. 社会利益
- B. 科学利益
- C. 受试者利益
- D. 实验者利益
- E. 经济利益

83. 医学道德修养的根本途径是

- A. 医疗实践
- B. 理论学习
- C. 自我反省
- D. 慎独
- E. 自律

84. 《赫尔辛基宣言》最初制定时间是

- A. 1959 年
- B. 1962 年
- C. 1964 年
- D. 1988 年
- E. 2001 年

A2 型题答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

85. 患者，女性，28 岁，手术后出现表情淡漠，嗜睡，烦躁，腹胀，心跳加快，心电图早期 T 波低平、双相倒置，继之 S-T 段下降、Q-T 间期延长和 U 波出现，属

- A. 轻度缺水
- B. 中度缺水
- C. 重度缺水
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

86. 患者，男性，32 岁，左下肢红、肿、热、痛，边界不清，压痛明显，应首先考虑的诊断是

- A. 疖
- B. 痈
- C. 疽
- D. 丹毒
- E. 急性蜂窝织炎

87. 患者，男，28 岁。2 天前被木刺刺伤手指，未进行消毒处理。现症见：指端剧烈跳痛，触之痛甚，畏寒、发热、头痛，体温 38.7℃，食欲不振，疼痛造成夜眠不安，舌红，苔黄，脉数。治疗应首选

- A. 玉真散合五虎追风散加減

- B.五味消毒饮加减
- C.清营汤加减
- D.托里消毒散加减
- E.附子理中汤加减

88.患者，男，25岁，右侧颞部被钝器击伤后昏迷30分钟，清醒4小时后再次出现昏迷，伴右侧瞳孔逐渐散大，出现左侧肢体瘫痪及生命体征变化。应首先考虑的诊断是

- A.脑内血肿
- B.脑水肿
- C.脑挫伤
- D.急性硬膜外血肿
- E.急性硬膜下血肿

89.患儿，5岁，两下肢（不包括臀部）烧伤，其烧伤面积为

- A.34%
- B.39%
- C.41%
- D.46%
- E.48%

90.患者，男，5岁，左眼眶周围出现一直径约1cm的肿块，质较硬，切开可见囊腔内有毛发、皮样物质。应首先考虑的诊断是

- A.皮脂腺囊肿
- B.神经纤维瘤病
- C.皮样囊肿
- D.脂肪瘤
- E.淋巴管瘤

91.患者，女，40岁，颈部肿大，两侧对称，肿块质硬，表面光滑，甲状腺功能减退，抗甲状腺抗体阳性，病初有甲亢表现。应首先考虑的诊断是

- A.甲状腺功能亢进
- B.慢性侵袭性甲状腺炎
- C.慢性淋巴细胞性甲状腺炎
- D.甲状腺瘤
- E.甲状腺癌

92.患者，女，35岁，乳房胀痛半年，经前加重，经后痛减；伴情绪抑郁，心烦易怒，失眠多梦，胸胁胀满；舌质淡红苔薄白，脉细涩。其中医证型是

- A.痰瘀凝结
- B.肝郁气滞
- C.气滞血瘀
- D.冲任失调
- E.毒热蕴结

93.患者，男，55岁，间歇性胃痛发作5年，近2个月发作频繁，无规律，同时体重减轻，大便隐血试验持续阳性。应首先考虑的诊断是

- A.食管癌
- B.胃溃疡穿孔
- C.胃癌
- D.十二指肠溃疡穿孔

E.瘢痕性幽门梗阻

94.患者，男，46岁，慢性乙肝史8年，肝硬化，门脉高压，发生大量呕血，考虑食道胃底静脉曲张破裂出血。首选止血措施为

- A.三腔二囊管压迫
- B.胃内注射或口服去甲肾上腺素
- C.胃管注入冰水
- D.使用生长抑素
- E.内镜治疗

95.患者，女性，65岁，突发右上腹痛，高烧、寒战、黄疸，B超显示胆囊增大，应首先考虑的诊断是

- A.胆囊结石
- B.肝内胆管结石
- C.胆总管结石
- D.急性胰腺炎
- E.急性胆囊炎

96.患者，男，50岁，便下脓血，里急后重，腹部灼痛，大便黏液恶臭；舌质红，苔黄腻津少，脉洪大或滑数。治疗应首选的方剂是

- A.桃红四物汤
- B.八珍汤合麻仁滋脾丸
- C.益气固本解毒汤
- D.槐角地榆汤
- E.失笑散合膈下逐瘀汤

97.患者，男，3岁，啼哭时可见腹股沟上段内侧由外上向内下前斜行凸现一圆形囊性包块，平卧时可自行回纳。应首先考虑的诊断是

- A.腹股沟直疝
- B.腹股沟斜疝
- C.股疝
- D.脐疝
- E.切口疝

98.患者，女，40岁，肛门周围突发肿块，疼痛剧烈，局部红肿灼热。应首先考虑的诊断是

- A.肛痿
- B.直肠肛管周围脓肿
- C.直肠息肉
- D.肛隐窝炎
- E.内痔

99.患者，女，36岁，肾绞痛突然发作，尿液检查可见镜下血尿。应首先考虑的诊断是

- A.肾结石
- B.膀胱结石
- C.急性睾丸炎
- D.尿道结石
- E.肾结核

100.患者，男，45岁，小便不畅，尿液点滴而下小腹拘急胀痛；舌质紫暗有瘀斑，脉涩。治疗应首选的方剂是

- A.少腹逐瘀汤

- B.石韦散
- C.八正散
- D.沉香散
- E.天台乌药散

101.患者，女，50岁，左下肢有蚯蚓状静脉迂曲，站立时明显，平卧时减轻，应首先考虑的诊断是

- A.浅静脉炎
- B.动脉硬化性闭塞症
- C.血栓闭塞性脉管炎
- D.下肢深静脉血栓形成
- E.下肢静脉曲张

102.患者，男，52岁，左下肢发凉，间歇性跛行1年，冠心病史3年，心电图检查示冠状动脉供血不足。应首先考虑的诊断是

- A.下肢深静脉血栓形成
- B.动脉硬化性闭塞症
- C.单纯性下肢静脉曲张
- D.血栓闭塞性脉管炎
- E.干性坏疽

103.患者，男，41岁。左足底皮肤皲裂1月，伴疼痛。查体可见左足底皮肤增厚、粗糙、脱屑、干燥，有皲裂，舌质淡红，苔薄白，脉细。诊断为足癣鳞屑角化型。其中医证型是

- A.肝经郁热证
- B.脾虚湿蕴证
- C.气滞血瘀证
- D.湿热蕴结证
- E.血虚风燥证

104.患者，男，34岁。有冶游史。胸壁、腹壁广泛多发皮疹1月，轻度瘙痒，无疼痛。梅毒螺旋体检查和梅毒血清试验阳性。应首先考虑的诊断是

- A.一期梅毒
- B.二期梅毒
- C.三期梅毒
- D.隐性梅毒
- E.先天性梅毒

B1型题答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。（105～106题共用选项）

- A.羚角钩藤汤
- B.镇肝息风汤
- C.天麻钩藤饮
- D.大定风珠
- E.阿胶鸡子黄汤

105.功能凉肝息风、增液舒筋的方剂是

106.功能镇肝息风、滋阴潜阳的方剂是

（107～108题共用选项）

- A.凉燥外袭，肺失宣降

- B.温燥外袭，肺津被灼
- C.温燥伤肺，气阴两伤
- D.肺肾阴虚，虚火上炎
- E.肝肾阴虚，虚火上炎

107.清燥救肺汤证的病因病机是

108.桑杏汤证的病因病机是

(109~110 题共用选项)

- A.发汗解表
- B.温阳化气，平冲降逆
- C.温阳化气，解表散邪
- D.温心阳，通心脉
- E.温经通脉

109.五苓散中桂枝的作用是

110.苓桂术甘汤中桂枝的作用是

(111~112 题共用选项)

- A.保和丸
- B.健脾丸
- C.半夏泻心汤
- D.枳实导滞丸
- E.三子养亲汤

111.饮食不节，脘腹痞胀，噎腐吞酸，恶食呕吐，大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑者。宜选用

112.食积内停，脘腹胀痛，下利泄泻，小便短赤，舌苔黄腻，脉沉而有力者。治宜选用

(113~114 题共用选项)

- A.干姜、蜀椒
- B.人参、半夏
- C.桂枝、附子
- D.当归、芍药
- E.细辛、生姜

113.乌梅丸和大建中汤组成中均含有的药组是

114.乌梅丸中含有，而大建中汤中不含有的药组是

(115~116 题共用选项)

- A.X 线穿透性
- B.X 线荧光效应
- C.X 线感光效应
- D.X 线电离效应
- E.X 线生物效应

115.X 线照像的基础是

116.胸部透视的基础是

(117~118 题共用选项)

- A.厚壁空洞
- B.薄壁空洞
- C.空洞壁厚伴有液平
- D.不规则偏心空洞
- E.虫蚀样空洞

117.肺脓肿通常形成的空洞特点是

118.肺大疱表现为

(119~120 题共用选项)

- A.椎体可见栅栏样高密度影
- B.椎体密度不均,边缘可见高密度影
- C.椎体楔形改变,密度稍高,有帽檐征,椎间隙正常
- D.椎体楔形改变,可见溶骨性破坏累及附件,椎间隙正常
- E.椎体后缘唇样肥大增生

119.椎体压缩骨折的X线表现

120.椎体转移癌(溶骨转移)的X线表现

(121~122 题共用选项)

- A.肺炎球菌性肺炎
- B.肝硬化
- C.慢性肾小球肾炎
- D.支气管扩张
- E.右心功能不全

121.寒战、咳嗽、咯血痰及肺实变体征的疾病是

122.肝颈静脉回流征阳性,颈静脉怒张的疾病是

(123~124 题共用选项)

- A.老年性震颤
- B.静止性震颤
- C.动作性震颤
- D.扑翼样震颤
- E.细微震颤

123.肝昏迷常出现的体征是

124.甲状腺功能亢进症常出现的体征是

(125~126 题共用选项)

- A.天门冬氨酸氨基转移酶(AST)
- B.肌酸激酶同工酶(CK-MB)
- C.乳酸脱氢酶(LDH)
- D.肌酸激酶(CK)
- E.心肌肌钙蛋白T(cTnT)

125.对急性心肌梗死早期诊断最灵敏,且具有高度特异性的指标是

126.用于判断微小心肌损伤的指标是

(127~128 题共用选项)

- A.小圆上皮细胞
- B.大圆上皮细胞
- C.扁平上皮细胞
- D.尾形上皮细胞
- E.脂肪颗粒细胞

127.膀胱炎患者尿中大量出现的细胞是

128.成年女性尿中可出现的细胞是

(129~130 题共用选项)

- A.冻状便

- B.柏油样便
- C.绿色便
- D.鲜血便

E.暗红色果酱样便

129.上消化道出血患者粪便的性状是

130.肛裂患者粪便的性状是

(131~132 题共用选项)

- A.中性粒细胞
- B.鳞状上皮细胞
- C.红细胞
- D.嗜酸性粒细胞
- E.柱状上皮细胞

131.急性咽炎患者痰液直接涂片镜检发现增多的细胞是

132.肺吸虫病患者痰液直接涂片镜检发现增多的细胞是

(133~134 题共用选项)

- A.时间
- B.速度
- C.振幅
- D.电压
- E.频率

133.心电图纸上横向距离代表

134.心电图纸上纵向距离代表

(135~136 题共用选项)

- A.急性心肌梗死
- B.心绞痛
- C.急性心包炎
- D.主动脉夹层动脉瘤
- E.室壁瘤

135.可引起 ST 段下移 0.07 mV 的疾病是

136.可引起 ST 段弓背向下抬高的疾病是

(137~138 题共用选项)

- A.5 : 2
- B.15 : 4
- C.4 : 3
- D.15 : 2
- E.5 : 1

137.单人心肺复苏胸外按压与人工呼吸的次数比为

138.双人心肺复苏胸外按压与人工呼吸的次数比为

(139~140 题共用选项)

- A.皮肤及其网状淋巴管的急性炎症
- B.一个毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染
- C.皮下筋膜下蜂窝组织急性炎症
- D.多个相邻毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染
- E.足癣病人足背及小腿出现红色丝条,轻触痛,有向近心端延长之势

139. “发”是指

140. “红丝疔”是指

(141~142 题共用选项)

- A.放射状切口
- B.沿皮肤自然纹理切开
- C.沿乳房下缘作弧形切口
- D.沿乳晕边缘作弧形切口
- E. “S”形切口

141.乳房深部脓肿，切开引流时应采取

142.关节区脓肿，切开引流可采取

(143~144 题共用选项)

- A.黄连解毒汤或仙方活命饮加减
- B.大承气汤或麻仁滋脾丸加减
- C.八珍汤或十全大补汤加减
- D.萆薢渗湿汤或龙胆泻肝汤加减
- E.凉血地黄汤或槐角丸加减

143.适用于肛周脓肿实证的方剂是

144.适用于风热肠燥便血、血栓性外痔初起的方剂是

(145~146 题共用选项)

- A.一期梅毒
- B.二期梅毒
- C.三期梅毒
- D.隐性梅毒
- E.先天性梅毒

145.主要表现为外生殖器硬下疳的是

146.主要表现为杨梅疮的是

(147~148 题共用选项)

- A. “每一个病例都是一个研究课题”
- B. “医生要有一切必要的知识，要洁身自持，要使患者信赖”
- C. “启我爱医术，复爱世间人”
- D. “愿绝名利心，一切为患者，无分爱与憎，不问富与贫，凡诸疾病者，一视如同仁”
- E. “人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此”

147.以上名言为张孝骞所述的是

148.以上名言为孙思邈所述的是

(149~150 题共用选项)

- A.医患双方不是双向作用，而是医生对患者单向发生作用
- B.医患双方在医疗活动中都是主动的，医生有权威性，充当指导者
- C.医生和患者具有近似同等的权利
- D.长期慢性病患者已具有一定医学知识水平
- E.急性病患者或虽病情较重但他们头脑是清醒的

149.指导-合作型的特点是

150.主动-被动型的特点是参考答案

12345678910EDBECBDAAB11121314151617181920EBBEBCCBDD21222324252627282930ACDA
DCEAEA31323334353637383940CBABEEBEEE41424344454647484950ABDADCBCCA5152535455

5657585960BACEACBDDDB61626364656667686970EEBEEDECB71727374757677787980CCDDEB
BEAE81828384858687888990ACACDEBDBC919293949596979899100CBCECDBBAD10110210310
4105106107108109110EBEBABCBCB111112113114115116117118119120ADACBCACD1211221
23124125126127128129130AEDEBECBD131132133134135136137138139140BDADBCDECE141
142143144145146147148149150CEDEABAEB A

150-2 试卷标码: 1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中西医执业医师资格考试

考前全真模拟试卷(二)

(医学综合笔试部分)

报考类别: 中西医结合执业医师

第三单元考试日期: 2021年8月

考试时间: 9:00—11:00

考生姓名:

准考证号:

考场号:

第三单元A1型题答题说明

每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。1.急性上呼吸道感染不包括下列哪种疾病

- A.普通感冒
- B.急性咽结膜炎
- C.急性病毒性咽炎
- D.急性支气管炎
- E.急性咽-扁桃体炎

2.按NYHA分级,II级患者的表现为

- A.心脏病患者体力活动明显受限,小于平时一般活动即引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛
- B.患者患有心脏病,但日常活动量不受限制,一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛
- C.心脏病患者的体力活动受到轻度限制,休息时无自觉症状,但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛

D.心脏病患者不能从事任何体力活动，休息状态下也出现心衰的症状，体力活动后加重

E.患者日常活动量受限制，一般活动引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛

3.非甾体抗炎药引起急性胃炎的主要机制是

A.激活磷脂酶 A

B.抑制前弹性蛋白酶

C.抑制前列腺素合成

D.促进胃泌素合成

E.抑制脂肪酶

4.慢性肾炎中，由急性肾炎转变而来的是

A.全部

B.少数

C.半数

D.大多数

E.没有

5.贫血最常见的类型是

A.巨幼红细胞性贫血

B.再生障碍性贫血

C.缺铁性贫血

D.溶血性贫血

E.肾性贫血

6.下列各项中，与甲状腺功能亢进无关的临床表现是

A.怕热多汗

B.心动过速

C.低热

D.多食消瘦

E.月经增多

7.下列各项中，不属于类风湿关节炎关节症状的是

A.晨僵

B.疼痛与压痛

C.关节肿大

D.皮肤红

E.关节畸形

8.诊断癫痫最有意义的检查是

A.神经系统体格检查

B.颅骨 X 线片

C.脑 CT 或脑 MRI

D.脑脊液检查

E.病史和脑电图

9.中毒是指

A.物理因素引起的损害

B.有毒化学物质引起的损害

C.细菌感染引起的损害

D.放射性物质引起的损害

E.药物引起的损害

10. 休克按病因学分类不包括下列哪项

- A. 低血容量性休克
- B. 创伤性休克
- C. 分布性休克
- D. 心源性休克
- E. 感染性休克

11. 胃溃疡基本病位在

- A. 胃
- B. 肝
- C. 心
- D. 脾
- E. 肾

12. 胁痛的病位主要在

- A. 肝脾
- B. 肝胆
- C. 肝胃
- D. 肝肾
- E. 胆胃

13. “治痿者独取阳明”出自于

- A. 《医学心悟》
- B. 《黄帝内经·素问》
- C. 《伤寒论》
- D. 《金匮要略》
- E. 《丹溪心法》

14. 关于急性支气管炎的说法，不正确的是

- A. 肺的卫外功能减弱是引发本病的重要病因
- B. 发病常以风为先导，夹有寒、热、燥、湿等邪
- C. 病变部位主要在肺脾
- D. 年老体弱者更易受邪以致疾病反复发作
- E. 发病常以风为先导

15. 左心衰竭时最早出现的症状是

- A. 呼吸困难
- B. 咳嗽、咳痰、咯血
- C. 肝-颈静脉反流征阳性
- D. 急性肺水肿
- E. 少尿

16. 下列各项中，胃镜检查所见对诊断萎缩性胃炎有意义的是

- A. 胃黏膜增厚，呈花斑状
- B. 黏膜苍白变平，黏膜下血管暴露
- C. 出血，糜烂
- D. 胃黏膜变薄，色泽变淡
- E. 病变范围为局限性

17. 中医认为肾病综合征所表现的水肿其病变脏腑是

- A. 心、肝、肾

- B.肺、肾、脾
- C.肺、脾、心
- D.肝、肾、脾
- E.心、肝、脾

18.再障最有诊断意义的检查方法是

- A.血常规
- B.骨髓穿刺
- C.CT 检查
- D.临床症状
- E.骨髓活检

19.成年型甲减主要的临床表现是

- A.大脑发育不良
- B.骨髓发育不良
- C.身材矮小
- D.智力低下
- E.代谢、脏器功能受损

20.下列各项中，不属于系统性红斑狼疮诊断依据的是

- A.颧部红斑
- B.非侵蚀性关节炎
- C.蛋白尿或细胞管型
- D.溶血性贫血或白细胞减少
- E.血沉加快

21.动脉硬化性脑梗死最常见的病因是

- A.动脉瘤
- B.脑动脉粥样硬化
- C.血管畸形
- D.风湿性心脏病
- E.缺氧

22.血碳氧血红蛋白浓度达 30%~40%，属于

- A.轻度中毒
- B.中度中毒
- C.重度中毒
- D.没有中毒
- E.不确定

23.下列各项中，不是热衰竭临床表现的是

- A.患者先有头痛、头晕、恶心
- B.典型表现为高热、无汗、昏迷
- C.热衰竭可有低钠、低钾血症
- D.热衰竭可有晕厥、抽搐
- E.热衰竭重者出现循环衰竭

24.腹痛之寒邪内阻证，治疗首选的方剂是

- A.良附丸合正氣天香散
- B.大承氣湯
- C.枳實導滯丸

- D.小建中汤
- E.柴胡疏肝散

25.黄疸病的最主要的病理因素是

- A.湿邪
- B.热邪
- C.寒邪
- D.疫毒
- E.血瘀

26.咳嗽阵作，痰中带血，胸胁胀痛，烦躁易怒，口苦，舌质红，苔薄黄，脉弦数。其治疗首选方剂是

- A.桑菊饮
- B.玉女煎
- C.百合固金汤
- D.泻白散合黛蛤散
- E.杏苏散

27.夹脊入腰中的经脉是

- A.足少阴经
- B.足太阳经
- C.足厥阴经
- D.手太阳经
- E.手少阳经

28.慢性心力衰竭的主要病位在

- A.心
- B.肺
- C.肾
- D.肝
- E.脾

29.慢性支气管炎的发病因素不包括

- A.吸烟
- B.感染
- C.职业粉尘
- D.暴饮暴食
- E.化学物质接触

30.关于十二指肠溃疡的治疗，最重要的是

- A.中枢镇静
- B.保护黏膜
- C.抑制胃酸和根除幽门螺杆菌
- D.早期手术
- E.少食多餐

31.女性易患尿路感染的最主要原因是

- A.妊娠
- B.月经期抵抗力下降
- C.更年期内分泌失调
- D.解剖生理因素

E.饮食因素

32.白细胞减少指外周血白细胞数持续低于

A. $10.0 \times 10^9/L$

B. $9.0 \times 10^9/L$

C. $7.5 \times 10^9/L$

D. $6.5 \times 10^9/L$

E. $4.0 \times 10^9/L$

33.下列不属于亚急性甲状腺炎早期症状的是

A.甲状腺区疼痛

B.食欲减退

C.肌肉疼痛

D.发热多汗

E.心动过缓

34.诊断有机磷杀虫药中毒时，全血胆碱酯酶活性应是

A. $<100\%$

B. $\leq 90\%$

C. $\leq 80\%$

D. $\leq 75\%$

E. $\leq 70\%$

35.泄泻治疗法则是

A.运脾化湿

B.抑肝扶脾

C.温肾健脾

D.补中益气

E.滋阴补涩

36.积证的病位主要在

A.心、肺

B.肺、肾

C.肝、脾

D.肝、肾

E.脾、肾

37.下列各项，不属于慢性阻塞性肺疾病体征的是

A.桶状胸

B.语颤增强

C.肺部叩诊为过清音

D.两肺呼吸音减弱

E.肝脏浊音界下降

38.下列各项关于心房颤动的治疗原则正确的是

A.所有心房颤动均应转为窦性心律

B.所有心房颤动均用电击转复心律

C.所有慢性心房颤动转复后，应服用药物以维持窦性心律

D.所有心房颤动均可用洋地黄

E.所有心房颤动均可选用心得安

39.胃癌最常见的症状是

- A.食欲不振
- B.消瘦
- C.恶心、呕吐
- D.贫血
- E.上腹痛

40.慢性肾衰竭的中医病机是

- A.肾失气化，水湿浊瘀不能排出体外
- B.肾元虚衰，湿浊内蕴
- C.药毒伤肾
- D.劳伤久病，脾肾亏虚
- E.饮食不当

41.影响慢性淋巴细胞性甲状腺炎发病的主要环境因素是

- A.射线
- B.粉尘
- C.光刺激
- D.碘摄入量增多
- E.硫化物

42.动脉硬化性脑梗死致病之本为

- A.气虚血瘀，脉络不畅
- B.肝阳暴亢，风火上扰
- C.风痰瘀血，痹阻脉络
- D.肝肾阴虚，气血衰少
- E.元气败脱，心神涣散

43.治疗气秘的首选方剂是

- A.柴胡疏肝散
- B.五磨饮子
- C.四磨汤
- D.六磨汤
- E.枳实导滞丸

44.聚证结块的形成病因不包括

- A.气滞
- B.湿热
- C.情志失调
- D.食积
- E.痰阻

45.目前公认的支气管哮喘最重要的发病机制是

- A.气道炎症
- B.饮食不节
- C.情志激动
- D.外邪侵袭
- E.吸烟多年

46.下列各项中，不属于房性早搏心电图表现的是

- A.提早出现的 P' 波，形态与窦性 P 波不同
- B. P' -R > 0.12 秒

C.QRS 形态正常，亦可增宽（室内差异性传导）或未下传

D.代偿间歇不完全

E.代偿间歇完全

47.肝硬化腹水的基本治疗方法是

A.应用大量利尿剂

B.腹水浓缩回输

C.多次抽放腹水，每次 4 000 mL 以上

D.限制钠、水的摄入

E.反复输新鲜血

48.下列各项中，与慢性肾衰竭相近的病名是

A.淋证

B.关格

C.水肿

D.中风

E.肾著

49.日本长崎受原子弹袭击后，幸存者中急性白血病发病率明显增高，其原因是

A.化学因素所致

B.遗传因素所致

C.病毒感染所致

D.电离辐射所致

E.其他血液病发展而来

50.磺脲类药降糖的主要机制是

A.加速无氧糖酵解

B.促进外周组织摄取葡萄糖

C.抑制肠道对葡萄糖的吸收

D.刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

E.促使靶细胞胰岛素受体亲和力增强

51.属内伤发热临床特点的是

A.起病较急

B.病程较短

C.头身疼痛

D.自觉发热

E.伴有恶寒

52.下列各项中，关于肺炎链球菌肺炎的体征描述正确的是

A.早期肺部无明显异常体征，仅有呼吸幅度减小、叩诊轻度浊音、听诊呼吸音减低和胸膜摩擦音

B.肺实变时叩诊呈实音

C.听诊语颤减弱和支气管呼吸音等典型体征

D.消散期不可闻及湿啰音

E.病变累及胸膜时无胸膜摩擦音

53.下列各项中，不属于病态窦房结综合征心电图表现的是

A.持续、严重，有时是突发的窦性心动过缓

B.发作时可见窦房阻滞或窦性停搏

C.心动过缓与心动过速交替出现

D.心动过速可以是阵发性室上速、阵发性房颤与房扑

E.心率>50 次/分

54.根治原发性肝癌的最好方法是

A.放射治疗

B.免疫治疗

C.抗癌药物局部治疗

D.冷冻治疗

E.手术治疗

55.巨脾伴见白细胞数显著增高多见于

A.急性淋巴细胞性白血病

B.慢性髓细胞性白血病

C.血吸虫病晚期

D.骨髓纤维化症

E.肝硬化

56.有关血脂异常的中医病因病机，说法错误的是

A.病位在心、脾、肾、肝

B.病性多为本虚标实

C.本虚为脏腑亏虚

D.标实为痰浊瘀血，阻滞经脉

E.病因与素体肥胖，加之饮食不节有关

57.虚劳的辨证论治纲领是

A.以脏腑虚实为纲，病邪轻重为目

B.以气血阴阳为纲，五脏虚候为目

C.以感受病邪为纲，五脏病机为目

D.以气血阴阳为纲，病邪轻重为目

E.以脏腑经络为纲，五脏虚候为目

58.下列各项中，关于中央型肺癌的论述，错误的是

A.发生在段支气管至主支气管

B.发生在段支气管以下

C.约占肺癌的 3/4

D.以鳞状上皮细胞癌较多见

E.小细胞未分化癌多见

59.溃疡性结肠炎湿热内蕴证的中医治法是

A.清热利湿

B.健脾利湿

C.疏肝健脾

D.健脾温肾

E.滋阴养血

60.等渗性失水多发生于

A.胃肠液急性丧失

B.水分摄入不足

C.大量出汗

D.渗透性利尿

E.水分丧失

61.厥证的基本病机是

- A.气机逆乱，阴阳失调
- B.阴阳失调，气血逆乱
- C.痰湿壅盛，气血逆乱
- D.肝肾阴虚，气血衰少
- E.痰气郁结，蒙蔽神机

62.下列各项中，关于慢性肺源性心脏病中医病因病机的叙述，错误的是

- A.病因有外邪侵袭、肺脾肾虚、痰瘀互结等
- B.属本虚标实之证
- C.病位主要在肺
- D.早期表现为肺、脾、肾三脏气虚，后期则为心肾阳虚
- E.急性发作期以邪实为主，缓解期以脏腑虚损为主

63.下列各项中，可作为肾血管性高血压主要诊断依据的是

- A.近期发生的高血压
- B.上腹部或背部肋脊角处听到血管杂音
- C.肾动脉造影有阳性发现
- D.出现氮质血症
- E.出现高尿酸血症

64.下列各项中，不属于病毒性心肌炎常见中医病因的是

- A.热毒侵心
- B.湿毒犯心
- C.心阴虚损
- D.气阴两虚
- E.气血亏虚

65.卫生法的概念是指

- A.国家立法机关颁布的卫生法律
- B.国家行政机关颁布的卫生法规
- C.国务院卫生行政部门颁布的规章
- D.卫生行政部门颁布的技术规范
- E.全部上述保障人体健康的法律规范的总和

66.“危害公共卫生罪”是依据哪部法律定罪

- A.《中华人民共和国宪法》
- B.《中华人民共和国刑法》
- C.《中华人民共和国传染病防治法》
- D.《中华人民共和国食品安全法》
- E.《中华人民共和国执业医师法》

67.国家实行医师资格考试制度，目的是检验评价申请医师资格者是否具备

- A.医学专业学历
- B.从事医学实践必需的基本专业知识与能力
- C.取得医学专业技术职务的条件
- D.从事医学专业教学、科研的资格
- E.开办医疗机构的条件

68.下列情形的药品中按假药论处的是

- A.不注明或者更改生产批号

- B.超过有效期的
- C.未标明有效期或者更改有效期的
- D.直接接触药品的包装材料和容器未经批准的
- E.所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的

69.下列的乙类传染病中依法采取甲类传染病的预防控制措施的是

- A.病毒性肝炎
- B.伤寒和副伤寒
- C.淋病、梅毒
- D.淋病、艾滋病
- E.肺炭疽、传染性非典型性肺炎

70.突发公共卫生事件是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大

- A.传染病疫情事件
- B.社会治安事件
- C.公众安全事件
- D.领导责任事件
- E.医疗机构事故

A2 型题答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。71.某女，恶寒重，发热轻，无汗，头痛，肢体酸痛，鼻塞声重，喷嚏，时流清涕，咽痒，咳嗽，口不渴或喜热饮，舌苔薄白而润，脉浮或浮紧。其中医治法是

- A.清暑祛湿解表
- B.辛凉解表
- C.辛温解表
- D.滋阴解表
- E.温阳解表

72.某男，干咳痰少，咽干鼻燥，头痛，恶寒，发热无汗，苔薄白而干，脉浮紧。治疗应首选的方剂是

- A.桑菊饮加减
- B.三拗汤加减
- C.止嗽散加减
- D.杏苏散加减
- E.银翘散加减

73.某患者，咳嗽、咳痰，每年发病 3 个月以上，连续发作 2 年，现咳嗽，咳声重浊，痰多色白而黏，胸满室闷，纳呆，舌苔腻色白，脉滑。治疗应首选的方剂是

- A.二陈汤合三子养亲汤加减
- B.清金化痰汤加减
- C.小青龙汤加减
- D.三拗汤合止嗽散加减
- E.补肺汤加减

74.某男，65 岁，吸烟 20 余年，近 3 年来出现气喘、呼吸困难、咳嗽、咳痰。胸部视诊胸廓前后径增大，肋间隙增宽，两肺听诊呼吸音减弱，呼气延长。其诊断是

- A.支气管肺癌
- B.支气管哮喘
- C.支气管扩张症

D.慢性阻塞性肺疾病

E.肺结核

75.某女，发作性喉间痰鸣气喘 20 年，现症见气粗息涌，咳呛阵作，喉中哮鸣，胸高胁胀，口渴喜饮，口苦，痰多，咳吐不利，音质红，苔黄腻，脉滑数。其治疗应首选的方剂是

A.定喘汤

B.射干麻黄汤

C.七味都气丸

D.苏子降气汤

E.小青龙汤

76.某男，29 岁，因肺炎收入院。查体：血压 110/70 mmHg，T 39℃，急性病容，呼吸急促，口唇发绀，右下肺可听到支气管呼吸音。血常规：白细胞 $12.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.86。治疗措施错误的是

A.鼓励患者多饮水

B.首选青霉素 G

C.病人应卧床休息，宜食用营养而易消化的食物

D.剧烈胸痛者，可酌用少量镇痛药

E.应用大量退热剂，使体温尽快恢复正常

77.患者，男性，54 岁。两个月前发现左肩胛骨及左上肢内侧疼痛，逐渐加重，伴有低热，两年前胸部 X 线检查正常。查体：左眼睑下垂，瞳孔缩小，眼球内陷。X 线显示左前第二肋以上至肺尖部有高密度阴影。其诊断是

A.肺门淋巴结结核

B.急性粟粒型肺结核

C.支原体肺炎

D.支气管肺癌

E.慢性纤维空洞型肺结核

78.韩某，男，68 岁。肺心病多年，现症见喘息气粗，烦躁，胸满，咳嗽，痰黄，黏稠难咳，身热，微恶寒，有汗不多，尿黄便干，口渴，舌红，舌苔黄，边尖红，脉数。治疗应首选的方剂是

A.苏子降气汤

B.生脉散合血府逐瘀汤

C.补肺汤合二陈汤

D.越婢加半夏汤

E.小青龙汤

79.司某，男，67 岁。慢性呼吸衰竭多年，现呼吸短浅难续，张口抬肩，不能平卧，胸满气短，心悸，咳嗽，痰白如沫，咳吐不利，形寒汗出，舌淡，苔白润，脉沉细无力。其治疗应首选的方剂是

A.补肺汤合参蛤散

B.二陈汤合三子养亲汤

C.苏子降气汤

D.涤痰汤合二陈汤

E.真武汤合五苓散

80.患者老年女性，68 岁，心悸气短，身重乏力，心烦不寐，口咽干燥，小便短赤，潮热盗汗，眩晕耳鸣，肢肿形瘦，唇甲稍暗，舌质暗红少苔，脉细数或促或结。应首选的治疗药物是

- A.三子养亲汤
- B.真武汤
- C.生脉饮合血府逐瘀汤
- D.人参养荣汤合桃红四物汤
- E.保元汤合桃红饮加减

81.患者男性,56岁。高血压病3年,心前区阵发性疼痛半年,活动后发作。每次发作3~5分钟,发作时心电图Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段下移。治疗应首选的药物是

- A.硝酸酯类
- B.β受体阻滞剂
- C.钙离子拮抗剂
- D.洋地黄类
- E.乙胺碘呋酮

82.患者男性,48岁。诊断为急性心肌梗死,经治好转,心电图ST段持续抬高。此时应考虑

- A.左室扩大
- B.室壁瘤形成
- C.合并亚急性细菌性心内膜炎
- D.室间隔穿孔
- E.乳头肌功能失调或断裂

83.患者男性,48岁。胸闷心痛,心悸不宁,气短乏力,心烦少寐,自汗盗汗,口干耳鸣,腰膝酸软,舌红,脉细数。诊断为急性心肌梗死,治疗应首选的方剂是

- A.血府逐瘀汤
- B.瓜蒌薤白半夏汤合桃红四物汤
- C.当归四逆汤合苏合香丸
- D.补阳还五汤
- E.生脉散合左归饮

84.慢性胃炎患者,胃脘隐痛,嘈杂,口干咽燥,五心烦热,大便干结,舌红少津,脉细。治疗应首选的方剂是

- A.沙参麦冬汤
- B.生脉饮
- C.滋水清肝饮
- D.益胃汤
- E.玉女煎

85.患者女性,36岁。胃脘隐痛,喜温喜按,食后胀满痞闷,纳呆,便溏,神疲乏力,舌质淡红,苔薄白,脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A.失笑散
- B.丹参饮
- C.四君子汤
- D.桃红四物汤
- E.血府逐瘀汤

86.患者男性,36岁。已诊断消化性溃疡。近期出现脱水、电解质和酸碱平衡紊乱及营养缺乏,应首先考虑的原因是

- A.厌食
- B.并发胃炎

- C.出血
- D.疼痛
- E.幽门梗阻

87.某患者，女性，56岁，诊断为胃癌。现脘痛剧烈，向后背放射，痛处固定，拒推按，上腹肿块，肌肤甲错，眼眶黯黑，舌质紫暗，舌下脉络紫胀，脉弦涩。治疗应首选的方剂是

- A.柴胡疏肝散加减
- B.海藻玉壶汤加减
- C.开郁二陈汤加减
- D.膈下逐瘀汤加减
- E.八珍汤加减

88.患者女性，已确诊肝癌。1天前突然出现剧烈腹痛，休克，应首先考虑的并发症是

- A.原发性腹膜炎
- B.急性梗阻性化脓性胆管炎
- C.结核性腹膜炎
- D.原发性肝癌破裂
- E.肝性脑病

89.患者，男性，35岁。泄泻20余年，诊断为溃疡性结肠炎。稍进油腻之品，大便次数增多，水谷不化，脘腹胀闷不舒，面色萎黄，肢倦乏力，纳食减少，舌淡苔白，脉细弱。其治疗应首选

- A.白头翁汤
- B.参苓白术散
- C.胃苓汤
- D.痛泻要方
- E.驻车丸

90.患者，男性，50岁。半天来呕血4次，量约1200mL，黑便2次，量约600g，伴头晕心悸。查体：血压80/60mmHg，心率118次/分，神志淡漠，巩膜轻度黄染，腹部膨隆，移动性浊音(+)。应首先采取的措施是

- A.配血，等待输血
- B.配血，快速输液，等待输血
- C.紧急胃镜检查明确出血部位
- D.诊断性腹腔穿刺，明确腹水性质
- E.急查红细胞比容

91.肾病综合征患者表现为起始眼睑浮肿，继则四肢、全身亦肿，皮肤光泽，按之凹陷易恢复，伴发热、咽痛、咳嗽、小便不利等症，舌苔薄白，脉浮。其中医证型是

- A.风水相搏证
- B.湿毒浸淫证
- C.水湿浸渍证
- D.脾虚湿困证
- E.肾阳衰微证

92.患者小便淋沥不已，时作时止，每于劳累后发作，尿热，时有尿痛，面色无华，神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振，口干不欲饮水，舌质淡，苔薄白，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A.八正散
- B.丹栀逍遥散

- C.无比山药丸
- D.知柏地黄丸
- E.补中益气汤

93.慢性肾衰竭患者表现为全身浮肿，有胸水、腹水，治疗应首选的方剂是

- A.黄连温胆汤
- B.五皮饮或五苓散
- C.六君子汤
- D.济生肾气丸
- E.二妙丸

94.6岁女童，喜食泥块，面色萎黄，血红蛋白 92 g/L，治疗应首选的药物是

- A.抗生素
- B.葡萄糖
- C.维生素类
- D.铁剂
- E.钙剂

95.患者因乏力就诊，骨穿示增生减低，考虑为再障。现症见面色苍白，倦怠乏力，头晕心悸，手足心热，腰膝酸软，畏寒肢冷，齿鼻衄血，舌质淡，苔白，脉细无力。其中医治法是

- A.滋阴助阳，益气补血
- B.补肾助阳，益气养血
- C.滋阴补肾，益气养血
- D.清热凉血，解毒养阴
- E.补肾活血

96.罗某，患慢性髓细胞性白血病 10 年，面色萎黄，头晕眼花，心悸，心慌，疲乏无力，气短懒言，自汗，食欲减退，舌质淡，苔薄白，脉细弱。其中医证型和应首选的方剂是

- A.阴虚内热证，青蒿鳖甲汤
- B.气血两虚证，膈下逐瘀汤
- C.气血两虚证，八珍汤
- D.热毒壅盛证，犀角地黄汤
- E.阴虚内热证，犀角地黄汤

97.王某，颈前肿胀 5 个月，伴眼突，烦躁易怒，手指颤抖，多汗，面红目赤，头晕目眩，口苦咽干，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A.龙胆泻肝汤
- B.逍遥散
- C.天王补心丹
- D.柴胡疏肝散
- E.镇肝息风汤

98.某女，40 岁，表情淡漠，面色苍白，眼睑浮肿，唇厚舌大，全身皮肤干燥增厚、粗糙多脱屑，毛发脱落，指甲增厚变脆、多裂纹，踝部可出现非凹陷性浮肿，实验室检查显示：FT4 降低，TSH 正常。其必须服用的药物为

- A.稀盐酸
- B.铁剂
- C.左甲状腺素
- D.他汀类
- E.氢化可的松

99.某患者，形体肥胖，肢体困重，食少纳呆，腹胀纳呆，胸腹满闷，头晕神疲，大便溏薄，舌体胖，边有齿痕，苔白腻。其治法应是

- A.滋养肝肾
- B.活血化瘀，行气止痛
- C.健脾化痰降浊
- D.温阳化湿
- E.清胃泄热

100.癫痫患者，发则突然跌仆，目睛上视，口吐白沫，手足抽搐，喉间痰鸣，舌苔白腻，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A.醒脾汤
- B.黄连温胆汤
- C.龙胆泻肝汤
- D.左归丸
- E.黄连解毒汤合定痫丸 B1型题答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。（101～102 题共用选项）

- A.金刚烷胺
- B.复方阿司匹林
- C.头孢氨苄
- D.克咳敏
- E.华素片

101.急性上呼吸道感染抗病毒治疗常选用

102.急性上呼吸道感染抗感染治疗常选用

（103～104 题共用选项）

- A.正虚喘脱证
- B.肾虚不纳证
- C.肺肾气虚证
- D.肺气郁闭证
- E.痰浊壅肺证

103.患者咳喘痰多，色白黏腻，短气喘息，稍劳即著，脘痞腹胀，倦怠乏力，舌质偏淡，苔薄腻，脉滑。其中医辨证为

104.患者呼吸浅短难续，动则喘促更甚，声低气怯，咳嗽，痰白如沫，咯吐不利，胸闷心悸，形寒汗出，舌质淡或紫暗，脉沉细无力。其中医辨证为

（105～106 题共用选项）

- A.肺脓肿
- B.肺门淋巴结结核
- C.肺良性肿瘤
- D.支气管肺癌
- E.结核球

105.某男，48 岁，刺激性咳嗽两个月，伴痰中带血，X 线示右上肺叶部分不张，纤维支气管镜检查见右肺上叶气管开口处有菜花样肿物，质脆，易出血。应首先考虑的诊断是

106.孙某，男，30 岁。有长期吸烟史，近两个月来声音嘶哑，咳嗽，少量黏痰，痰中带血，低热，伴身体乏力。1 年前曾有肺结核接触史。X 线显示：右肺上叶有一 2 cm×3 cm 密度较

高的球形阴影。应首先考虑的诊断是

(107~108 题共用选项)

- A.心肺气虚证
- B.气阴亏虚证
- C.气虚血瘀证
- D.阳虚水泛证
- E.心肾阳虚证

107.心力衰竭患者，症见心悸气短，胸胁满闷，肋下痞块，面色晦暗，唇青甲紫，舌质紫暗，脉细涩。其辨证为

108.心力衰竭患者，症见心悸，喘息不能卧，颜面及肢体浮肿，脘痞腹胀，形寒肢冷，大便溏泄，小便短少，舌淡苔白，脉沉弱。其辨证为

(109~110 题共用选项)

- A.阵发性房性心动过速
- B.阵发性交界性心动过速
- C.阵发性室性心动过速
- D.心房扑动
- E.心房颤动

109.QRS 波增宽，频率 190 次/分，律稍不规则，P 波频率 70 次/分，其诊断是

110.P 波消失，代之以间距、振幅不等的畸形波，频率 360 次/分，QRS 波正常，律绝对不规则，其诊断是

(111~112 题共用选项)

- A.血府逐瘀汤
- B.左归丸
- C.枳实薤白桂枝汤
- D.补阳还五汤
- E.右归丸

111.治疗心绞痛肾阴虚证，应首选的方剂是

112.治疗心绞痛肾阳虚证，应首选的方剂是

(113~114 题共用选项)

- A.活血化瘀，通络止痛
- B.散寒宣痹，芳香温通
- C.豁痰活血，理气止痛
- D.益气活血，祛瘀止痛
- E.益气滋阴，通脉止痛

113.患者胸痛剧烈，如割如刺，胸闷如室，气短痰多，心悸不宁，腹胀纳呆，恶心呕吐，舌苔浊腻，脉滑。治宜

114.患者胸中痛甚，胸闷气促，烦躁易怒，心悸不宁，脘腹胀满，唇甲青暗，舌质紫暗，脉沉弦涩。治宜

(115~116 题共用选项)

- A.温阳利水
- B.回阳固脱
- C.补益心气，活血化瘀
- D.益气养阴，养心安神
- E.清热解毒，宁心安神

115.某男，心悸自汗，形寒肢冷，神疲尿少，下肢水肿，咳喘难以平卧，唇甲青紫，舌质淡暗，苔白滑，脉沉细，其中医治法是

116.某患者，心悸气短，神疲乏力，动则较著，或有自汗，夜寐梦扰，舌暗淡或有瘀点，脉促，其中医治法是

(117~118 题共用选项)

- A.黏膜或黏膜下层有淋巴细胞浸润
- B.黏膜充血，色泽红润，边缘模糊
- C.黏膜呈淡红、灰色，呈弥散性，黏膜变薄
- D.黏膜萎缩伴有化生
- E.水肿与充血区共存，形成红白相间征象

117.慢性浅表性胃炎的组织学可见

118.慢性萎缩性胃炎的组织学可见

(119~120 题共用选项)

- A.龛影
- B.胃黏膜僵直
- C.钡剂潴留
- D.痉挛性切迹
- E.上腹疼痛

119.消化性溃疡的直接征象是

120.消化性溃疡的间接征象是

(121~122 题共用选项)

- A.上消化道出血
- B.肝性脑病
- C.自发性腹膜炎
- D.原发性肝癌
- E.肝肾综合征

121.肝硬化患者最常见的并发症是

122.肝硬化患者最严重的并发症是

(123~124 题共用选项)

- A.四苓散合四物汤
- B.逍遥散合桃红四物汤
- C.茵陈蒿汤合桃红四物汤
- D.茵陈蒿汤合鳖甲煎丸
- E.滋水清肝饮合鳖甲煎丸

123.原发性肝癌气滞血瘀证，治疗应首选的方剂是

124.原发性肝癌湿热瘀毒证，治疗应首选的方剂是

(125~126 题共用选项)

- A.泻心汤合十灰散
- B.龙胆泻肝汤
- C.四味回阳饮
- D.归脾汤
- E.当归补血汤

125.患者吐血紫暗，混有食物残渣，大便黑如漆，口干喜冷饮，胃脘胀闷灼痛，舌红苔黄，脉滑数。治疗应首选的方剂是

126.患者吐血暗淡，大便漆黑稀溏，面色苍白，头晕心悸，神疲乏力，纳少，舌淡红，苔薄白，脉细弱。治疗应首选的方剂是

（127～128 题共用选项）

- A.六君子汤
- B.济生肾气丸
- C.小半夏加茯苓汤
- D.杞菊地黄汤
- E.六味地黄丸

127.慢性肾衰竭脾肾气虚证，治疗应首选的治疗方剂是

128.慢性肾衰竭湿浊证，治疗应首选的治疗方剂是

（129～130 题共用选项）

- A.犀角地黄汤
- B.玉女煎
- C.玉屏风散
- D.桃红四物汤
- E.补阳还五汤

129.原发免疫性血小板减少症阴虚火旺证，治疗应首选的方剂是

130.原发免疫性血小板减少症血热妄行证，治疗应首选的方剂是

（131～132 题共用选项）

- A.逍遥散加减
- B.二陈汤合桃红四物汤加减
- C.杞菊地黄丸加减
- D.右归丸加减
- E.四逆汤合五苓散加减

131.某女性患者，颜面潮红，口苦咽干，神疲乏力，伴心悸失眠，腰膝酸软，头晕目眩，舌质红，苔少，脉细数，治疗此证应首选的方剂是

132.某男性患者，面色白，神疲嗜睡，纳呆便溏，畏寒肢冷，肢体浮肿，腰膝酸软，阳痿，舌质淡，舌体胖大，苔白腻，脉沉迟，治疗此证应首选的方剂是

（133～134 题共用选项）

- A.抗核抗体（ANA）
- B.抗 dsDNA 抗体
- C.抗 RNA 抗体
- D.抗 Sm 抗体
- E.抗 SSA 抗体

133.系统性红斑狼疮患者阳性率最高的抗体是

134.系统性红斑狼疮患者特异性最高的抗体是

（135～136 题共用选项）

- A.毒碱样症状
- B.烟碱样症状
- C.休克
- D.心衰
- E.呼吸衰竭

135.阿托品是对抗有机磷杀虫药中毒的

136.胆碱酯酶复活剂是解除有机磷杀虫药中毒的

(137~138 题共用选项)

- A.葛根芩连汤
- B.保和丸
- C.四神丸
- D.痛泻要方
- E.藿香正气散加减

137.泄泻之湿热伤中证,治疗首选的方剂是

138.泄泻之肝气乘脾证,治疗首选的方剂是

(139~140 题共用选项)

- A.温脾汤
- B.归脾汤
- C.四物汤
- D.当归补血汤
- E.润肠丸

139.血虚秘,治疗应首选的方剂是

140.冷秘,治疗应首选的方剂是

(141~142 题共用选项)

- A.葛根芩连汤
- B.柴胡疏肝散
- C.四神丸
- D.一贯煎
- E.藿香正气散

141.胁痛之肝郁气滞证,治疗首选的方剂是

142.胁痛之肝络失养证,治疗首选的方剂是

(143~144 题共用选项)

- A.逍遥散
- B.六磨汤
- C.枳实导滞丸
- D.大七气汤
- E.血府逐瘀汤

143.治疗聚证食滞痰阻证,首选的方剂是

144.治疗积证气滞血阻证,首选的方剂是

(145~146 题共用选项)

- A.腹内结块聚散无常,痛无定处
- B.自觉腹部胀满,无块物触及
- C.腹内结块有形可征,固定不移,痛有定处
- D.腹部胀满,叩诊呈浊音
- E.左下腹时有结块,大便后消失

145.积的临床特征是

146.聚的临床特征是

(147~148 题共用选项)

- A.二日极量
- B.四日极量
- C.二日常用量

D.三日常用量

E.七日常用量

147.毒性药品每次每张处方不超过

148.第一类精神药品除注射剂、控缓释制剂外，其他剂型每次每张处方不得超过

(149~150 题共用选项)

A.病原携带者

B.自然疫源地

C.病媒生物

D.菌种、毒种

E.人畜共患传染源

149.能够将病原体从人或者其他动物传播给人的生物，如蚊、蝇、蚤类等是

150.可能引起《传染病法》规定的传染病发生的细菌、病毒是参考答案

12345678910DCCBCDEBEC11121314151617181920ABBCABBECE21222324252627282930BBBAA

DBADC31323334353637383940DEEEACBCEA41424344454647484950DDDBAEDBDD5152535455

5657585960DAEEBABBAA61626364656667686970ACCEEBCBEEA71727374757677787980CDADAE

DDAC81828384858687888990BBEDCEDDBB919293949596979899100ACBDACACCE1011021031

04105106107108109110ACECDECDCE111112113114115116117118119120BECAACADAD121122

123124125126127128129130ABBDADACBA131132133134135136137138139140CEADABADEA1

41142143144145146147148149150BDBDCAADCD150-2 试卷标码：1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中西医执业医师资格考试

考前全真模拟试卷（二）

（医学综合笔试部分）

报考类别：中西医结合执业医师

第四单元考试日期：2021 年 8 月

考试时间：14：00—16：00

考生姓名：

准考证号：

考场号：

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。1. 下列关于女性骨盆的叙述，错误的是

- A. 骨盆入口呈横椭圆形
- B. 入口横径长于前后径
- C. 耻骨弓较宽
- D. 坐骨棘间径小于 10 cm
- E. 骶骨切迹呈圆形

2. 下列关于“天癸”的叙述，错误的是

- A. 天癸就是月经
- B. 先有天癸后有月经
- C. 肾气盛才能天癸至
- D. 天癸男女都有
- E. 天癸是一种阴精

3. “主胞胎”的经脉是

- A. 冲脉
- B. 任脉
- C. 督脉
- D. 带脉
- E. 肝脉

4. 下列关于受精的叙述，正确的是

- A. 卵子停留在输卵管峡部等待受精
- B. 精子获能的主要部位是阴道
- C. 精子与卵子相遇时发生顶体反应
- D. 精子与卵子相遇，标志受精过程已开始
- E. 精原核与卵原核相融合，标志受精过程即将完成

5. 下列各项，不属胎儿附属物的是

- A. 胎盘
- B. 胎膜
- C. 胎脂
- D. 脐带
- E. 羊水

6. 孕妇尿中与胎儿胎盘功能关系密切的激素是

- A. 雌二醇
- B. 雌酮
- C. 雌三醇
- D. 孕酮
- E. 睾酮

7. 下列关于正常产道的叙述，正确的是

- A. 中骨盆平面的横径长而前后径短
- B. 入口平面是前后径长而横径短
- C. 出口平面是前后径短而横径长
- D. 骨盆轴的上段向下向后，中段向下，下段向下向前
- E. 骨盆倾斜度正常值为 70°

8. 产后宫颈完全恢复至未孕形态所需要的时间是

A.1 周

B.2 周

C.3 周

D.4 周

E.5 周

9.对女性生理特点的论述中不妥的是

A.女性生理特点主要表现在经、孕、产、乳几方面

B.胞宫是经、孕、产、乳的器官

C.气血通过经络而达到胞宫

D.气血是经、孕、产、乳的物质基础

E.气血来源于脏腑

10.肾阳不足，封藏失职，冲任不固，可导致的妇科疾病是

A.妊娠腹痛

B.胎萎不长

C.不孕

D.经行浮肿

E.崩漏

11.妇科疾病的发生，主要涉及的脏腑是

A.肾、肝、脾

B.脾、肺、肾

C.心、肺、肾

D.心、肝、肾

E.肺、脾、心

12.下列各项，不属物理疗法电疗法的是

A.直流电疗法

B.药物离子导入法

C.紫外线疗法

D.脉冲疗法

E.高频电疗法

13.下列各项，与妊娠剧吐有关的激素是

A.雌激素

B.孕激素

C.绒毛膜促性腺激素

D.促黄体生成素

E.催乳素

14.胎动不安的主要病机是

A.冲任不固，胎失所系

B.冲任损伤，胎元不固

C.冲任不固，胎元不健

D.热扰冲任，损伤胎气

E.瘀阻胞脉，胎失所养

15.妊娠合并心脏病的孕妇死亡的主要原因是

A.心脏病病程长

B.未经产前检查

- C.孕妇年龄大
- D.心衰与感染
- E.孕周过大

16. 下列关于加强子宫收缩的处理措施的叙述, 属需专人监护的是

- A.灌肠
- B.人工破膜
- C.针刺
- D.缩宫素静脉滴注
- E.排空膀胱

17. 下列关于胎动次数的叙述, 属胎儿窘迫的是

- A.胎动<10 次/12 小时
- B.胎动<15 次/12 小时
- C.胎动<20 次/12 小时
- D.胎动<25 次/12 小时
- E.胎动<30 次/12 小时

18. 下列各项, 能引起胎儿在很短的时间内死亡的是

- A.脐带过长
- B.脐带脱垂
- C.脐带过短
- D.脐带假结
- E.脐带扭转

19. 下列关于产后感染邪毒发热主证的叙述, 错误的是

- A.高热寒战
- B.小腹疼痛拒按
- C.恶露色暗如败酱
- D.口干不欲饮
- E.舌红, 苔黄, 脉数

20. 下列关于女性生殖系统炎症的叙述, 错误的是

- A.滴虫阴道炎患者其性配偶也应检查
- B.生殖器炎症常为需氧菌及厌氧菌混合感染
- C.衣原体支原体所致生殖器炎症属性传播疾病
- D.滴虫阴道炎治疗一疗程后复查阴性即为治愈
- E.外阴阴道念珠菌病久治不愈, 应查血糖

21. 生育期无排卵性异常子宫出血的治疗原则是

- A.减少月经量, 纠正贫血
- B.调整周期, 减少月经量
- C.调整垂体与性腺功能
- D.止血, 调整周期, 促排卵
- E.促进子宫发育, 调整垂体功能

22. 下述各项, 不属排卵期出血特点的是

- A.月经中期出血
- B.出血量少
- C.基础体温双相
- D.出血常发生在体温开始上升时

E.多发生在青春期

23.下列各项，属确诊宫颈癌最可靠的方法是

A.宫颈刮片细胞学检查

B.阴道镜检查

C.宫颈锥切术

D.宫颈活组织检查

E.碘试验检查

24.下列各项，对宫颈癌确诊最可靠的方法是

A.阴道细胞涂片

B.宫颈多点活检病理检查

C.妇科检查宫颈组织硬、脆、易出血

D.宫颈刮片细胞学检查

E.阴道镜检查

25.下列各项，对诊断葡萄胎最有意义的是

A.子宫妊娠 5 个月大小，摸不到胎体

B.盆腔 B 超示落雪状影像

C.血 HCG > 100 kU/L

D.下腹疼痛

E.停经后阴道流血

26.下列各项，不属葡萄胎排出后随访内容的是

A.定期做妇科检查

B.至少避孕 6 个月

C.定期做 HCG 定量测定

D.定期做阴道细胞学检查

E.定期做胸部 X 线摄片

27.下列关于子宫腺肌病治疗的叙述，错误的是

A.已近绝经期的患者可保守治疗

B.长期剧烈痛经者应行子宫全切术

C.年轻患者可用高效孕激素治疗

D.GnRH-a 可导致人工绝经和缓解症状

E.服用布洛芬仅为对症治疗

28.最易被子宫内膜异位症侵犯的器官是

A.卵巢

B.输卵管

C.肠管

D.输尿管

E.膀胱

29.下列关于预防子宫脱垂措施的叙述，错误的是

A.严密观察产程，避免滞产和第二产程延长

B.产后绝对卧床休息，避免劳动

C.对头盆不称者应及早剖宫产

D.预防加重腹压的慢性疾病

E.加强营养

30.区分原发性不孕和继发性不孕的主要依据是

- A.结婚 2 年以上未孕
- B.夫妻同居
- C.未采取避孕措施
- D.是否孕育过
- E.有正常性生活

31.小儿体格发育最快的时期是

- A.新生儿期
- B.婴儿期
- C.幼儿期
- D.学龄前期
- E.学龄期

32.下列各项，不属小儿生理特点的是

- A.脏腑娇嫩
- B.形气未充
- C.生机蓬勃
- D.发育迅速
- E.发病容易

33.卫气营血辨证与三焦辨证常用于治疗的疾病是

- A.心理性疾病
- B.急性传染病
- C.营养性疾病
- D.结缔组织病
- E.肠寄生虫病

34.下列描述，不属新生儿黄疸寒湿阻滞证特征的是

- A.神疲倦怠
- B.目黄身黄
- C.四肢欠温
- D.黄色鲜明
- E.舌淡苔白腻

35.寒湿阻滞型新生儿黄疸的中医治法是

- A.清热利湿退黄
- B.活血化瘀退黄
- C.温中化湿退黄
- D.清肝利胆退黄
- E.温阳健脾退黄

36.诊断急性支气管炎，主要的肺部体征是

- A.双肺可及捻发音
- B.双肺呼吸音增粗
- C.双肺呼吸音减弱
- D.双肺可有固定的干湿啰音，体位改变可减少或消失
- E.双下肺可闻及固定湿啰音

37.支气管肺炎与支气管炎的主要区别是

- A.固定的细湿啰音
- B.白细胞增高

C.呼吸音减弱

D.气促

E.发热、频咳

38.肺炎按病因分类,下列错误的是

A.大叶性肺炎

B.过敏性肺炎

C.病毒性肺炎

D.霉菌性肺炎

E.细菌性肺炎

39.治疗哮喘肾虚不纳证的首选方剂是

A.右归饮

B.金匱肾气丸

C.左归饮

D.六味地黄丸

E.人参大补丸

40.下列各项,不属病毒性心肌炎诊断指标的是

A.心脏同位素扫描发现心室扩大

B.有心脏扩大、心包炎表现之一

C.多汗、心悸、胸闷

D.奔马律或心包摩擦音

E.高血压

41.诊断病毒性心肌炎最常作的检查是

A.心电图

B.心电向量

C.螺旋CT

D.胸部X线摄片

E.心脏彩色多普勒检查

42.鹅口疮的病位是

A.肝胆脾

B.肝脾胃

C.脾肝肾

D.心肺肾

E.心脾肾

43.小儿湿热泄泻证的首选方剂是

A.芍药汤

B.藿香正气散

C.香连丸

D.白头翁汤

E.葛根黄芩黄连汤

44.常见肠炎类型不包括

A.轮状病毒肠炎

B.肠梗阻

C.诺如病毒肠炎

D.产毒性细菌引起的肠炎

E.侵袭性细菌引起的肠炎

45.对急性肾炎诊断和鉴别诊断最有价值的血液化验是

A.抗链球菌溶血素 O 增高 (ASO)

B.4~8 周内总补体及 C3 暂时性下降

C.轻度贫血

D.白细胞总数增高

E.血沉增快

46.多数急性肾小球肾炎患儿镜下血尿消失的时间是

A.1~2 周内

B.2~4 周内

C.1~2 个月

D.2~3 个月

E.1~3 个月

47.小儿肾病综合征大量蛋白尿的定量标准是

A.>50 mg/kg/24 小时

B.>25 mg/kg/24 小时

C.>70 mg/kg/24 小时

D.>75 mg/kg/24 小时

E.>60 mg/kg/24 小时

48.下列各项,不属肾病综合征常见并发症的是

A.感染

B.电解质紊乱

C.肾静脉血栓

D.高血压脑病

E.生长迟缓

49.下列各项,不属病毒性脑炎脑脊液特点的是

A.脑脊液压力正常或增高,外观清亮或微浊

B.白细胞数轻度增多,先以中性为主后以淋巴为主

C.蛋白质轻中度升高,糖含量正常

D.涂片和培养无细菌发现

E.脑脊液外观浑浊有薄膜

50.癫痫持续状态的首选药物是

A.水合氯醛

B.甘露醇

C.苯巴比妥钠

D.苯妥英钠

E.地西洋

51.小儿抽动障碍的基本病理改变是

A.瘀血阻窍

B.肝风痰火胶结成疾

C.痰瘀互阻

D.肝风内动

E.痰蒙清窍

52.注意力缺陷多动障碍的好发年龄是

- A.新生儿期
- B.婴儿期
- C.幼儿期
- D.学龄前期
- E.学龄期

53. 营养性缺铁性贫血，铁剂治疗后停药的指征是

- A.血清铁恢复正常
- B.血红蛋白及红细胞恢复正常
- C.面色转红，精神及食欲好转
- D.网织红细胞升高后再用 1~2 个月
- E.血红蛋白及红细胞恢复正常后再用 6~8 周

54. 免疫性血小板减少症慢性型的病程是

- A.病程>1 个月
- B.病程>2 个月
- C.病程>3 个月
- D.病程>5 个月
- E.病程>6 个月

55. 真性与假性性早熟最有意义的诊断标准是

- A.生长加速
- B.骨龄提前
- C.GnRH 激发试验
- D.乳房发育
- E.月经来潮

56. 儿童期糖尿病的诊断标准

- A.空腹血糖 ≥ 7.0 mmol/L
- B.空腹血糖 < 7.0 mmol/L
- C.空腹血糖 < 6.0 mmol/L
- D.随机血糖 ≥ 10.0 mmol/L
- E.随机血糖 < 11.1 mmol/L

57. 风湿性心内膜炎最常受累的瓣膜是

- A.肺动脉瓣
- B.主动脉瓣
- C.二尖瓣及三尖瓣
- D.三尖瓣
- E.二尖瓣

58. 过敏性紫癜患儿最易出现的内脏损害是

- A.心
- B.肝
- C.肺
- D.肾
- E.脾

59. 蛋白质-能量营养不良实验室检查最敏感的指标改变是

- A.血清白蛋白浓度降低
- B.血沉加快

C.贫血

D.血清碱性磷酸酶降低

E.血清淀粉酶下降

60.蛋白质一能量营养不良最为常见的并发症是

A.感染

B.佝偻病

C.微量元素缺乏

D.自发性低血糖

E.营养性贫血

61.足三阳经在下肢的分布规律是

A.太阳在前，阳明在中，少阳在后

B.太阳在前，少阳在中，阳明在后

C.少阳在前，太阳在中，阳明在后

D.阳明在前，太阳在中，少阳在后

E.阳明在前，少阳在中，太阳在后

62.相互衔接的阴经与阴经的循行交接部位是

A.头面部

B.肘膝部

C.胸部

D.腹部

E.手足末端

63.足三阳经的循行规律是

A.从胸走手

B.从足走头

C.从头走足

D.从足走胸

E.从胸走足

64.最新国家标准规定的经穴数是

A.354 个

B.359 个

C.361 个

D.362 个

E.365 个

65.手厥阴心包经的主治特点是

A.心病

B.心、胃病

C.肺、喉病

D.肝病、脾胃病

E.肾、肺、咽喉病

66.下列各项中，叙述不正确的是

A.所根为井

B.所溜为荥

C.所注为输

D.所行为经

E.所入为合

67.脏腑之气汇聚于胸腹部的腧穴称为

- A.原穴
- B.络穴
- C.募穴
- D.五输穴
- E.八会穴

68.大肠的下合穴是

- A.合谷
- B.曲池
- C.天枢
- D.上巨虚
- E.下巨虚

69.不属于足阳明胃经五输穴的是

- A.厉兑
- B.解溪
- C.内庭
- D.陷谷
- E.丰隆

70.耳后两乳突之间的骨度分寸是

- A.4 寸
- B.6 寸
- C.8 寸
- D.9 寸
- E.12 寸

71.肺的募穴所属的经脉是

- A.肺经
- B.任脉
- C.胃经
- D.脾经
- E.肾经

72.下列各项中，不正确的是

- A.肩髃属于手少阳三焦经
- B.养老属于手太阳小肠经
- C.肩髃属于手阳明大肠经
- D.阳池属于手太阳小肠经
- E.后溪属于手太阳小肠经

73.头维穴所属的经脉是

- A.足少阳胆经
- B.足阳明胃经
- C.足太阳膀胱经
- D.手阳明大肠经
- E.手少阳三焦经

74.额旁 2 线的主治病证是

- A.精神失常、心肺疾患
- B.急慢性胃炎、肝胆疾患
- C.功能性子宫出血、阳痿、尿频
- D.腰腿足病、脱肛、小儿夜尿
- E.肩、臂、手等病证

75.属于针灸治疗作用的是

- A.扶正祛邪
- B.联系脏腑
- C.运行气血
- D.抗御病邪
- E.沟通内外

76.治疗太阳头痛应配用的是

- A.天柱、后溪、昆仑
- B.率谷、外关、足临泣
- C.印堂、内庭、偏历
- D.太冲、内关、四神聪
- E.血海、膈俞、内关

77.针灸治疗实证痛经应主取的经穴是

- A.任脉、足少阴经
- B.任脉、足厥阴经
- C.任脉、足太阴经
- D.冲脉、足厥阴经
- E.督脉、足厥阴经

78.有关针灸治疗蛇串疮，叙述不正确的是

- A.以局部阿是穴、相应夹脊穴为主
- B.毫针刺，泻法，强刺激
- C.疱疹局部阿是穴用围刺法
- D.出现的疱疹不能用三棱针点刺
- E.后遗神经痛者可在局部用皮肤针叩刺

79.治疗耳聋实证，应主选的是

- A.足少阴、手太阳经穴
- B.足少阳、手少阳经穴
- C.足少阴、手少阴经穴
- D.足少阳、手少阴经穴
- E.足少阴、手少阳经穴

80.有关针灸治疗胆道蛔虫症，叙述不正确的是

- A.治疗以足少阳经穴、胆的俞募穴为主
- B.毫针刺，用泻法
- C.可以选用针刺迎香透四白
- D.耳针治疗可取肝、胰胆、交感、神门、耳迷根等
- E.胆囊穴只用于治疗胆囊炎不用于治疗胆道蛔虫症

81.在跖区，第1跖趾关节近端赤白肉际凹陷中的腧穴是

- A.太冲
- B.太白

- C.公孙
- D.然谷
- E.行间

82.在手指,小指末节桡侧,指甲根角侧上方 0.1 寸的腧穴是

- A.少冲
- B.少府
- C.少泽
- D.少商
- E.中冲

83.属于手太阳小肠经的腧穴是

- A.听会
- B.听宫
- C.耳门
- D.神门
- E.下关

84.下列腧穴中,常用于治疗呃逆的是

- A.睛明
- B.攒竹
- C.承泣
- D.四白
- E.印堂

A2 型题答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

85.产妇临产 8 小时,肛诊检查头先露,宫口已开全,先露+4。此时产力的组成是

- A.子宫收缩力
- B.子宫收缩力+腹肌收缩力
- C.子宫收缩力+膈肌收缩力
- D.子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力
- E.子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力+肛提肌收缩力

86.患者,女,26 岁,已婚。孕 48 天,阴道不规则出血 5 天,突感一侧下腹撕裂样剧痛,拒按。首先应考虑的诊断是

- A.胎动不安
- B.胞阻
- C.异位妊娠
- D.堕胎
- E.小产

87.患者,女,24 岁,G1P1。现孕 36 周,“先兆子痫”入院。入院后 2 天,经治疗血压持续在 165/120 mmHg,感视物模糊,现自数胎动减少,做 NST 为无反应型,再做 B 型超声生物物理评分为 3 分。应首选的治疗措施是

- A.立即终止妊娠
- B.继续治疗妊娠高血压病至妊娠 37 周
- C.次日复查 NST
- D.吸氧观察

E.做 OCT

88.初产妇,27岁。妊娠足月,腹坠胀12小时,昨晚未入睡,今日来院就诊。骨盆外测量正常,LOT,胎心好,宫缩20秒/7~10分钟,宫口开大1cm,先露S-1,胎膜未破。应首选的治疗措施是

A.剖宫产

B.肌注哌替啶100mg

C.肌注缩宫素2.5U

D.人工破膜

E.等待自然分娩

89.患者,女,35岁。新产后,突然阴道大量出血,血色鲜红,冷汗淋漓,四肢厥逆,脉微欲绝。治疗应首选的方剂是

A.升举大补汤

B.独参汤

C.生脉散

D.人参黄芪汤

E.圣愈汤

90.患者,女,34岁。产后5天,高热不退,烦渴引饮,大便燥结,恶露不畅,臭秽如脓,小腹疼痛拒按,神昏谵语,舌紫暗,苔黄而燥,脉滑数。治疗应首选的方剂是

A.解毒活血汤

B.大黄牡丹皮汤

C.清营汤

D.安宫牛黄丸

E.五味消毒饮

91.患者,女,48岁。外阴瘙痒逐渐加重3年,抓破后伴有局部疼痛。查见大阴唇、阴唇间沟等处皮肤有抓痕,黏膜变白,皮肤变薄、干燥、失去弹性。首先应考虑的诊断是

A.外阴增生型营养不良

B.外阴硬化性苔藓

C.外阴白癜风

D.外阴银屑病

E.外阴湿疹

92.患者,女,45岁,已婚。月经紊乱1年,15~20天/40~60天,量时多时少,此次经停50天后阴道持续出血半月。妇检阴道有多量血液,子宫正常大小,附件(-)。血红蛋白80g/L。应首选的治疗措施是

A.雌激素

B.孕激素

C.雄激素

D.子宫切除术

E.诊刮术

93.患者,女,20岁。近半年来出现月经提前,甚则半月一行,经量时多时少,色紫红,夹有瘀块,伴胸闷肋胀,烦躁易怒,口苦咽干,舌红,苔薄,脉弦数。其中医证型是

A.阳盛血热型

B.气虚型

C.虚热型

D.血瘀型

E.肝郁血热型

94.患者，女，35岁。性交后阴道流血2个月，妇科检查见宫颈中度糜烂，宫颈活组织检查示异型细胞占据上皮层的下1/3~2/3。应首选的治疗措施是

- A.暂时按炎症处理
- B.行子宫全切除术
- C.行激光、冷凝等治疗，术后定期随访
- D.行子宫全切及双侧附件切除术
- E.暂不需处理，随访观察

95.患者，女，24岁，已婚。停经35日，阴道流血1日，血HCG>100 KU/L。首先应考虑的诊断是

- A.早期妊娠
- B.多胎妊娠
- C.先兆流产
- D.异位妊娠
- E.葡萄胎

96.患者，女，30岁。婚后5年不孕，近6年开始痛经，进行性加重，曾做子宫输卵管碘油造影提示双侧输卵管通而不畅。妇科检查：阴道后穹隆扪及触痛结节，子宫大小正常，右附件区扪及4cm×4cm×3cm大小不活动的囊性包块。为明确诊断，应首选的检查是

- A.腹腔镜检查
- B.宫腔镜检查
- C.盆腔B超检查
- D.剖腹探查
- E.盆腔CT检查

97.患者，女，38岁。痛经6年，每于经前小腹冷痛，经血色暗、有块，形寒肢冷，面色苍白，舌紫暗，苔薄白，脉沉紧。治疗应首选的方剂是

- A.少腹逐瘀汤
- B.膈下逐瘀汤
- C.血府逐瘀汤
- D.桃红四物汤
- E.艾附暖宫丸

98.患者，女，62岁。外阴脱出肿物1年。妇科检查：部分宫体脱出阴道。首先应考虑的诊断和治疗是

- A.子宫Ⅱ度脱垂—手术
- B.子宫Ⅱ度脱垂—重—手术
- C.子宫Ⅲ度脱垂—手术
- D.子宫Ⅰ度脱垂—轻—子宫托
- E.子宫Ⅰ度脱垂—重—子宫托

99.患者，女，29岁。结婚4年未孕，月经38~50天一行，量少色淡，面色晦暗，腰酸腿软，性欲淡漠，舌淡，苔白滑，脉沉细。其中医治法是

- A.滋阴养血，调冲益精
- B.温肾益气，调补冲任
- C.疏肝解郁，养血调经
- D.燥湿化痰，理气调经
- E.凉血化瘀，调经助孕

100. 患儿，1 岁。轻咳流涕，伴有喷嚏，心肺正常，指纹淡紫于风关。其病情判断是

- A. 邪浅病轻
- B. 病情较重
- C. 邪入气营
- D. 病情凶险
- E. 病邪入里

101. 足月男婴，出生后 6 小时即出现身黄、目黄，颜色鲜明，哭闹不安、呕吐、尿黄，舌质红，苔黄，指纹紫滞。治疗首选方剂是

- A. 茵陈理中汤加减
- B. 茵陈蒿汤加减
- C. 黄连解毒汤加减
- D. 羚角钩藤汤加减
- E. 膈下逐瘀汤加减

102. 患儿，3 岁。咳嗽 3 天，先为干咳，渐有黏痰，双肺听诊呼吸音粗，可闻干啰音，血象正常。其可能的诊断是

- A. 支气管肺炎
- B. 急性喉炎
- C. 急性气管炎
- D. 上呼吸道感染
- E. 支气管哮喘

103. 患儿，8 岁。发热 2 天，咳嗽 1 天，伴咽痛流浊涕，头痛，易出汗，咳痰黄。查体：体温 37.8°C ，咽充血，舌质红，舌苔薄黄，脉浮数。其诊断是

- A. 痰热咳嗽
- B. 阴虚燥咳
- C. 风热咳嗽
- D. 风寒咳嗽
- E. 痰湿咳嗽

104. 患儿，5 岁。2 周前曾患感冒，现觉乏力，时有胸痛，间见憋气，纳差便调，咽红咳嗽，苔黄，脉数。治疗应首选的方剂是

- A. 生脉散
- B. 银翘散
- C. 失笑散
- D. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- E. 葛根黄芩黄连汤

105. 患儿，9 个月。腹泻时曾服用抗生素 1 周，现症见满口白屑，状如雪花。应首先考虑的诊断是

- A. 幼儿急疹
- B. 乳垢
- C. 正常
- D. 鹅口疮
- E. 麻疹

106. 患儿，1 岁半。发热腹泻半天就诊。泻下稀薄，水分较多，粪色深黄而臭，微见黏液，腹部时觉疼痛，食欲不振，伴泛恶，口渴，小便短黄，肛门灼热发红，舌苔黄腻，其治法是

- A. 消食化积

- B.清热利湿
- C.健脾益气
- D.疏风散寒
- E.补脾温肾

107.患儿，6岁。患急性肾小球肾炎1周，症见肢体浮肿，尿少，咳嗽气急，喘息不得平卧，心悸胸闷，口唇青紫，脉细无力。其证型是

- A.水凌心肺
- B.湿热内侵
- C.邪陷厥阴
- D.风水相搏
- E.水毒内闭

108.患儿，3岁。发作性瞪目直视，神志恍惚，痰涎壅盛，喉间痰鸣，发作后玩耍如常。舌苔白腻，脉滑。其治法是

- A.涤痰开窍
- B.健脾化痰
- C.化瘀通窍
- D.息风止痉
- E.镇惊安神

109.患儿，10岁。经常挤眉眨眼，耸肩摇头，口出秽语，肢体震颤，大便干结，五心烦热，两颧潮红，形体消瘦，舌质红绛，舌苔光剥，脉细数无力。治疗应首选的方剂是

- A.醒脾散
- B.大定风珠
- C.川芎茶调散
- D.礞石滚痰丸
- E.千金龙胆汤

110.患儿，7个月。母乳喂养，未加辅食，食欲不振，皮肤黏膜渐苍白，肝肋下3cm，脾肋下1.5cm，血红蛋白70g/L，红细胞 $3.5 \times 10^9/L$ 。其诊断是

- A.营养性大细胞性贫血
- B.营养性缺铁性贫血
- C.营养性感染性贫血
- D.生理性贫血
- E.先天性再生障碍性贫血

111.患儿，女，9岁。口渴多饮，随饮随渴，舌燥咽干，尿频量多，舌尖红，苔薄黄少津，脉细数。证属

- A.肺热津伤
- B.胃燥津伤
- C.肾阴亏损
- D.阴阳两虚
- E.脾胃虚寒

112.患儿，2个月。足月顺产，母乳喂养，为预防佝偻病服用维生素D，每日补充的合理剂量是

- A.200 U
- B.400 U
- C.2 000 U

D.5 000 U

E.10 000 U

113.患儿，3岁。麻疹见疹已6日，现高热不退，咳嗽气急，鼻翼扇动，口渴烦躁，疹点密集色暗，舌红苔黄，脉数。其证型是

A.麻疹逆证，麻毒闭肺

B.麻疹逆证，热毒攻喉

C.麻疹逆证，邪陷心肝

D.麻疹顺证，初热期

E.麻疹顺证，见形期

114.患儿，4岁。脐周腹痛，时作时止，面色萎黄，日渐消瘦，恶心呕吐，大便排出蛔虫1条。寐中磨牙，其治疗首选的方剂是

A.化食丸加减

B.乌梅丸加减

C.舟车丸加减

D.保和丸加减

E.使君子散加减

115.患者3个月前突发高热，热退后出现周身乏力，下肢痿软无力，食少腹胀便溏，神疲乏力。治疗应主选的是

A.手足少阳经穴、夹脊穴

B.手足阳明经穴、夹脊穴

C.手足太阳经穴、夹脊穴

D.手足太阴经穴、夹脊穴

E.手足厥阴经穴、夹脊穴

116.患者一侧头痛反复发作，并常伴恶心、呕吐，对光及声音过敏者，针灸治疗除局部穴外，宜主取的是

A.督脉及手、足太阳经穴

B.督脉及手、足少阳经穴

C.督脉及手、足阳明经穴

D.足厥阴及手、足阳明经穴

E.足厥阴及手、足少阳经穴

117.某男，40岁。突然眼前发黑，昏倒不省人事，呼吸急促，牙关紧闭，舌淡，苔薄，脉沉弦。治疗应选用的腧穴是

A.水沟、曲池、合谷、足三里

B.水沟、素髀、内关、三阴交

C.水沟、百会、内关、足三里

D.素髀、厉兑、太冲、足三里

E.素髀、厉兑、太冲、三阴交

118.治疗月经周期不规律，经量少，色淡，腰骶酸痛，头晕，舌淡苔白，脉沉弱，针灸治疗应主选的经脉是

A.任脉、足少阴经

B.任脉、足厥阴经

C.任脉、足太阴经

D.带脉、冲脉、任脉

E.任脉、督脉、冲脉

119.某女,20岁。食海鲜后皮肤出现大小不等、形状不一的风团,高起皮肤,边界清楚,色红,瘙痒,伴恶心,肠鸣泄泻,舌红,苔黄腻脉滑数。除主穴外,应加取

- A.大椎、风门
- B.足三里、天枢
- C.风门、肺俞
- D.足三里、脾俞
- E.三阴交、风池

120.患者两眼红肿疼痛,眵多,畏光,流泪,兼见头痛,发热,脉浮数。针灸治疗宜

- A.少商、太阳点刺出血
- B.行间、侠溪点刺出血
- C.外关、中渚点刺出血
- D.少商、上星毫针泻法
- E.内庭、曲池毫针泻法

B1 型题答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。(121~122 题共用选项)

- A.卵巢固有韧带
- B.主韧带
- C.骶韧带
- D.骨盆漏斗韧带
- E.圆韧带

121.从输卵管伞端下方向外延伸达骨盆壁的韧带是

122.起于子宫双角前面,止于大阴唇前端的韧带是

(123~124 题共用选项)

- A.崩漏
- B.子肿
- C.带下病
- D.妊娠腹痛
- E.产后排便异常

123.与气虚有关的病证是

124.与湿热有关的病证是

(125~126 题共用选项)

- A.米非司酮
- B.三苯氧胺
- C.溴隐亭
- D.环磷酰胺
- E.雌二醇

125.具有抗早孕作用的药物是

126.具有抗催乳素作用的药物是

(127~128 题共用选项)

- A.妊娠恶阻
- B.妊娠肿胀
- C.妊娠咳嗽

D.胎动不安

E.胎萎不长

127.孕后阴血聚于下，使冲气偏盛，胃失和降，可致的妇科病证是

128.素体虚弱，肾气不足，冲任不固，系胎无力，可致的妇科病证是

(129~130 题共用选项)

A.根治性手术

B.半根治性手术

C.切除病灶，保留生育功能

D.中药治疗

E.假孕疗法

129.子宫内膜异位症，症状轻微者，应首选的治疗是

130.子宫内膜异位症，要求生育者，应首选的治疗是

(131~132 题共用选项)

A.纯阳之体

B.体秉纯阳

C.稚阳之体

D.稚阴之体

E.稚阴稚阳之体

131.“脏腑娇嫩，形体未充”表明小儿是

132.“生机蓬勃，发育迅速”表明小儿是

(133~134 题共用选项)

A.茵陈蒿汤

B.茵陈四苓散

C.羚角钩藤汤合茵陈蒿汤

D.血府逐瘀汤

E.膈下逐瘀汤

133.治疗新生儿黄疸湿热熏蒸证应首选的方剂是

134.治疗新生儿黄疸瘀积发黄证应首选的方剂是

(135~136 题共用选项)

A.上呼吸道感染每年 8 次，下呼吸道感染每年 3 次

B.上呼吸道感染每年 7 次，下呼吸道感染每年 3 次

C.上呼吸道感染每年 6 次，下呼吸道感染每年 3 次

D.上呼吸道感染每年 6 次，下呼吸道感染每年 2 次

E.上呼吸道感染每年 5 次，下呼吸道感染每年 2 次

135.0~2 岁小儿反复呼吸道感染的诊断标准是

136.3~5 岁小儿反复呼吸道感染的诊断标准是

(137~138 题共用选项)

A.酸中毒

B.严重循环充血和急性心力衰竭

C.营养不良

D.血液高凝状态和血栓形成

E.中毒性脑病

137.肾病综合征的常见并发症是

138.急性肾小球肾炎的常见并发症是

(139~140 题共用选项)

- A.营养性缺铁性贫血
- B.血小板减少性紫癜
- C.营养性巨幼红细胞性贫血
- D.再生障碍性贫血
- E.混合性贫血

139.患儿周围血常规检查: MCV 79 fL, MCHC 30%, HGB 90 g/L, PLT $150 \times 10^9/L$, WBC $9 \times 10^9/L$, 其诊断是

140.患儿周围血常规检查: MCH 28 pg/L, HGB 60 g/L, PLT $80 \times 10^9/L$, WBC $3.2 \times 10^9/L$, 其诊断是

(141~142 题共用选项)

- A.陷下则灸之
- B.热则疾之
- C.寒则留之
- D.标本同治
- E.三因制宜

141.属于补虚泻实治疗原则的是

142.属于治病求本治疗原则的是

(143~144 题共用选项)

- A.翳风、中渚
- B.听宫、中渚
- C.行间、丘墟
- D.中渚、侠溪
- E.外关、合谷

143.治疗耳鸣的处方中, 属于同名经配穴的是

144.治疗耳鸣的处方中, 属于本经配穴的是

(145~146 题共用选项)

- A.印堂
- B.上星
- C.素髎
- D.水沟
- E.百会

145.既治疗急危重症, 又治疗鼻病的腧穴是

146.既治疗急危重症, 又治疗闪挫腰痛的腧穴是

(147~148 题共用选项)

- A.鼻炎、目疾、齿痛
- B.头痛、眩晕、失眠
- C.感冒、头痛、发热
- D.小便不利、便秘、腹痛
- E.消渴、胃痛、胸胁痛

147.在项部, 当翳风穴与风池穴连线的中点处的腧穴善于治疗的病证是

148.在脊柱区, 横平第 8 胸椎棘突下, 后正中线旁开 1.5 寸的腧穴善于治疗的病证是

(149~150 题共用选项)

- A.隔盐灸

- B.温针灸
- C.白芥子灸
- D.雷火针灸
- E.无瘢痕灸

149.属于天灸的是

150.属于实按灸的是

参考答案

12345678910DABCCDDBE11121314151617181920ACCBDDABDD21222324252627282930DEDB
BDCABD31323334353637383940BEBDCDAABE41424344454647484950AEEBBEADDEE515253545
55657585960BEECAEDAE61626364656667686970ECCDBACDED71727374757677787980ADBBA
ACDBE81828384858687888990BABBECABAE919293949596979899100BEECEAAABBA1011021031
04105106107108109110BCCBDBAABB111112113114115116117118119120ABAEBECCBA121122
123124125126127128129130DEACACADDC131132133134135136137138139140EAADBDDBAD1
41142143144145146147148149150ADDACDBECD