

# 2021 年国家乡村全科助理医师资格

## (医学综合笔试部分)

报考类别：乡村全科助理医师



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

1.(A1/A2 型题)以上各类心理学中,研究心理咨询.心理诊断的属于

- A.生理心理学
- B.健康心理学
- C.神经心理学
- D.临床心理学
- E.变态心理学

答案: D

解析: 临床心理学工作者去帮助那些存在心理困扰的人们,例如心理治疗和心理咨询工作就是临床心理学的重要内容。

2.(A1/A2 型题)以下哪项不属于医学心理学的研究任务的是

- A.心理社会因素在疾病的发生.发展和变化过程中的作用规律
- B.心理评估手段在疾病的诊断.治疗.护理与预防中的作用
- C.医院管理中存在的心理问题及系统的解决方法
- D.运用心理治疗的方法达到治病.防病与养生保健的目的
- E.患者心理活动的特点以及心理护理的方法的运用

答案: C

解析: 医学心理学的研究任务:心理社会因素在疾病的发生.发展和变化过程中的作用规律;心理评估手段在疾病的诊断.治疗.护理与预防中的作用;运用心理治疗的方法达到治病.防病与养生保健的目的;患者心理活动的特点以及心理护理的方法的运用。

3.(A1/A2 型题)对于疾病和健康,无论致病.治疗.预防.康复都应把人视为一个整体,属于

- A.神灵主义医学模式
- B.机械论医学模式
- C.自然哲学医学模式
- D.生物医学模式
- E.生物-心理-社会医学模式

答案: E

解析: 1977 年美国医生恩格尔 (Engle G.L.) 在美国《科学》杂志上著文《需要新的医学模式》,批评了生物医学模式的“还原论”

和“心身二元论”,并提出了生物-心理-社会医学模式。这一模式认为,对于疾病和健康问题来说,无论是致病.治病.预防及康复,都应把人视为一个整体,充分考虑到患者的心理因素和社会因素的特点,综合考虑各方面因素的交互作用,而不能机械地将它们分割开。

4.(A1/A2 型题)心理健康的标准包括

- A.人格健全
- B.知识丰富
- C.生活富足
- D.品质高洁
- E.行为高尚

答案: A

解析: 马斯洛和米特尔曼提出的心理健康的十条标准: ①有充分的自我安全感;能充分了解自己,并能恰当估价自己的能力;③生活理想切合实际;④不脱离周围现实环境;⑤能保持人格的完整与和谐;⑥善于从经验中学习;⑦能保持良好的人际关系;⑧能适度地宣泄情绪和控制情绪;⑨在符合团体要求的前提下,能有限度地发挥个性;⑩在不违背社会规范的前提下,能适当地满足个人的基本需求。我国学者提出的心理健康的标准包括智力正常、情绪良好、人际和谐、适应环境及人格完整。故选 A。

5.(A1/A2 型题)不应列为心理应激对健康的消极影响的是

- A.使已有的疾病加重
- B.适应性调整,恢复内稳态
- C.使原有的疾病复发
- D.损害适应能力,引发心身症状
- E.与其他因素共同影响引发新的疾病

答案: B

解析: 应激的消极意义: ①频繁、强烈而突发过度的应激可造成机体唤醒障碍(唤醒不足或过度),耗损过度,适应能力减弱,使心身功能和社会活动障碍,作业能力受损,工作、学习效率下降,引发事故和车祸。②持久和慢性应激,使机体处于适应不良和易感状态,耗竭机体储备,神经内分泌功能紊乱,免疫功能下降,导致心身疾病,引发精

神障碍，加重原有的躯体和精神疾病。③应  
激引起适应不良，造成个体认知上的悲观预  
测，社会适应功能下降，出现行为障碍。故  
选 B。

6.(A1/A2 型题)不在心身疾病的范围之内的是

- A.原发性高血压
- B.继发性高血压
- C.冠心病
- D.溃疡病
- E.习惯性便秘

答案：B

解析：此题暂无解析

7.(A1/A2 型题)可预防心身疾病的措施不包括

- A.减少负性情绪对健康的不良影响
- B.正确认识各种生活事件
- C.养成健康的行为习惯和生活方式
- D.多参加社会活动
- E.劳逸结合不超负荷工作

答案：D

解析：此题暂无解析

8.(A1/A2 型题)与 C 型行为特征关系密切的疾病是

- A.癌症
- B.糖尿病
- C.消化性溃疡
- D.冠心病
- E.原发性高血压

答案：A

解析：此题暂无解析

9.(A1/A2 型题)每逢不良行为出现时即给予  
一痛苦刺激，如电刺激、呕吐等，经过一定  
时间反复训练，不良行为就和不愉快体验建  
立了条件联系。通常用于酒精中毒、药物依  
赖、性变态和某些病人的自伤行为。这种治  
疗方法是

- A.系统脱敏法
- B.满灌疗法
- C.厌恶疗法

D.操作性行为矫正

E.松弛疗法

答案：C

解析：厌恶疗法(是一种通过轻微的惩罚来  
消除适应不良行为的治疗方法。当某种适应  
不良行为即将出现或正在出现时,当即给予  
一定的痛苦刺激,如轻微的电击、针刺或催  
吐剂,使其产生厌恶的主观体验。经过反复  
实施,适应不良行为和厌恶体验就建立了一  
定的条件联系,以后当欲实施一定行为时,  
便立刻产生了厌恶体验。为了避免这种厌恶  
体验,患者只有终止或放弃原有的适应不良  
行为。故选 C。

10.(A1/A2 型题)患者能从治疗性医患关系  
中感到受重视.真诚.理解.协调.信赖,患者在直  
接经验.平等协作.促进成长的治疗方式中实  
现态度和行为的转变。这种心理治疗方法称  
为

- A.精神分析
- B.自由联想法
- C.放松训练法
- D.合理情绪法
- E.患者中心疗法

答案：E

解析：以人为中心疗法是美国的心理治疗家  
罗杰斯所创建的一种心理疗法，是人本主义  
疗法的代表。人本主义疗法是现代心理治  
疗中的“第三种势力”。以人为中心疗法的  
特点:①以来访者为中心；②把心理治疗看  
成一个转变过程；③非指令性治疗的技巧。  
以人为中心疗法的主要技术:①真诚；②无  
条件积极关注；③同感的了解。

11.(A1/A2 型题)某单位女职工，在一家医院  
接受过心理评估与心理治疗，其所在单位领  
导获悉后想了解该患者的心理问题现状，遂  
向医院索要心理评估的结果，但被患者的心  
理医生拒绝，该心理医生所遵循的原则是

- A.耐心原则
- B.真诚原则
- C.客观原则
- D.回避原则
- E.保密原则

答案：E

解析：心理咨询基本原则有保密性原则、理解与支持原则、尊重原则、积极心态培养原则、时间限定的原则、来访者自愿的原则、感情限定的原则、重大决定延期的原则、守时原则。其中保密性原则是指咨询人员应保守来访者的内心秘密，妥善保管来访者的个人信息，来往信件，测试资料等材料。故本题心理医生所遵循的是保密原则，选 E。

12.(A1/A2 型题)一位来访者离开咨询室后，其他科室的医生问你来访者有什么问题，你当如何回答，问什么

- A.告诉他，因他是医生
- B.告诉他，因他关心他人
- C.告诉他，要求他别外传
- D.不告诉他，多管闲事
- E.不告诉他，遵守保密原则

答案：E

解析：此题暂无解析

13.(A1/A2 型题)属于行为治疗的基本技术的是

- A.释义
- B.满灌疗法
- C.释梦
- D.反复盘诘
- E.检查负性自动想法

答案：B

解析：此题暂无解析

14.(A1/A2 型题)下列不适于心理治疗的是

- A.神经症
- B.行为障碍
- C.心身疾病
- D.重症精神障碍的急性期
- E.某些慢性病患者的恢复期

答案：C

解析：此题暂无解析

15.(A1/A2 型题)创立以人为中心疗法的学者是

- A.马斯洛
- B.罗杰斯

C.艾宾浩斯

D.班杜拉

E.森田

答案：B

解析：此题暂无解析

16.(A1/A2 型题)能使咨询深入，并取得较好效果的心理咨方式

- A.门诊心理咨询
- B.信函心理咨询
- C.电话心理咨询
- D.专题心理咨询
- E.学校心理咨询

答案：A

解析：此题暂无解析

17.(A1/A2 型题)属于开放式提问的是

- A.“您昨天呕吐了几次”
- B.“您早餐后服过药了吗”
- C.“现在您头还晕吗”
- D.“您需要吃点什么吗”
- E.“您昨晚睡了几个小时”

答案：D

解析：此题暂无解析

18.(A1/A2 型题)医患沟通中的非言语沟通形式不包括

- A.目光接触
- B.引导话题
- C.面部表情
- D.人际距离
- E.身段姿态

答案：B

解析：非言语沟通在人际沟通中亦占有重要地位，因为人们相互沟通在许多情况下不可能全部以言语的方式来表达，但可以通过表情动作、目光接触、周围环境信息等手段表达自己的情感，从而达到沟通的目的。非言语沟通可分为动态与静态两种。动态主要包括面部表情、身段表情和人际距离等。静态包括衣着打扮、环境信息等。

19.(A1/A2 型题)通过言语表现的非言语交往方式是

- A.面部表情
- B.身段表情
- C.语调表情
- D.人际距离
- E.目光接触

答案：C

解析：此题暂无解析

20.(A1/A2 型题)医患关系中起主导作用的是

- A.患者
- B.医生
- C.患者所患疾病
- D.医生和患者
- E.医生和患者及所患疾病

答案：B

解析：此题暂无解析

21.(A1/A2 型题)医学道德修养是指医务人员在医学道德方面所进行的自我教育,自我锻炼和自我陶冶,以及在此基础上达到的

- A.医学道德境界
- B.医疗实践能力
- C.医疗技术水平
- D.医患沟通能力
- E.医疗道德意识

答案：A

解析：此题暂无解析

22.(A1/A2 型题)医学人道观的基本内容不包括

- A.尊重患者的平等医疗保健权
- B.消除或减轻影响患者健康的危险因素
- C.对患者尽量使用高新技术
- D.尊重患者的人格
- E.尊重患者的生命

答案：C

解析：医学人道观是指在医学活动中，特别是在医患关系中表现出来的同情和关心患者、尊重患者的人格与权利、维护患者利益、珍视人的生命价值和质量的伦理思想和权利观念。医学人道观、人权观的核心内容：尊重患者生命、尊重患者的人格、尊重患者平等的医疗权利、尊重患者的生命价值。对患者尽量使用高新技术，表面上看是对患者做到了

“负责”，然而这也走向了另一个极端“过度医疗”，这也是目前我国医疗市场中存在的一个“弊端”。要知道，这样的做法是违背医学人道观的，故答案选 C。

23.(A1/A2 型题)医疗机构从业人员理想的人格形象是

- A.以患者为中心
- B.救死扶伤
- C.人道行医
- D.大医精诚
- E.为人民健康服务

答案：D

解析：此题暂无解析

24.(A1/A2 型题)医师应认真执行医疗文书书写与管理制度，应（

- A.隐匿
- B.不伪造
- C.违规涂改
- D.销毁
- E.违规签署

答案：B

解析：此题暂无解析

25.(A1/A2 型题)女，50 岁。因子宫肌瘤行全子宫切除术。术中医生发现患者左侧卵巢有病变更应切除，在未征得患者及其家属同意的情况下，将左侧卵巢与子宫一并切除。术后患者恢复良好。该案例中，医生违背的临床诊疗伦理原则是

- A.知情同意原则
- B.患者至上原则
- C.守信原则
- D.最优化原则
- E.保密原则

答案：A

解析：医生未征得患者及其家属同意的情况下行左侧卵巢与子宫一并切除，违背了患者及家属的知情同意的原则。知情同意原则是指临床诊治过程中，医生在决定和实施诊疗措施前，都应向患者作详尽的说明，并取得患者的充分理解，并表示同意。对于一些特殊检查、特殊治疗和手术，以患者或其家属

(或监护人) 签字为据。故选 A。

26.(A1/A2 型题)患者女性, 51 岁。发热、头疼 1 天。医生要为她做腰穿检查, 有恐惧感。从伦理要求考虑, 临床医生应向患者做的主要工作是

- A. 要得到患者知情同意
- B. 告知做腰穿的必要性, 嘱患者配合
- C. 告知做腰穿时应注意的事项
- D. 因诊断需要, 先动员, 后检查
- E. 动员家属做患者思想工作

答案: A

解析: 此题暂无解析

27.(A1/A2 型题)医疗活动中, 取得病人知情同意的实质是

- A. 尊重患者人格尊严
- B. 尊重患者自主性
- C. 保护患者隐私
- D. 护患双方平等
- E. 尊重患者社会地位

答案: B

解析: 此题暂无解析

28.(A1/A2 型题)不包含在医学伦理学有利原则之内的是

- A. 努力使病人受益 (有助益)
- B. 努力预防和减少难以避免的伤害
- C. 对利害得失全面权衡
- D. 造成意外伤害时主动积极赔偿
- E. 关心病人的客观利益和主观利益

答案: D

解析: 此题暂无解析

29.(A1/A2 型题)下列哪项不属于医学伦理原则

- A. 不伤害原则
- B. 公正原则
- C. 有利原则
- D. 尊重原则
- E. 人道原则

答案: E

解析: 医学伦理的基本原则有: 尊重原则、不伤害原则、有利原则、公正原则。

30.(A1/A2 型题)临床诊治工作的基本道德原则是

- A. 及时、准确、有效、择优、自主
- B. 及时、准确、最优、保密、自主
- C. 及时、准确、择优、尊重、保密
- D. 及时、有效、最优、自主、保密
- E. 及时、有效、择优、尊重、保密

答案: A

解析: 诊治工作的基本道德原则是适用于医务人员对病人进行诊断和治疗的过程中的行为依据。它包括及时、准确、有效、择优和自主等五项原则。

31.(A1/A2 型题)某医院急诊医生接诊了一位遭遇车祸后昏迷的患者, 立即给予了心肺复苏、气管插管等抢救措施。此时的医患关系所属的类型是

- A. 共同参与型
- B. 主动-被动型
- C. 指导合作型
- D. 合作-监督型
- E. 主动权威型

答案: B

解析: 此题暂无解析

32.(A1/A2 型题)一位医生在为其患者进行角膜移植手术的前一夜, 发现备用的眼球已经失效, 于是到太平间看是否有尸体能供角膜移植之用, 恰巧有一尸体。考虑到征求死者家属意见很可能会遭到拒绝, 而且时间也紧迫, 于是便取出了死者的一侧眼球, 然后用义眼代替, 尸体火化前, 死者家属发现此事, 便把医生告上法庭。经调查, 医生完全是为了患者的利益, 并没有任何与治疗无关的动机, 对此案例的分析, 哪项是最恰当的

- A. 此案例说明我国器官来源的缺乏
- B. 此案例说明我国在器官捐赠上观念陈旧
- C. 此案例说明医生为了患者的利益而摘取眼球在伦理学上是可以得到辩护的
- D. 此案例说明首先征得家属的知情同意是一个最基本的伦理原则
- E. 此案例说明医院对尸体的管理有问题

答案: D

解析：知情同意原则，也是近年考试的一个热点，可能与我国现在比较紧张的医患关系有关。在此要提醒各位医务工作者，在实际工作中要谨记知情同意原则，有特殊检查或者治疗方案时，一定要有“签字”的环节，而非口头协议。

33.(A1/A2 型题)医患平等为基础的医患关系模式为

- A.主动——被动模式
- B.指导——合作模式
- C.共同参与模式
- D.朋友互助模式
- E.以上都不是

答案：C

解析：此题暂无解析

34.(A1/A2 型题)下列最能反映医患关系性质的表述是一种

- A.商品关系
- B.陌生人关系
- C.信托关系
- D.类似父子的关系
- E.主动-被动关系

答案：C

解析：法律上来说，医患关系是一种医疗契约关系；从伦理上来说，医患关系是一种信托关系。

35.(A1/A2 型题)有关医际关系与医患关系的表述，下列选项错误的是

- A.医际关系的恶化在一定程度上将对医患关系产生不良影响
- B.医患关系的恶化在一定程度上将对医际关系产生不良影响
- C.处理医际关系与医患关系依据的伦理原则是相同的
- D.医际关系与医患关系既互相独立又相互关联
- E.良好的医际关系有助于形成良好的医患关系

答案：C

解析：此题暂无解析

36.(A1/A2 型题)以下哪点不是病人的义务

- A.如实提供病情和有关信息
- B.避免将疾病传播他人
- C.尊重医师和他们的劳动
- D.不可以拒绝医学科研试验
- E.在医师指导下对治疗作出负责的决定并与医师合作执行

答案：D

解析：“不可以拒绝医学科研试验”，没有尊重病人自己的意愿。

37.(A1/A2 型题)医生采取“多头堵”“大包围”的方式开具大处方，违背的医学伦理要求是

- A.严守法规
- B.公正分配
- C.加强协作
- D.合理配伍
- E.对症下药

答案：D

解析：药物治疗对医生的道德要求：①对症下药，剂量安全；②合理配伍，细致观察；③节约费用，公正分配；④严守法规，接受监督。

38.(A1/A2 型题)国家对传染病菌种、毒种的采集，保藏，运输和使用实行的管理方式是

- A.分类管理
- B.行业管理
- C.专项管理
- D.集中管理
- E.分层管理

答案：A

解析：《传染病防治法》第二十六条：国家建立传染病菌种、毒种库。对传染病菌种、毒种和传染病检测样本的采集、保藏、携带、运输和使用实行分类管理，建立健全严格的管理制度。

39.(A1/A2 型题)《传染病防治法》规定，传染病暴发、流行时，当地政府应当

- A.医学观察
- B.留验
- C.隔离
- D.访视

E.就地诊验

答案: C

解析: 第三十九条医疗机构发现甲类传染病时, 应当及时采取下列措施: (一) 对病人、病原携带者, 予以隔离治疗, 隔离期限根据医学检查结果确定; (二) 对疑似病人, 确诊前在指定场所单独隔离治疗; (三) 对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者, 在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。

40.(A1/A2 型题) 患儿王某因发热 3 日到县医院就诊, 接诊医师林某检查后拟诊为流行性出血热。因县医院不具备隔离治疗条件, 林某遂嘱患儿的家长带王某去市传染病医院就诊。按照《传染病防治法》的规定, 林某应当

- A. 请上级医师会诊, 确诊后再转诊
- B. 请上级医师会诊, 确诊后隔离治疗
- C. 向医院领导报告, 确诊后对王某就地隔离
- D. 向当地疾病控制机构报告, 并复印病历资料转诊
- E. 向当地疾病控制机构报告, 由疾病控制机构转诊

答案: D

解析: 流行性出血热属于乙类传染病。《传染病防治法》规定任何单位和个人发现传染病患者或者疑似传染病患者时, 应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。医疗机构对传染病应当实行传染病预检、分诊制度; 对传染病患者、疑似传染病患者, 应当引导至相对隔离的分诊点进行初诊。医疗机构不具备相应救治能力的, 应当将患者及其病历记录复印件一并转至具备相应救治能力的医疗机构。

41.(A1/A2 型题) 医疗机构发现发生或者可能发生传染病暴发流行时, 应当

- A. 在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- B. 在 6 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- C. 在 12 小时内向所在地县级人民政府卫生

行政主管部门报告

D. 在 24 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告

E. 在 48 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告

答案: A

解析: 此题暂无解析

42.(A1/A2 型题) 关于医疗卫生机构对医疗废物的管理不正确的是

- A. 及时收集本单位的医疗废物
- B. 建立医疗废物暂时贮存设施
- C. 使用专用运送工具
- D. 及时交由医疗废物集中处置单位处置
- E. 医疗废物不可焚烧和掩埋

答案: E

解析: 自行处置医疗废物的, 应当符合下列基本要求: ①使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物, 应当消毒并作毁形处理; ②能够焚烧的, 应当及时焚烧; ③不能焚烧的, 消毒后集中填埋。故 E 是错误的。

43.(A1/A2 型题) 由公民自费并且自愿受种的其他疫苗

- A. 第一类疫苗
- B. 第二类疫苗
- C. 第三类疫苗
- D. 第四类疫苗
- E. 第五类疫苗

答案: B

解析: 此题暂无解析

44.(A1/A2 型题) 根据《疫苗流通与预防接种管理条例》, 该事件所出现的情况属于

- A. 药品不良反应
- B. 预防接种异常反应
- C. 医疗事故
- D. 突发公共卫生事件
- E. 群体性心因性反应

答案: E

解析: 此题暂无解析

45.(A1/A2 型题) 婚前医学检查, 对确诊患有严重遗传病不宜生育者正确的处理方法是

- A.不能结婚
- B.可以结婚,但需要采取长效避孕措施或者实施结扎手术
- C.可以结婚,但需提交书面声明,保证不生育
- D.可以结婚,但必须符合晚婚规定
- E.《婚姻法》未明确规定禁止结婚的,可以结婚

答案: B

解析: 此题暂无解析

46.(A1/A2 型题)《母婴保健法》规定,从事规定的婚前医学检查.施行结扎手术和终止妊娠手术的人员以及从事家庭接生的人员,必须经过哪个部门考核,并取得相应的合格证书

- A.国家卫生行政部门
- B.省级卫生行政部门
- C.市级以上卫生行政部门
- D.县级以上卫生行政部门
- E.乡镇卫生院

答案: D

解析:《母婴保健法》规定,从事规定的遗传病诊断.产前诊断的人员,必须经过省.自治区.直辖市人民政府卫生行政部门的考核,并取得相应的合格证书。从事规定的婚前医学检查.施行结扎手术和终止妊娠手术的人员以及从事家庭接生的人员,必须经过县级以上地方人民政府卫生行政部门的考核,并取得相应的合格证书。

47.(A1/A2 型题)按照《母婴保健法》规定,婚前医学检查的疾病不包括

- A.梅毒
- B.淋病
- C.肺结核
- D.麻风病
- E.艾滋病

答案: C

解析:按照《母婴保健法》规定,属于婚前医学检查的疾病有严重遗传性疾病.指定传染病.有关精神病。①指定传染病,是指《中华人民共和国传染病防治法》中规定的艾滋病.淋病.梅毒.麻风病以及医学上认为影响结

婚和生育的其他传染病。②严重遗传性疾病,是指由于遗传因素先天形成,患者全部或者部分丧失自主生活能力,后代再现风险高,医学上认为不宜生育的遗传性疾病。③有关精神病,是指精神分裂症.躁狂抑郁型精神病以及其他重型精神病。

48.(A1/A2 型题)医师经注册后,可以在医疗.预防.保健机构中按照注册的( )执业,从事相应的医疗.预防.保健业务

- A.业务需要
- B.单位名称
- C.执业类别和执业范围
- D.所学专业
- E.医疗性质

答案: C

解析: 此题暂无解析

49.(A1/A2 型题)具有中等专业学校医学专业学历,在医疗.预防.保健机构中工作满几年可以参加执业医师资格考试

- A.1 年
- B.2 年
- C.3 年
- D.4 年
- E.5 年

答案: E

解析: 此题暂无解析

50.(A1/A2 型题)对医师的业务水平.工作成绩和职业道德状况,依法享有定期考核权的单位是

- A.县级以上人民政府
- B.县级以上人民政府卫生行政部门
- C.医师所在地的医学会或者医师协会
- D.医师所工作的医疗.预防.保健机构
- E.受县级以上人民政府卫生行政部门委托的机构或者组织

答案: E

解析:《执业医师法》第三十一条:受县级以上人民政府卫生行政部门委托的机构或者组织应当按照医师执业标准,对医师的业务水平.工作成绩和职业道德状况进行定期考核。对医师的考核结果,考核机构应当报告

准予注册的卫生行政部门备案。

51.(A1/A2 型题)医师未取得处方权开具药品处方的,由县级以上卫生行政部门责令暂停执业活动的时间为

- A.六个月
- B.六个月以上一年以下
- C.一年
- D.三个月以上六个月以下
- E.三个月

答案: B

解析: 医师出现下列情形之一的,按照《执业医师法》第三十七条的规定,由县级以上卫生行政部门给予警告或者责令暂停六个月以上一年以下执业活动;情节严重的,吊销其执业证书:①未取得处方权或者被取消处方权后开具药品处方的;②未按照本办法规定开具药品处方的;③违反本办法其他规定的。

52.(A1/A2 型题)经国家执业医师资格考试,取得执业医师资格的,可以申请注册,受理机构是

- A.县级以上人民政府卫生行政部门
- B.县级以上人民政府
- C.省(自治区)级以上人民政府卫生行政部门
- D.国务院卫生行政部门
- E.县级以上卫生防疫机构

答案: A

解析: 取得医师资格的,可以向所在地县级以上人民政府卫生行政部门申请注册

53.(A1/A2 型题)卫生行政部门决定不予医师执业注册的,申请人有异议时

- A.只能申请复议
- B.只能向人民法院起诉
- C.可随时申请复议或向人民法院起诉
- D.可自收到通知之日起 10 日内申请复议或向人民法院起诉
- E.可自收到不予注册通知之日起 15 日内,申请复议或向人民法院起诉

答案: E

解析: 受理申请的卫生行政部门对不符合条

件不予注册的,应当自收到申请之日起三十日内书面通知申请人,并说明理由。申请人有异议的,可以自收到通知之日起十五日内,依法申请复议或者向人民法院提起诉讼。

54.(A1/A2 型题)2004 年,某地农村产妇在无证个体医生王某开办的诊所分娩。由于第三产程子宫收缩无力,产妇的胎盘迟迟未娩出。此时,王某在一不消毒,二不戴消毒手套的情况下,将手伸进子宫,误认为还有一胎儿未娩出而向外猛拉子宫,当场造成产妇大出血死亡。根据《执业医师法》的规定,应依照该法追究王某的法律责任,其法律责任不包括

- A.责令改正
- B.予以取缔
- C.没收违法所得及其药品、器械
- D.赔偿责任
- E.刑事责任

答案: A

解析: 根据《中华人民共和国执业医师法》第三十九条:未经批准擅自开办医疗机构行医或者非医师行医的,由县级以上人民政府卫生行政部门予以取缔,没收其违法所得及其药品、器械,并处十万元以下的罚款;对医师吊销其执业证书;给患者造成损害的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。王某属于非法行医,并造成了严重后果,应承担刑事责任并带民事责任。

55.(A1/A2 型题)张某于 1999 年 7 月从某医学院专科毕业,张某可以

- A.在医疗、预防、保健机构中试用期满一年,参加执业医师资格考试
- B.在医疗、预防、保健机构中试用期满一年,参加执业助理医师资格考试
- C.在医疗、预防、保健机构中试用期满二年,参加执业助理医师资格
- D.取得执业助理医师执业证书后,在医疗、预防、保健工作满一年,参加执业医师资格考试
- E.取得执业助理医师执业证书后,在医疗、预防等机构工作满半年,参加执业医师资格考试

答案：B

解析：依据《中华人民共和国执业医师法》第九条规定。具有下列条件之一的，可以参加执业医师资格考试：（一）具有高等学校医学专业本科以上学历，在执业医师指导下，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的；（二）取得执业助理医师执业证书后，具有高等学校医学专科学历，在医疗、预防、保健机构中工作满二年；具有中等专业学校医学专业学历，在医疗、预防、保健机构中工作满五年的。第十条规定：具有高等学校医学专科学历或者中等专业学校医学专业学历，在执业医师指导下，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的，可以参加执业助理医师资格考试。

56.(A1/A2 型题)造成医疗责任事故，情节严重的

- A. 责令暂停六个月以上一年以下执业活动
- B. 吊销其执业证书
- C. 追究刑事责任
- D. 罚款
- E. 承担赔偿责任

答案：B

解析：医师在执业活动中，违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停六个月以上一年以下执业活动；情节严重的，吊销其执业证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）违反卫生行政规章制度或者技术操作规范，造成严重后果的；（二）由于不负责任延误急危患者的抢救和诊治，造成严重后果的；（三）造成医疗责任事故的；（四）未经亲自诊查、调查，签署诊断、治疗、流行病学等证明文件或者有关出生、死亡等证明文件的；（五）隐匿、伪造或者擅自销毁医学文书及有关资料的；（六）使用未经批准使用的药品、消毒剂和医疗器械的；（七）不按照规定使用麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和放射性药品的；（八）未经患者或者其家属同意，对患者进行实验性临床医疗的；（九）泄露患者隐私，造成严重后果的；（十）利用职务之便，索取、非法收受患者财物或者牟取其他不正当利益的；（十一）发生自然

灾害、传染病流行、突发重大伤亡事故以及其他严重威胁人民生命健康的紧急情况时，不服从卫生行政部门调遣的；（十二）发生医疗事故或者发现传染病疫情，患者涉嫌伤害事件或者非正常死亡，不按照规定报告的。

（十三）使用假学历骗取考试得来的医师证的。

57.(A1/A2 型题)医师注册后受吊销医师执业证书行政处罚的

- A. 从事医师执业活动
- B. 中止医师执业活动
- C. 申请执业医师注册
- D. 不予医师执业注册
- E. 注销执业医师注册

答案：E

解析：此题暂无解析

58.(A1/A2 型题)根据《侵权责任法》，什么时候必须要取得患方的书面同意才能够实施医疗行为

- A. 任何诊断活动
- B. 任何治疗活动
- C. 实施手术
- D. 特殊检查、特殊治疗时
- E. 仅在实施手术时

答案：C

解析：此题暂无解析

59.(A1/A2 型题)依照《精神卫生法》对患者连某实施的约束行为的性质属于

- A. 治疗性措施
- B. 惩罚性措施
- C. 保护性医疗措施
- D. 诊断性措施
- E. 警告性措施

答案：C

解析：《精神卫生法》第四十条：精神障碍患者在医疗机构内发生或者将要发生伤害自身、危害他人安全、扰乱医疗秩序的行为，医疗机构及其医务人员在没有其他可替代措施的情况下，可以实施约束、隔离等保护性医疗措施。实施保护性医疗措施应当遵循诊断标准和治疗规范，并在实施后告知患者的监

护人。禁止利用约束、隔离等保护性医疗措施惩罚精神障碍患者。

60.(A1/A2 型题)下列哪一行为违反了医疗机构执业规则

- A.某卫生院将执业许可证、诊疗时间、收费标准公布于卫生院大厅
- B.某妇幼保健院按照其核准登记的诊疗科目开展诊疗活动
- C.为加强医务人员的医德教育及医疗水平,某医院每周定期开展交流活动
- D.某医学院本科五年级学生张某,在某三甲甲等医院实习 8 个月后,因该同学在医院表现非常出色,医院决定让其在实习后期以张某的名义单独进行部分简单的诊疗活动
- E.某医疗机构要求其工作人员上岗时佩戴有本人姓名、职务的标牌

答案: D

解析: 此题暂无解析

61.(A1/A2 型题)以下关于转诊的理解不正确的是

- A.医疗机构可根据病人的病情决定是否需转诊,病人可自主决定是否需转诊
- B.如患者坚持转诊,而医疗机构认为不宜,患者应签署转诊申请书
- C.医疗条件不足,医疗机构必须积极履行转诊义务
- D.如医疗机构对危重患者缺乏治疗条件,不必作任何处理而应立即转诊
- E.患者要求转诊,不需要医疗机构负责人批准

答案: D

解析: 参见《医疗机构管理条例》第三十一条:医疗机构对危重病人应当立即抢救。对限于设备或者技术条件不能诊治的病人,应当及时转诊。

62.(A1/A2 型题)医疗机构对有能力诊治的危重患者,应当立即采取的处理措施是

- A.请示卫生行政部门
- B.办理住院手续
- C.请示医院领导
- D.抢救

E.转诊

答案: D

解析:《医疗机构管理条例》第三十一条规定,医疗机构对危重病人应当立即抢救。对限于设备或者技术条件不能诊治的病人,应当及时转诊。

63.(A1/A2 型题)某市一拾荒人员病危,入院后发现属三无患者(无钱,无身份证明,无陪伴),医疗机构应

- A.先采取必要措施维持生命,待交费后进行转诊治疗
- B.先采取必要措施维持生命,报告当地公安、民政部门决定解决办法
- C.立即抢救
- D.立即抢救,条件许可时及时转诊
- E.接诊医务人员在报请院领导批准后转诊

答案: D

解析: 医疗机构对危重病人应当立即抢救。

64.(A1/A2 型题)医院未按规定履行报告职责,若导致严重后果,由卫生行政部门给予警告,并对该机构的行政负责人给予

- A.行政处分
- B.行政罚款
- C.注销注册
- D.吊销执照
- E.以上都不是

答案: A

解析: 医疗预防保健机构未依照《执业医师法》规定履行报告职责,导致严重后果的,由县级以上人民政府卫生主管部门给予警告;并对该机构的行政负责人依法给予行政处分。

65.(A1/A2 型题)因抢救急危患者未能及时书写病历的有关医务人员应当在抢救结束后几小时内据实补记。

- A.2
- B.4
- C.6
- D.8
- E.12

答案: C

解析：此题暂无解析

66.(A1/A2 型题)确定医疗事故具体赔偿数额时，应考虑法定因素之一是

- A.患者家庭的经济收入状况
- B.医疗机构的支付能力
- C.医疗事故等级
- D.医患双方的意见
- E.卫生行政部门的意见

答案：C

解析：《医疗事故处理条例》第四十九条规定：医疗事故赔偿，应当考虑下列因素，确定具体赔偿数额：①医疗事故等级；②医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度；③医疗事故损害后果与患者原有疾病状况之间的关系。不属于医疗事故的，医疗机构不承担赔偿责任。

67.(A1/A2 型题)根据《医疗事故处理条例》规定，有权对医疗事故争议或者重大医疗过失行为作出行政判定的单位是

- A.司法鉴定机构
- B.县级以上地方卫生行政部门
- C.医学会
- D.医师协会
- E.医院协会

答案：B

解析：发生医疗事故争议，当事人申请卫生行政部门处理的，由医疗机构所在地的县级人民政府卫生行政部门受理。医疗机构所在地是直辖市的，由医疗机构所在地的区、县人民政府卫生行政部门受理。

68.(A1/A2 型题)因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后几小时内据实补记，并加以注明

- A.2 小时
- B.3 小时
- C.5 小时
- D.6 小时
- E.12 小时

答案：D

解析：因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后 6 小时

内据实补记，并加以注明。

69.(A1/A2 型题)青年李某，右下腹疼痛难忍，到医院就诊。经医师检查、检验，当即诊断为急性阑尾炎，遂对其施行阑尾切除术。手术情况正常，但拆线时发现伤口愈合欠佳，有淡黄色液体渗出。手术医师告知，此系缝合切口的羊肠线不为李某的组织吸收所致，在临床中少见。经过近 1 个月的继续治疗，李某获得痊愈。根据《医疗事故处理条例》规定，李某被拖延近 1 个月后才得以痊愈这一客观后果，应当属于

- A.在现有的医学科技条件下发生无法预料或不能防范
- B.三级医疗事故
- C.四级医疗事故
- D.因患者体质特殊而发生的医疗意外
- E.因不可抗力而造成的不良后果

答案：D

解析：不属于医疗事故的 6 种情况：①因患者病情异常或特殊体质而发生医疗意外的；②紧急情况下为抢救患者生命而实施的医疗措施造成不良后果的；③在现有的医学科技条件下发生无法预料或不能防范的不良后果的；④无过错输血感染造成不良后果的；⑤因患者原因延误诊疗造成不良后果的；⑥不可抗拒因素造成不良后果的。本题属于第一种，患者因特殊体质，不能吸收而发生愈合欠佳。

70.(A1/A2 型题)下列关于乡村医生执业时说法正确的是

- A.及时转诊超出一般医疗服务范围或者限于医疗条件和技术水平不能诊治的患者
- B.重复使用一次性医疗器械和卫生材料
- C.经批准后进行实验性临床医疗活动
- D.出具超出其执业范围的医学证明
- E.非医学需要的胎儿性别检查

答案：A

解析：根据《医疗废物管理条例》第十七条，医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区。

食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

71.(A1/A2 型题)下列关于药品剂量与数量的说法，错误的是

- A.药品剂量与数量用阿拉伯数字书写
- B.中药饮片以袋为单位
- C.片剂以片为单位
- D.溶液剂以支、瓶为单位
- E.软膏及乳膏剂以支、盒为单位

答案：B

解析：此题暂无解析

72.(A1/A2 型题)普通处方一般不得超过（）日用量，急诊处方不得超过（）日用量

- A.1, 2
- B.2, 3
- C.3, 5
- D.3, 7
- E.7, 3

答案：E

解析：此题暂无解析

73.(A1/A2 型题)对于盐酸哌替啶处方为（）常用量，仅限于（）内使用

- A.一次，医院
- B.一天，医院
- C.一次，医疗机构
- D.一天，医疗机构
- E.二次，医疗机构

答案：C

解析：此题暂无解析

74.(A1/A2 型题)医生开具处方和药师调剂处方应当遵循的原则是

- A.科学、合理、经济
- B.安全、科学、合理
- C.安全、有效、经济
- D.科学、有效、经济
- E.科学、合理、有效

答案：C

解析：医师开具处方和药师调剂处方应当遵循安全、有效、经济的原则。处方药应当凭医师处方销售、调剂和使用。

75.(A1/A2 型题)普通处方的保存期限为

- A.1 年
- B.2 年
- C.3 年
- D.4 年
- E.5 年

答案：A

解析：此题暂无解析

76.(A1/A2 型题)负责对辖区内村卫生室抗菌药物使用量、使用率等情况进行排名并予以公示的机构是

- A.省级卫生行政部门
- B.市级卫生行政部门
- C.县级卫生行政部门
- D.县医院
- E.乡镇卫生院

答案：E

解析：受县级卫生行政部门委托，乡镇卫生院负责对辖区内村卫生室抗菌药物使用量、使用率等情况进行排名并予以公示，并向县级卫生行政部门报告。

77.(A1/A2 型题)医疗机构对医生提出警告并限制其特殊使用级抗菌药物处方权的情形是

- A.开具抗菌药物处方牟取不正当利益
- B.发生抗菌药物不良事件
- C.出现开具抗菌药物超常处方 3 次以上且无正当理由
- D.因紧急情况越级使用抗菌药物
- E.使用的抗菌药物明显超出规定用量

答案：C

解析：《抗菌药物临床应用管理办法》第四十五条：医疗机构应当对出现抗菌药物超常处方 3 次以上且无正当理由的医师提出警告，限制其特殊使用级和限制使用级抗菌药物处方权。第四十六条：医师出现下列情形之一的，医疗机构应当取消其处方权：①抗菌药物考核不合格的；②限制处方权后，仍出

现超常处方且无正当理由的；③未按照规定开具抗菌药物处方，造成严重后果的；④未按照规定使用抗菌药物，造成严重后果的；⑤开具抗菌药物处方牟取不正当利益的。

78.(A1/A2 型题)医疗机构必须配备药学技术人员，配备的这类人员应是依法经过

- A.学历认定
- B.资历认定
- C.资格认定
- D.资质认定
- E.执业认定

答案：C

解析：此题暂无解析

79.(A1/A2 型题)下列属于假药的是

- A.改变剂型或改变给药途径的药品
- B.擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫味剂及辅料的
- C.超过有效期的
- D.以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的
- E.更改生产批号的

答案：D

解析：此题暂无解析

80.(A1/A2 型题)F 药厂销售代表和某医院多名医师约定，医师在开处方时使用 F 药厂生产的药品，并按使用量的多少给予提成。事情曝光以后，按《药品管理法》的规定，对 F 药厂可以作出行政处罚的部门是

- A.药品监督管理部门
- B.工商行政管理部门
- C.税务部门
- D.医疗保险部门
- E.卫生行政部门

答案：B

解析：禁止药品的生产企业、经营企业和医疗机构在药品购销中帐外暗中给予、收受回扣或者其他利益。禁止药品的生产企业、经营企业或者其代理人以任何名义给予使用其药品的医疗机构的负责人、药品采购人员、医师等有关人员以财物或者其他利益。禁止医疗机构的负责人、药品采购人员、医师等

有关人员以任何名义收受药品的生产企业、经营企业或者其代理人给予的财物或者其他利益。由药品监督管理部门作出行政处罚。故本题选 A。

81.(A1/A2 型题)假设 2018 年 3 月 2 日作出鉴定结论，此时国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的药品监督管理部门最迟在何时依法作出行政处理决定

- A.2018 年 3 月 5 日
- B.2018 年 3 月 7 日
- C.2018 年 3 月 9 日
- D.2018 年 3 月 12 日
- E.2018 年 3 月 17 日

答案：E

解析：此题暂无解析

82.(A1/A2 型题)下列关于慢性非传染性疾病的描述错误的是

- A.常见病、多发病
- B.病程长，发病隐匿
- C.一旦发病多数不能自愈
- D.患病后都能够治愈
- E.病因复杂

答案：D

解析：慢性非传染性疾病简称“慢性病”，是一起起病隐匿，病程长且病情迁延不愈，病因复杂，且有些尚未被确认的疾病的概括性总称。

83.(A1/A2 型题)以下内容中不属于慢性非传染性疾病的是

- A.高血压
- B.糖尿病
- C.缺血性脑卒中
- D.消化性溃疡
- E.恶性肿瘤

答案：D

解析：慢性非传染性疾病主要包括以生活方式、环境危险因素为主引起的肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病、慢性阻塞性肺疾患、脑卒中等为代表的一组疾病。

84.(A1/A2 型题)下列各类疾病中，主要应采

取第三级预防的是

- A. 职业病
- B. 冠心病
- C. 糖尿病
- D. 高血压
- E. 病因不明, 难以觉察预料的疾病

答案: E

解析: 此题暂无解析

85.(A1/A2 型题)对吸烟人群进行肺癌筛查属于

- A. 一级预防
- B. 二级预防
- C. 三级预防
- D. 一级、二级预防均可
- E. 二级、三级预防均可

答案: B

解析: 二级预防指的是早期发现、早期诊断和早期治疗, 防患于开端。常用的二级预防方法有筛检普查等。

86.(A1/A2 型题)属于第二级预防措施的是

- A. 遗传咨询
- B. 疾病筛检
- C. 病后康复
- D. 健康促进
- E. 疫苗接种

答案: B

解析: 第二级预防又称“三早”预防或者临床前期预防。是在疾病的临床前期做好早期发现、早期诊断、早期治疗的“三早”预防工作, 为防止或者减缓疾病发展而采取的措施。早期发现疾病可通过普查、筛检、病例发现、定期健康检查、高危人群重点项目检查、自我检查等方法实现。筛检是早期发现疾病的主要方法。

87.(A1/A2 型题)现阶段, 正在实施的国家基本公共卫生服务项目有

- A. 10 项
- B. 12 项
- C. 15 项
- D. 17 项
- E. 20 项

答案: B

解析: 现阶段, 正在实施的国家基本公共卫生服务项目有 12 项, 包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病(严重精神障碍)患者管理、结核病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、中医药健康管理、卫生监督协管。不包括 1 型糖尿病健康管理。

88.(A1/A2 型题)以下哪一项属于正在实施的重大公共卫生服务项目

- A. 农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查
- B. 高血压患者健康管理
- C. 中医药健康管理
- D. 2 型糖尿病患者健康管理
- E. 卫生监督协管

答案: A

解析: 目前, 重大公共卫生服务项目包括: 结核病、艾滋病等重大疾病防控、国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、贫困白内障患者复明、农村改水改厕、消除燃煤型氟中毒、15 岁以下人群补种乙肝疫苗、农村妇女孕前和孕早期增补叶酸预防出生缺陷、农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查等项目。继续组织开展计划生育技术服务, 主要包括避孕节育、优生优育科普宣传、避孕方法咨询指导、发放避孕药具、实施避孕节育和恢复生育力手术及随访服务、开展计划生育手术并发症及避孕药具不良反应诊治等。

89.(A1/A2 型题)“定期体检, 见微知著”这句话的含义是

- A. 定期体检便于早期发现疾病
- B. 定期体检便于逆转疾病
- C. 定期体检便于治疗疾病
- D. 定期体检便于第三级预防
- E. 定期体检便于防止传染

答案: A

解析: 定期体检, 见微知著的核心含义就是“早发现”, 从细微的表现中发现重大疾病的, 以便于及时治疗, 及时用药。

90.(A1/A2 型题)妇女产后心理辅导的目的是

- A.预防感冒
- B.调节夫妻关系
- C.防治产后病
- D.促进排乳
- E.预防产后抑郁症

答案: E

解析: 产后心理辅导:预防产后抑郁症, 主要表现为产妇在产褥早期出现的以哭泣、忧郁、烦闷为主的情绪障碍, 此时应进行心理疏导, 并加服补血养肝疏肝理气中药。

91.(A1/A2 型题)预防产后抑郁症, 主要表现为产妇在产褥早期出现的以 (

- A.抱怨、失落、绝望
- B.抑郁、愤怒、暴躁
- C.哭泣、忧郁、烦闷
- D.低落、生气、郁郁寡欢
- E.自怨自艾、惊惧、失落

答案: C

解析: 预防产后抑郁症, 主要表现为产妇在产褥早期出现的以哭泣、忧郁、烦闷为主的情绪障碍, 此时应进行心理疏导, 并加服补血养肝疏肝理气中药。

92.(A1/A2 型题)统计工作的步骤包括, 除了

- A.搜集资料
- B.统计设计
- C.分析资料
- D.整理资料
- E.得出结论

答案: E

解析: 此题暂无解析

93.(A1/A2 型题)为了保证研究结果能够回答研究目的中提出的问题, 使用的人、财、物、时间较少, 结果可靠, 应该作好的首要工作是

- A.资料搜集
- B.科研设计
- C.资料整理
- D.资料分析
- E.结果的表达

答案: B

解析: 此题暂无解析

94.(A1/A2 型题)统计表的主语通常放在统计表

- A.下面
- B.上面
- C.左侧
- D.右侧
- E.中间

答案: C

解析: 统计表的主语是指横标目, 通常放在统计表的左侧, 所以答案选 C。

95.(A1/A2 型题)一组变量值, 其大小分别为 16, 10, 12, 9, 8, 11, 问平均数是

- A.23
- B.11
- C.12
- D.10.5
- E.10.2

答案: D

解析: 这题计算方法是这样的:先把这组数据按从小到大顺序排列 8910111216, 然后取中间的两个数 (10+11) =21, 最后除以 2=10.5 (最终答案)。

96.(A1/A2 型题)老年人口增加可使

- A.出生率迅速下降
- B.死亡率增加
- C.婴儿死亡率下降
- D.生育率下降
- E.总和生育率下降

答案: B

解析: 此题暂无解析

97.(A1/A2 型题)流行病学研究中所指的群体是

- A.只限于一个家庭
- B.只限于非患者
- C.一定范围内的人群
- D.只限于全人类
- E.只限于病人

答案: C

解析: 此题暂无解析

98.(A1/A2 型题)流行病学研究方法使用最多的是

- A.观察法
- B.实验法
- C.干预法
- D.理论法
- E.方法研究

答案: A

解析: 流行病学是面向人群开展研究, 所以研究者不能或不能全部掌握或控制所研究对象发生的条件, 因此, 观察法包括描述性研究和分析性研究就是很重要的方法

99.(A1/A2 型题)对一个地区全体居民进行调查, 可计算当地的

- A.高血压患病率
- B.高血压发病率
- C.高血压家庭续发率
- D.高血压病死率
- E.高血压罹患率

答案: A

解析: 罹患率: 是测量新发病例频率的指标, 它常用来衡量人群中在较短时间内新发病例的频率; 发病率: 是表示特定人群在一定时间内 (一般为一年) 发生某病新病例的频率; 感染率: 是指在检查人群中某病现在感染人数所占的比例; 患病率: 是指某特定时间内总人口中某病新旧病例所占的比值, 对于慢性心血管疾病常计算患病率。普查常获得患病率指标。

100.(A1/A2 型题)某地为了了解某城市儿童龋齿的流行情况拟进行一次普查, 要说明调查结果可用

- A.感染率
- B.罹患率
- C.患病率
- D.累积发病率
- E.发病率

答案: C

解析: 普查是指为了了解某病的患病率或健康状况, 于一定时间内对一定范围的人群中每一成员所作的调查或检查。普查的目的: 早期发现病人. 了解疾病分布. 了解人群健康

水平. 建立某生理指标的正常值。通常普查可获得患病率的指标。

101.(A1/A2 型题)某地区在一周内进行了高血压普查, 可计算当地高血压的

- A.罹患率
- B.发病率
- C.患病率
- D.病死率
- E.续发率

答案: C

解析: 普查是为了了解某病的患病率或健康状况, 于一定时间内对一定范围的人群中每一个成员所做的调查, 因此对高血压的普查, 可计算当地高血压的患病率。罹患率指标常适用于局部地区疾病的暴发、或食物中毒、传染病暴发等情况; 发病率表示一定时期内、一定人群中某病新病例出现的频率, 观察的时间单位通常是以年为单位; 续发率指在某些传染病最短潜伏期到最长潜伏期之间, 易感接触者中发病的人数占所有易感接触者总数的百分率; 病死率通常用于急性传染病, 较少用于慢性病

102.(A1/A2 型题)以下哪一项不是与疾病相关的现象监测

- A.药店非处方药
- B.医疗相关用品销售量
- C.门诊就医情况
- D.不良饮食习惯
- E.学生或职工的缺勤率

答案: D

解析: 与疾病相关的现象监测包括门诊就医情况. 药店非处方药. 医疗相关用品销售量. 学生或职工的缺勤率, 可起到早期探查预警的作用。

103.(A1/A2 型题)小王最近被任命为部门经理, 工作内容一下子增加了许多, 工作压力也越来越大, 为了缓解由此带来的焦虑, 小王到某健身俱乐部办了一张会员卡, 她每周在工作之余定期到该健身俱乐部练习瑜伽, 以缓解身心的紧张。小王的行为属于

- A.日常健康行为

- B.避开有害环境行为  
C.戒除不良嗜好行为  
D.预警行为  
E.保健行为促进健康行为包括:

答案: B

解析: 1.避开有害健康行为指避免暴露于自然环境和社会环境中有害健康的危险因素,如离开污染环境、积极应对各种紧张生活事件,案例中小王的行为就属于后者。2.老王的戒烟、戒酒行为在促进健康行为中属于自觉抵制、戒除不良嗜好的行为。3.王某为女儿建立保健档案,是有效、合理利用卫生资源,维护自身健康的行为,这在健康促进行为中属于保健行为。

104.(A1/A2 型题)健康的四大基石不包括

- A.合理膳食  
B.适量运动  
C.戒烟和限制饮酒  
D.心理平衡  
E.适宜环境

答案: E

解析: 此题暂无解析

105.(A1/A2 型题)以下哪一项不属于分类危害健康行为

- A.致病行为模式  
B.不良生活方式与习惯  
C.不良疾病行为  
D.危害环境行为  
E.违反社会法律、道德的危害健康行为

答案: D

解析: 分类危害健康行为可以分为以下四类:

①不良生活方式与习惯:它是一组习以为常的、对健康有害的行为习惯,包括能导致各种成年期慢性退行性病变的生活方式,如吸烟、酗酒、缺乏运动锻炼、高盐高脂饮食、不良进食习惯等。不良的生活方式与肥胖、心血管系统疾病、早衰、癌症等的发生关系密切。②致病行为模式:是导致特异性疾病发生的行为模式,较多见的是 A 型行为模式和 C 型行为模式。③不良疾病行为:疾病行为指个体从感知到自身有病到疾病康复全过程所表现出来的一系列行为。不良疾病行为可能发生在

上述过程的任何阶段,常见的行为表现形式有:疑病、恐惧、讳疾忌医、不及时就诊、不遵从医嘱、迷信、乃至自暴自弃等。④违反社会法律、道德的危害健康行为:我国有关法律、条例、具有法律效力的文件等对部分行为进行了规范,如禁止吸毒贩毒、性乱,公共场所禁止吸烟等。

106.(A1/A2 型题)体质指数 (BMI) 的计算公式是

- A.身高 (m) /体重的平方 (kg<sup>2</sup>)  
B.体重 (kg) /身高的平方 (m<sup>2</sup>)  
C.体重 (kg) /身高 (m)  
D.体重的平方 (kg<sup>2</sup>) /身高 (m)  
E.体重 (kg) /身高的平方 (cm<sup>2</sup>)

答案: B

解析: 此题暂无解析

107.(A1/A2 型题)以下关于老年人健康教育内容说法错误的是

- A.指导老年人科学规律的生活起居,良好的生活习惯;纠正不良的行为和生活方式,严禁吸烟、饮酒  
B.鼓励老人多参加社会活动、参加力所能及的活动;与子女相互适应、相互支持;合理安排作息时间;保持乐观的情绪,加强健脑锻炼,避免孤独,减少焦虑情绪  
C.提倡科学合理的平衡膳食,以富含蛋白质、低脂肪、低胆固醇、少盐、少糖、富含维生素和微量元素的食物为主;少吃多餐,定时定量;正确选择保健品  
D.心脑血管疾病、糖尿病、白内障、青光眼、腰腿痛、关节炎等疾病的防治知识和自我护理方法  
E.根据自身特点选择适合自己的体育活动项目,运动不过量

答案: A

解析: 老年人健康教育内容包括:①行为指导,指导老年人科学规律的生活起居,良好的生活习惯;纠正不良的行为和生活方式,限制吸烟、饮酒。②心理卫生教育,鼓励老人多参加社会活动、参加力所能及的活动;与子女相互适应、相互支持;合理安排作息时间;保持乐观的情绪,加强健脑锻炼,避免孤独,

减少焦虑情绪。③生活卫生,提倡科学合理的平衡膳食,以富含蛋白质、低脂肪、低胆固醇、少盐、少糖、富含维生素和微量元素的食物为主;少吃多餐,定时定量;正确选择保健品。④常见病防治,心脑血管疾病、糖尿病、白内障、青光眼、腰腿痛、关节炎等疾病的防治知识和自我护理方法。⑤体能活动,根据自身特点选择适合自己的体育活动项目,运动不过量。

108.(A1/A2 型题)吸烟是以下哪种疾病最主要的病因

- A.高血压
- B.冠心病
- C.肺癌
- D.心血管疾病
- E.脑梗死

答案: C

解析:吸烟是肺癌的最主要病因,危险程度与每天吸烟量、持续吸烟时间和烟草中焦油和尼古丁含量有直接关系。

109.(A1/A2 型题)以下哪一项行为会有感染艾滋病的风险

- A.在工作和生活中与艾滋病患者和艾滋病病毒感染者握手
- B.与艾滋病患者共同进餐
- C.与艾滋病病毒感染者共用刮脸刀、剃须刀、牙刷等
- D.在艾滋病患者咳嗽和打喷嚏时面对面
- E.与艾滋病病毒感染者共用游泳池或公共浴池等公共设施

答案: C

解析:在教育公众认识传染途径及其预防的同时,必须让公众了解不会感染艾滋病的途径:①在工作和生活中与艾滋病患者和艾滋病病毒感染者的一般接触(如握手,拥抱,共同进餐,共用工具、办公用品等)不会感染艾滋病;②HIV 不会通过马桶、电话机、餐饮具、卧具、游泳池或公共浴池等公共设施传播;③咳嗽和打喷嚏不传播艾滋病;④蚊虫叮咬不传播艾滋病。

110.(A1/A2 型题)关于招贴画/海报的设计和

制作,以下说法错误的是

- A.信息简洁、突出
- B.图文并茂,字数不宜过多
- C.字体大小合适
- D.数字一般用阿拉伯数字
- E.可以用英文、化学名称、学术用语

答案: E

解析:招贴画/海报的设计和制作需要信息简洁、突出;图文并茂,字数不宜过多;字体大小合适;数字一般用阿拉伯数字,尽量不要用英文、化学名称、学术用语。

111.(A1/A2 型题)患者和普通人群都可以是健康指导对象,对于路途远、身体不便的人群适合的方式为

- A.入户指导
- B.电话和网络咨询
- C.讲座
- D.门诊个体健康教育
- E.同伴教育

答案: B

解析:患者和普通人群都可以是电话和网络咨询的指导对象,尤其是对于路途远、身体不方便前来当面咨询的人群来说更方便。

112.(A1/A2 型题)关于开展健康生活方式和可干预危险因素的健康教育的内容,以下正确的是

- A.无氧运动
- B.减轻体重
- C.控烟
- D.戒酒
- E.控制饮食

答案: C

解析:此题暂无解析

113.(A1/A2 型题)开展健康教育服务时,机构发放健康教育印刷资料内容每年应不少于

- A.10 种
- B.11 种
- C.12 种
- D.13 种
- E.14 种

答案: C

解析：此题暂无解析

114.(A1/A2 型题)中医学介绍的运动养生观念是

- A.宜动不宜静
- B.动静结合
- C.坚持运动
- D.修身养性
- E.少吃多动

答案：B

解析：运动养生介绍中医学对运动养生的认识以及动静结合的养生观念；介绍太极拳、八段锦、五禽戏、六字诀等常用的运动养生方法。

115.(A1/A2 型题)传染源及其排出的病原体向周围传播所能波及的范围称为

- A.疫点
- B.疫区
- C.疫源地
- D.自然疫源地
- E.传染区

答案：C

解析：此题暂无解析

116.(A1/A2 型题)可使人群易感性升高的因素，除了

- A.新生儿增加
- B.免疫人口免疫力的自然消退
- C.易感人口的迁入
- D.隐性感染发生后
- E.免疫人口的迁出或死亡，使人群易感性升高

答案：D

解析：人群易感性是指人群作为一个整体对传染病的易感程度。影响人群易感性升高的主要因素有新生儿增加、易感人口迁入、免疫人口免疫力自然消退和免疫力人口死亡等。影响人群易感性降低的主要因素有计划免疫、传染病流行和隐性感染等。

117.(A1/A2 型题)需在 24 小时内报告的传染病人和疑似病人是

- A.霍乱

- B.新生儿破伤风
- C.人感染禽流感
- D.传染性非典型肺炎
- E.黄热病

答案：B

解析：此题暂无解析

118.(A1/A2 型题)须在 2 小时内报告的传染病人和疑似病人是

- A.脊髓灰质炎
- B.肺炭疽
- C.流行性感
- D.艾滋病
- E.狂犬病

答案：B

解析：此题暂无解析

119.(A1/A2 型题)国家对传染病防治实行的方针是

- A.服务群众
- B.标本兼治
- C.预防为主
- D.监督管理
- E.因地制宜

答案：C

解析：预防为主是我国的基本卫生工作方针，我国传染病预防策略可以概括为：预防为主，群策群力，因地制宜，发展三级保健网，采取综合性防治措施。主要包括加强健康教育、人群免疫、身体锻炼及改善卫生条件等。

120.(A1/A2 型题)乙肝疫苗第一针注射与第二针注射的间隔时间是

- A.1 个月
- B.2 个月
- C.3 个月
- D.4 个月
- E.5 个月

答案：A

解析：此题暂无解析

121.(A1/A2 型题)儿童在满 18 月龄接种的疫苗应是

- A.乙肝疫苗

- B.乙脑疫苗  
C.流脑疫苗  
D.脊灰疫苗  
E.麻腮风疫苗

答案：E

解析：此题暂无解析

122.(A1/A2 型题)1 岁以后儿童完成计划免疫复种的第一个疫苗是

- A.乙脑疫苗  
B.百白破疫苗  
C.乙肝疫苗  
D.麻疹疫苗  
E.卡介苗

答案：B

解析：百白破三联疫苗由百日咳疫苗、精制白喉类毒素及精制破伤风类毒素用氢氧化铝吸附制成。免疫成功可以预防百日咳、白喉、破伤风。百白破从母体获得被动抗体，出生后几个月开始逐渐消失。现行免疫程序规定：新生儿出生满 3 个月开始接种百白破疫苗第一次，连续接种三次，每次间隔不少于 28 天，28~60 天，1.5~2 岁加强一次。6 岁加强注射精制百白破疫苗~^次。

123.(A1/A2 型题)脊灰疫苗，运输过程应在冷藏条件下进行，其温度条件是

- A.2℃~5℃  
B.5℃  
C.-20℃  
D.0℃  
E.-2℃~-6℃

答案：C

解析：乙肝疫苗、卡介苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、风疹疫苗、乙脑疫苗、A 群流脑疫苗、A+C 群流脑疫苗、甲肝疫苗在 2~8℃ 条件下运输和避光储存。脊灰疫苗在 -20℃ 条件下避光储存，运输过程应在冷藏条件下进行。

124.(A1/A2 型题)扩大国家免疫规划是从哪年开始实施

- A.1978 年  
B.1982 年

- C.2007 年  
D.2008 年  
E.2012 年

答案：C

解析：此题暂无解析

125.(A1/A2 型题)麻腮风疫苗属于

- A.活疫苗  
B.死疫苗  
C.类毒素  
D.外毒素  
E.病原体的部分成分

答案：A

解析：此题暂无解析

126.(A1/A2 型题)下列不是城乡居民健康档案管理考核指标的是

- A.健康档案建档率  
B.电子健康档案建档率  
C.电子健康档案使用率  
D.健康档案合格率  
E.健康档案使用率

答案：C

解析：此题暂无解析

127.(A1/A2 型题)查体栏中“足背动脉搏动”，必须进行此项检查的慢性病患者是

- A.糖尿病患者  
B.高血压患者  
C.心肌缺血患者  
D.脑血管病患者  
E.下肢骨折患者

答案：A

解析：此题暂无解析

128.(A1/A2 型题)健康管理的首要步骤一般是

- A.健康维护计划的实施  
B.疾病危险度评估  
C.人群的健康体检  
D.健康维护计划的制订  
E.搜集健康信息

答案：E

解析：居民健康档案内容包括个人基本信息。

健康体检.重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录。个人基本情况包括姓名.性别等基础信息和既往史.家族史等基本健康信息。

129.(A1/A2 型题)一名正常小儿身高 90cm,前囟门已闭,头围 48.5cm,乳牙 20 枚,血压 86/55mmHg。此小儿的年龄最大的可能是

- A.1 岁半
- B.2 岁
- C.3 岁
- D.4 岁
- E.5 岁

答案: B

解析: 出生时头围平均 33~34cm, 1 岁时 46cm, 2 岁时 48cm, 15 岁时 54~58cm, 基本同成人。2~12 岁儿童身高的简单估算公式: 身高 (cm) = 年龄 (岁) × 6 + 77。

130.(A1/A2 型题)8 个月男婴,一直母乳喂养,未添加辅食。近 1 个月来出现面色苍白,查外周血象示小细胞低色素性贫血,白细胞和血小板正常。该患儿诊断首先考虑

- A.生理性贫血
- B.营养性缺铁性贫血
- C.营养性巨幼红细胞性贫血
- D.再生障碍性贫血
- E.地中海贫血

答案: B

解析: 铁摄入量不足是缺铁性贫血的主要原因。不及时添加含铁较多辅食的婴幼儿.长期偏食的孩子容易发生。营养性缺铁性贫血是小儿时期危害健康的常见病,多发生在 6 个月至 3 岁的婴幼儿。营养性缺铁性贫血的病因:①早产.双胎或多胎.胎儿失血和妊娠期母亲贫血,导致先天铁储备不足。②未及时添加富含铁的食物,导致铁摄入量不足。③不合理的饮食搭配和胃肠疾病,影响铁的吸收。④生长发育过快,对铁的需要量增大。⑤长期慢性失血,导致铁丢失过多。

131.(A1/A2 型题)患儿,女,1 岁半。平日偏食,常有腹泻.咳嗽,已会独立行走,玩耍正

常。近 1 个月来面色苍黄,逗之不笑,时有头部.肢体颤抖,不能独站。外周血象:血红蛋白 100g/L,红细胞  $2.5 \times 10^{12}/L$ ,白细胞  $4 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞分叶过多。本例可诊断为

- A.营养不良伴低钙血症
- B.慢性腹泻伴低钙血症
- C.缺铁性贫血伴低钙血症
- D.营养性巨幼红细胞贫血
- E.营养性缺铁性贫血

答案: D

解析: 小儿营养性巨幼细胞贫血消化系统症状:食欲减退,少数有异食癖;可有呕吐.腹泻;可出现口腔炎.舌炎或舌乳头萎缩;重者可出现萎缩性胃炎或吸收不良综合征。红细胞降低较血红蛋白降低明显,中性粒细胞分叶过多是其血象特点。

132.(A1/A2 型题)婴幼儿健康管理进行听力筛查的时间应是

- A.1.6.12.24 月龄
- B.6.18.30 月龄
- C.12.24.36 月龄
- D.6.12.18.30 月龄
- E.6.12.24.36 月龄

答案: E

解析: 此题暂无解析

133.(A1/A2 型题)意外窒息是几个月内婴儿常见的伤害,是婴儿期伤害死亡的主要原因

- A.1 个月
- B.8 个月
- C.3~6 个月
- D.6~12 个月
- E.1~3 个月

答案: E

解析: 意外窒息是 1~3 个月内婴儿常见的伤害,是婴儿期伤害死亡的主要原因。主要见于家长照顾不周或护理婴儿的行为不正确,如果注意预防,这类事故完全可以避免。

134.(A1/A2 型题)为 6 月龄儿童进行健康检查的时段要求是

- A.满 6 月时

B.6 月龄前后不超过 1 个月

C.满 6 月至 6 月 29 天

D.6 月龄前后不超过 1 周

E.6 月龄前后不超过 10 天

答案: C

解析: 此题暂无解析

135.(A1/A2 型题)头围达到 54~58cm, 基本同成人的年龄是

A.14 岁

B.8 岁

C.10 岁

D.12 岁

E.15 岁

答案: E

解析: 出生时平均身高为 50cm, 生后第 1 年增长最快, 1 岁时可达 75cm, 2 岁时可达 85cm。2 岁以内测量头围最有监测价值, 连续测量更为重要, 其受双亲头围大小的影响。出生时平均 33~34cm, 1 岁时 46cm, 2 岁时 48cm, 15 岁时 54~58cm, 基本同成人。

136.(A1/A2 型题)乳牙逐个被同位恒牙替换的年龄是

A.6~12 岁

B.1~2 岁

C.2~4 岁

D.4~10 岁

E.10~14 岁

答案: A

解析: 此题暂无解析

137.(A1/A2 型题)婴儿多大不出牙应视为异常

A.4 个月

B.6 个月

C.8 个月

D.10 个月

E.13 个月

答案: E

解析: 生后 4~10 个月乳牙开始萌出, 13 个月未萌出者为乳牙萌出延迟。

138.(A1/A2 型题)不属于新生儿常见的正常

生理状态的是

A.“马牙”

B.生理性黄疸

C.臀红

D.假月经

E.乳腺肿大

答案: C

解析: 新生儿正常生理状态: 生理性黄疸, 一般于出生后 2~3 天出现, 5~7 日最重, 10~14 日消退。乳房肿大及假月经, 新生儿出生后 3~4 日发生乳房肿胀, 2~3 周内自然消失, 部分女婴在出生后 5~7 日阴道流出少许血性分泌物或大量非脓性分泌物。一般持续 2~3 日自然停止。口腔内改变, 出现“马牙”、“螳螂嘴”。臀红属病理性改变。

139.(A1/A2 型题)新生儿应立即转诊的情况不包括是

A.体温  $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$  或  $\leq 35.5^{\circ}\text{C}$

B.呼吸频率  $< 20$  次/分

C.惊厥

D.皮肤黄染

E.有明显的心律不齐

答案: D

解析: 此题暂无解析

140.(A1/A2 型题)一发育正常小儿 4 岁, 其体重约为

A.12kg

B.14kg

C.16kg

D.20kg

E.22kg

答案: C

解析: 2 岁至青春前期儿童体重 (kg) 估算公式: 年龄 (岁)  $\times 2 + 8$ 。

141.(A1/A2 型题)家长带 5 个月的婴儿进行营养咨询, 医生提出以下各项辅助食品, 你认为在该月龄应该添加哪一项为最合适

A.菜汤.鱼肝油

B.米糊.蛋黄

C.粥饼干

D.软饭.肉糜

E.蛋炒饭.苹果

答案: B

解析: 食物转换月龄建议引入泥糊状食物的起始月龄为 6 月龄, 不早于 4 月龄。婴儿每次摄入量稳定 (约 180ml/次), 生长发育良好, 均提示婴儿已具备接受其他食物的消化能力。第一阶段应首先选择能满足生长需要、易于吸收、不易产生过敏的谷类食物, 最好为强化铁的米粉, 米粉可用奶液调配; 其次引入的食物是根茎类蔬菜、水果, 主要目的是训练婴儿的味觉。食物应用勺喂养, 帮助训练吞咽功能。

142.(A1/A2 型题)6 个月以内小儿最理想的食物是

- A.母乳
- B.牛乳
- C.羊乳
- D.全脂奶粉
- E.乳儿糕

答案: A

解析: 母乳是婴儿最理想的天然食品, 母乳中蛋白质、脂肪、糖、维生素、矿物质及水的比例适合且易于消化吸收, 完全能够满足出生后 6 个月内婴儿生长发育的营养需求, 不必添加任何代乳品和水; 母乳中含有丰富的免疫物质, 增加婴儿抗病能力; 母乳中所含的氨基酸、不饱和脂肪酸和牛磺酸等, 有益于婴儿大脑神经系统发育, 可促进婴儿智力发育; 母乳喂养不易引起婴儿过敏, 且经济、方便、卫生; 母乳喂养能增进母婴感情, 有利于婴儿心理发育。故本题应选 A。

143.(A1/A2 型题)孕妇, 30 岁, 单胎妊娠。末次月经不清, 产科检查:宫高 33cm, 腹围 100cm, 胎头已衔接, 其孕周可能为

- A.40 周
- B.24 周
- C.28 周
- D.32 周
- E.36 周

答案: A

解析: 40 周尺侧宫底高度约为 33cm, 手测子宫底高度在脐与剑突之间或略高。故本题

选 A。

144.(A1/A2 型题)孕产妇健康管理服务规范中的服务对象是

- A.辖区内孕产妇
- B.辖区内户籍孕产妇
- C.所有就诊的孕产妇
- D.育龄期妇女
- E.辖区内常住孕产妇

答案: E

解析: 此题暂无解析

145.(A1/A2 型题)“产后访视率”的计算公式是辖区内

- A.产妇分娩 28 天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数 $\times 100\%$
- B.产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数 $\times 100\%$
- C.产妇出院后 7 天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数 $\times 100\%$
- D.产妇分娩 7 天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数 $\times 100\%$
- E.接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数 $\times 100\%$

答案: B

解析: 此题暂无解析

146.(A1/A2 型题)属于雌激素作用的是

- A.宫颈黏液减少
- B.阴道上皮细胞脱落加快
- C.促进乳腺腺泡发育成熟
- D.促进水钠潴留
- E.抑制输卵管肌收缩的振幅

答案: D

解析: 此题暂无解析

147.(A1/A2 型题)我国现阶段采用的围生期规定为

- A.从胚胎形成至产后 4 周
- B.从妊娠满 20 周至产后 4 周
- C.从妊娠满 24 周至产后 1 周
- D.从妊娠满 28 周至产后 1 周
- E.从妊娠满 28 周至产后 4 周

答案: D

解析:围生期是指产前、产时和产后的一段时期,这段时间孕产妇要经历妊娠期、分娩期和产褥期 3 个阶段。国际上对围生期的规定有 4 种:①围生期 I:从妊娠满 28 周(即胎儿体重 $\geq$ 1000g 或身长 $\geq$ 35cm)至产后 1 周;②围生期 II:从妊娠满 20 周(即胎儿体重 $\geq$ 500g 或身长 $\geq$ 25cm)至产后 4 周;③围生期 III:从妊娠满 28 周至产后 4 周;④围生期 IV:从胚胎形成至产后 1 周。我国采用围生期 I 计算围生期死亡率。

148.(A1/A2 型题)一般初产妇开始自觉胎动的时间是在妊娠的第

- A.12~15 周
- B.17~19 周
- C.21~23 周
- D.25~26 周
- E.27 周以后

答案: B

解析: 此题暂无解析

149.(A1/A2 型题)在产科门诊遇到一位妊娠后期的孕妇,在指导产后的母乳喂养时,以下哪一项是不正确的

- A.越早开奶越好
- B.乳母要树立自己喂孩子的信心
- C.从出生后开始养成定时喂奶的习惯
- D.乳母要心情愉快
- E.一侧乳房吸空后再吸另一侧

答案: C

解析: 尽早开奶:生后 2 周是建立母乳喂养的关键时期。产后 1 小时内应帮助新生儿尽早实现第一次吸吮,对成功建立母乳喂养十分重要。按需哺乳:3 月龄内婴儿应频繁吸吮,每日不少于 8 次,可使母亲乳头得到足够的刺激,促进乳汁分泌。乳房排空:吸吮产生的“射乳反射”可使婴儿短时间内获得大量乳汁,每次哺乳时应强调喂空一侧乳房,再喂另一侧,下次哺乳则从未喂空的一侧乳房开始。乳母生活安排:乳母身心愉快、充足睡眠、合理营养(需额外增加能量 500kcal/d),可促进泌乳。

150.(A1/A2 型题)正常产褥期的临床表现正

确的是

- A.产后脉搏一般偏快
- B.产后第一日宫底平脐
- C.产后 10 日内为血性恶露
- D.产后呼吸浅快
- E.产后 24 小时内体温超过 38℃属正常

答案: B

解析: 此题暂无解析

151.(A1/A2 型题)产后浆液恶露一般持续

- A.3~4 天
- B.7~8 天
- C.10 天左右
- D.2 周
- E.3 周

答案: C

解析: 此题暂无解析

152.(A1/A2 型题)关于早产的概念, 正确是

- A.妊娠满 20 周至不满 37 足周间分娩者
- B.妊娠满 24 周至不满 36 足周间分娩者
- C.妊娠满 28 周至不满 36 足周间分娩者
- D.妊娠满 28 周至不满 37 足周间分娩者
- E.妊娠满 28 周至不满 38 足周间分娩者

答案: D

解析: 早产儿是指:28 周 $\leq$ 胎龄 $\leq$ 37 周。

153.(A1/A2 型题)老年人健康管理中的 B 超检查项目不包括

- A.肝脏
- B.胆囊
- C.脾脏
- D.肾脏
- E.胰腺

答案: D

解析: 此题暂无解析

154.(A1/A2 型题)老年人生活自理能力评估结果为“不能自理”的评分标准是

- A.16~18 分
- B. $\geq$ 18 分
- C. $\geq$ 19 分
- D. $>$ 18 分
- E. $>$ 19 分

答案：C

解析：此题暂无解析

155.(A1/A2 型题)《中国居民膳食指南》建议成年男性一天饮用酒的酒精量不超过

- A.15g
- B.20g
- C.25g
- D.30g
- E.35g

答案：C

解析：《中国居民膳食指南》建议成年男性一天饮用酒的酒精量不超过 25g，相当于啤酒 750ml，或葡萄酒 250ml，或 38° 的白酒 75g，或高度白酒 50g。

156.(A1/A2 型题)以下哪一项不属于老年人的健康指导原则

- A.告知老年人健康体检的结果，并进行相应健康指导
- B.对发现已确诊的原发性高血压患者、2 型糖尿病患者，应纳入相应的慢性病患者健康管理
- C.建议戒烟戒酒
- D.对体检中发现有异常的老年人建议定期复查
- E.进行健康生活方式以及疫苗接种、骨质疏松预防、防跌倒措施、意外伤害预防和自救等健康指导

答案：C

解析：根据《国家基本公共卫生服务规范（2011 年版）》对老年人的健康指导，要求做到：告知老年人健康体检的结果，并进行相应健康指导。对发现已确诊的原发性高血压患者、2 型糖尿病患者，应纳入相应的慢性病患者健康管理。对体检中发现有异常的老年人建议定期复查。进行健康生活方式以及疫苗接种、骨质疏松预防、防跌倒措施、意外伤害预防和自救等健康指导。告知或预约下一次健康管理服务的时间。

157.(A1/A2 型题)乡村医生为辖区内老年人提供健康管理的服务流程不包括的环节是

- A.预约

B.信息采集和健康状况评估

C.评估结果的分类

D.提出针对性的运动建议

E.老年人的分类管理

答案：D

解析：乡村医生为辖区内老年人提供健康管理的服务流程包括“预约—信息采集和健康状况评估—评估结果的分类—老年人的分类管理”共四个环节。

158.(A1/A2 型题)对连续两次出现血压控制不满意的患者，正确的处理是

- A.增加药物剂量，预约进行下一次随访
- B.建议其转诊到上级医院，2 周内随访
- C.更换不同类的降压药物，2 周内随访
- D.更换不同类的降压药物，4 周内随访
- E.建议其转诊到上级医院，4 周内随访

答案：B

解析：此题暂无解析

159.(A1/A2 型题)关于高血压的高危人群界定有误的是

- A.收缩压 130~139mmHg 和（或）舒张压 85~89mmHg
- B.肥胖或腹型肥胖（腰围男性≥90cm、女性≥85cm）
- C.高血压家族史（一、二级亲属）
- D.长期过量饮酒（每日饮白酒≥200ml，即四两）
- E.男性年龄≥55 岁

答案：D

解析：此题暂无解析

160.(A1/A2 型题)对于紧急转诊的高血压患者，主动随访转诊情况的时间是

- A.1 周内
- B.2 周内
- C.3 周内
- D.4 周内
- E.2 个月内

答案：B

解析：此题暂无解析

161.(A1/A2 型题)糖尿病重点人群不包括

- A. 年龄  $\geq 45$  岁, BMI  $\geq 24$ , 以往有 IGT 或 IFG 者
- B. 有糖尿病家族史者
- C. 有高密度脂蛋白胆固醇降低 ( $\leq 35\text{mg/dl}$  即  $0.91\text{mmol/L}$ ) 和 (或) 高甘油三酯血症 ( $\geq 250\text{mg/dl}$ , 即  $2.75\text{mmol/L}$ ) 者
- D. 年龄  $\geq 35$  岁的妊娠妇女; 有妊娠糖尿病史者; 曾有分娩巨大儿 (出生体重  $\geq 4\text{kg}$ ) 者
- E. 使用一些特殊药物者, 如糖皮质激素. 利尿剂等

答案: D

解析: 此题暂无解析

162.(A1/A2 型题) 2 型糖尿病患者血糖控制满意的标准是

- A. HbA1c  $< 6.5\%$
- B. 空腹血糖值  $< 7.0\text{mmol/L}$
- C. 空腹血糖值  $\leq 7\text{mmol/L}$
- D. 空腹血糖值  $< 6.1\text{mmol/L}$
- E. 空腹血糖值  $< 5.6\text{mmol/L}$

答案: B

解析: 此题暂无解析

163.(A1/A2 型题) 关于 2 型糖尿病分类干预说法正确的是

- A. 第一次出现血糖控制不满意, 出现药物不良反应的患者, 预约下一次随访时间
- B. 对血糖控制满意. 无药物不良反应. 无新发并发症或原有并发症无加重者, 预约下一次
- C. 原并发症加重者, 两周内随访
- D. 连续 2 次出现空腹血糖控制不满意. 药物不良反应难以控制者, 转诊上级医院不必随访
- E. 新的并发症出现者, 2 周内随访

答案: B

解析: 对血糖控制满意. 无药物不良反应. 无新发并发症或原有并发症无加重者, 预约下一次随访时间; 第一次出现血糖控制不满意, 出现药物不良反应者, 2 周内随访; 连续 2 次出现空腹血糖控制不满意. 药物不良反应难以控制. 新的并发症. 原并发症加重者, 转诊上级医院并 2 周内随访。

164.(A1/A2 型题) “肺结核患者规则服药率”

指标中, “规则服药” 是指

- A. 在整个疗程中, 患者在规定的服药时间全部服药
- B. 在整个疗程中, 患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的 90% 以上
- C. 在整个疗程中, 患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的 80% 以上
- D. 在两次随访期间, 患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的 90% 以上
- E. 在治疗过程中, 患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的 80% 以上

答案: B

解析: 此题暂无解析

165.(A1/A2 型题) 一般不属于肺结核可疑症状的是

- A. 咳嗽. 咳痰  $\geq 2$  周
- B. 高热
- C. 胸痛
- D. 盗汗
- E. 咯血. 血痰

答案: B

解析: 此题暂无解析

166.(A1/A2 型题) 精神病患者病情基本稳定患者的危险性为

- A. 0 级
- B. 1~2 级
- C. 2~3 级
- D. 3~4 级
- E. 4~5 级

答案: B

解析: 此题暂无解析

167.(A1/A2 型题) 对应管理的严重精神障碍患者, 随访要求是

- A. 至少随访 1 次
- B. 至少随访 2 次
- C. 至少随访 3 次
- D. 至少随访 4 次
- E. 根据病情决定随访次数

答案: D

解析: 此题暂无解析

168.(A1/A2 型题)严重精神障碍患者分类属于病情不稳定的情况是

- A.危险性评估为 3 级
- B.危险性评估为 2 级
- C.危险性评估为 1 级
- D.糖尿病患者病情稳定
- E.服用抗精神病药物, 出现轻微不良反应

答案: A

解析: 此题暂无解析

169.(A1/A2 型题)根据应管理严重精神障碍患者的病情分类开展随访工作, 依病情变化及时调整随访周期。至少每 3 个月随访 (

- A.1 次.4 次
- B.1 次.1 次
- C.2 次.2 次
- D.1 次.3 次
- E.2 次.4 次

答案: A

解析: 根据应管理严重精神障碍患者的病情分类开展随访工作, 依病情变化及时调整随访周期。至少每 3 个月随访 1 次, 全年至少随访 4 次。每次随访应从危险性.精神状况.躯体状况等 3 个方面对患者进行全面评估.检查和询问。二。

170.(A1/A2 型题)体形偏瘦, 阴液亏少, 以口燥咽干.手足心热等虚热表现为主要特征的是哪一种体质类型

- A.平和质
- B.气虚质
- C.阳虚质
- D.阴虚质
- E.痰湿质

答案: D

解析: 阴虚质 (D 型) 总体特征: 阴液亏少, 以口燥咽干.手足心热等虚热表现为主要特征。形体特征: 体形偏瘦。常见表现: 手足心热, 口燥咽干, 鼻微干, 喜冷饮, 大便干燥, 舌红少津, 脉细数。发病倾向: 易患虚劳.失精.不寐等病; 感邪易从热化。对外界环境适应能力: 耐冬不耐夏; 不耐受暑.热.燥邪。

171.(A1/A2 型题)老年人中医药健康管理服

务内容包括

- A.建立健康档案.进行中医体质辨识
- B.进行健康体检.中医药健康指导
- C.建立健康档案.进行健康体检
- D.进行中医体质辨识.中医药保健指导
- E.进行健康体检.中医体质辨识

答案: D

解析: 此题暂无解析

172.(A1/A2 型题)对老年人进行中医体质辨识时, 关于体质判定标准描述, 正确的是

- A.体质判定标准表需要纳入居民的健康档案
- B.出现两种及以上判定结果即兼夹体质是错误的
- C.出现既是阴虚又是阳虚这样的矛盾判定结果是正常的
- D.在老年人回答问题过程中一次提问, 不要提醒
- E.如果出现判定结果分数一致, 则由中医师依据专业知识判定

答案: E

解析: 此题暂无解析

173.(A1/A2 型题)我国目前慢性非传染性疾病的发病.患病.死亡呈现的趋势是

- A.降低
- B.不稳定
- C.波动
- D.增长
- E.减缓

答案: D

解析: 在我国, 随着社会经济的发展, 生活方式的改变, 城市化的进展及危险因素暴露水平的增加, 我国慢性非传染性疾病的发病.患病.死亡呈现增长趋势。

174.(A1/A2 型题)痹症的发病特点为本病不分年龄.性别, 但易罹患于

- A.青壮年和体力劳动者.运动员以及体育爱好者
- B.儿童
- C.老年人
- D.体弱多病者

E.冠心病患者

答案: A

解析: 痹症的发病特点本病不分年龄.性别,但青壮年和体力劳动者.运动员以及体育爱好者易于罹患。同时,发病及病情的轻重与寒冷.潮湿.劳累以及天气变化.节气等有关。

175.(A1/A2 型题)确定食物中毒的可疑食物主要是依据

- A.在同一场所同一时间未发病者未进食的食物
- B.潜伏期最短者
- C.病人的潜伏期特有的中毒症状
- D.病人的潜伏期呕吐物和排泄物
- E.发病者的临床症状

答案: A

解析: 发病与食物有关,病人有食用同一<sup>^</sup>有毒食物史,流行波及范围与有毒食物供应范围相一致,未食用者不发病,停止该食物供应后,发病即告终止。

176.(A1/A2 型题)室内空气污染物的主要来源不包括

- A.建筑及室内装饰材料
- B.电器散热
- C.室外污染物
- D.燃烧产物
- E.人的活动

答案: B

解析: 室内空气污染物的主要来源主要有建筑及室内装饰材料.室外污染物.燃烧产物和人的活动。不包括电器散热。

177.(A1/A2 型题)引起副溶血性弧菌的主要食品是

- A.谷类
- B.豆类
- C.肉类
- D.海产品
- E.奶类

答案: D

解析: 此题暂无解析

178.(A1/A2 型题)蔬菜水果的主要卫生问题

不包括

- A.细菌及寄生虫的污染
- B.农药污染
- C.工业废水中有机化学物质的污染
- D.霉菌及霉菌毒素污染
- E.其他有害物质如硝酸盐和亚硝酸盐的污染

答案: D

解析: 蔬菜.水果的主要卫生问题:(1)细菌及寄生虫的污染。(2)有害化学物质对蔬菜.水果的污染:①农药污染;②工业废水;③其他有害物质:如蔬菜.水果在不恰当的存放.贮藏或腌制时,亚硝酸盐的量即可增加。

179.(A1/A2 型题)下列哪项不是核心家庭的特征

- A.家庭内部资源的可用性大
- B.规模小
- C.成员之间的关系较单纯
- D.结构简单
- E.相对容易达成一致意见

答案: A

解析: 此题暂无解析

180.(A1/A2 型题)全科医疗是立足于社区的卫生服务,其特征不包括

- A.以一定的地域为基础.以该人群的卫生需求为导向
- B.充分利用社区资源,为社区民众提供服务
- C.以患者为导向的基层医疗
- D.“社区卫生诊断”成为开展全科医疗必要的基础环节
- E.将全科医疗中个体和群体健康照护紧密结合.互相促进

答案: C

解析: 全科医疗是立足于社区的卫生服务,其特征表现为:第一,社区的概念体现于地域和人群,即以一定的地域为基础.以该人群的卫生需求为导向,全科医疗服务内容与形式都应适合当地人群的需求,并充分利用社区资源,为社区民众提供服务。因此“社区卫生诊断”就成为开展全科医疗必要的基础环节;第二,以社区为导向的基层医疗(不是以患者为导向,故 C 错误),将全科医疗中个体和群体健康照护紧密结合.互相促进。

全科医生在诊疗服务中，既要利用其对社区背景的熟悉去把握个别病人的相关问题，又要对从个体病人身上反映出来的群体问题有足够的敏感性。因为全科医生的就医人群是相对固定的，各类疾病发生的概率也相对固定，那么一旦疾病概率有明显变化，就表明出现了足以影响群体健康的某些因素。此时医生就要去追踪病人的来龙去脉，了解其所属组织或住宅区域可能发生的重大生活事件，评估其对病人的负面影响，并提出合理的社区干预计划。

181.(A1/A2 型题)发热最常见的原因是

- A. 颅脑损伤
- B. 变态反应
- C. 无菌性坏死物质的吸收
- D. 内分泌与代谢障碍
- E. 感染

答案：E

解析：根据是否有感染，发热的病因常分为感染性和非感染性两大类，而以感染性更常见。

182.(A1/A2 型题)遇有下列情况应紧急降温，除外

- A. 体温超过 39.3℃
- B. 高热伴惊厥
- C. 高热伴休克
- D. 高温中暑
- E. 高热伴心功能不全

答案：A

解析：应作紧急降温处理的情况：①体温超过 40℃。②高热伴惊厥或谵妄。③高热伴休克或心功能不全。④高温中暑。故选 A。

183.(A1/A2 型题)肿瘤性发热常见热型为

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 超高热
- E. 不规则热

答案：E

解析：肿瘤患者的发热源于组织破坏和坏死物质的吸收，多为不规则热。不规则热是指

发热无一定规律，可见于结核病、恶性肿瘤、风湿热、支气管肺炎、渗出性胸膜炎、感染性心内膜炎等。故本题选 E。

184.(A1/A2 型题)患者，男性，6 岁。4 小时前在野外玩耍时四肢被昆虫叮咬，自感瘙痒。体检可见四肢皮肤有散在的局限性、实质性和隆起性损害，直径约 0.2~0.5cm 大小，淡红色。此皮损为

- A. 斑疹
- B. 丘疹
- C. 浸渍
- D. 糜烂
- E. 囊肿

答案：B

解析：丘疹是局限性、实质性、隆起性损害，一般直径不超过 1cm。故选 B。

185.(A1/A2 型题)下列哪项属于原发性皮疹

- A. 糜烂
- B. 水疱
- C. 痂
- D. 溃疡
- E. 萎缩

答案：B

解析：此题暂无解析

186.(A1/A2 型题)皮疹沿神经分布的皮肤病是

- A. 药疹
- B. 疥疮
- C. 接触性皮炎
- D. 带状疱疹
- E. 寻麻疹

答案：D

解析：环状皮损伴瘙痒+鳞屑镜检菌丝，提示体癣；单侧沿神经分布斑丘疹性水疱+明显疼痛，提示带状疱疹；脓疱液沉积呈半月形，提示大疱型脓疱疮；指缝、外生殖器好发+夜间剧烈瘙痒+隧道和丘疹，提示疥疮；强烈日光照射+急性红斑、水疱+瘙痒、灼痛，提示日光性皮炎。

187.(A1/A2 型题)以下关于皮损的描述，哪项

不正确

- A. 斑疹是高出皮面的皮损
- B. 水泡是皮肤内局限性的液体聚集而成
- C. 脓疱是以脓液为其内容的疱
- D. 苔癣化是由于搔抓而融合成的丘疹
- E. 皮肤溃疡后遗留疤痕

答案：A

解析：此题暂无解析

188.(A1/A2 型题)为局限性的皮肤颜色改变，即不凸起，也不凹下的是

- A. 斑疹
- B. 丘疹
- C. 结节
- D. 糜烂
- E. 抓痕

答案：A

解析：此题暂无解析

189.(A1/A2 型题)心源性水肿最常见的病因是

- A. 左心衰竭
- B. 右心衰竭
- C. 渗出性心包炎
- D. 缩窄性心包炎
- E. 心绞痛

答案：B

解析：此题暂无解析

190.(A1/A2 型题)局限性水肿常见于

- A. 心力衰竭
- B. 肝硬化
- C. 肾病综合征
- D. 局部静脉回流受阻
- E. 血管神经性水肿

答案：D

解析：此题暂无解析

191.(A1/A2 型题)下列哪项不属于全身性水肿

- A. 心源性水肿
- B. 肝源性水肿
- C. 营养不良性水肿
- D. 肾源性水肿

E. 过敏性水肿

答案：E

解析：此题暂无解析

192.(A1/A2 型题)下面关于水肿的临床表现说法错误的是

- A. 心源性水肿从足部开始，下垂部位明显
- B. 肝源性水肿不是可凹性水肿
- C. 肾源性水肿伴随高血压，尿量减少
- D. 内分泌性水肿通常从胫前或眼眶周围开始水肿
- E. 营养不良性水肿常伴有胸腹水

答案：B

解析：肝源性水肿为可凹性水肿，全身性水肿为液体在组织间隙内弥漫分布，若皮肤受压后出现凹陷，称为凹陷性水肿。

193.(A1/A2 型题)紫绀出现急骤，病情严重，氧疗无效，静脉血呈深棕色，亚甲蓝可使紫绀消退，见于

- A. 高铁血红蛋白血症
- B. 硫化血红蛋白血症
- C. 肺性紫绀
- D. 心性紫绀
- E. 混合性紫绀

答案：A

解析：此题暂无解析

194.(A1/A2 型题)急性结膜炎最常见的体征是

- A. 瞳孔缩小
- B. 瞳孔散大
- C. 眼眶痛
- D. 睫状充血
- E. 结膜充血

答案：E

解析：此题暂无解析

195.(A1/A2 型题)结膜充血最常见的病因是

- A. 结膜炎
- B. 角膜炎
- C. 结膜下出血
- D. 长期局部用药
- E. 虹膜睫状体炎

答案：A

解析：结膜炎是结膜充血最常见的病因。

196.(A1/A2 型题)以下不是传导性耳聋主要病因的是

- A.先天性耳畸形
- B.老年性聋
- C.慢性化脓性中耳炎
- D.外耳道炎
- E.外耳道耵聍栓塞

答案：B

解析：此题暂无解析

197.(A1/A2 型题)突然发生的原因不明的感音神经性耳聋称

- A.突发性突聋
- B.梅尼埃病
- C.功能性聋
- D.噪声性聋
- E.耳毒性聋

答案：A

解析：此题暂无解析

198.(A1/A2 型题)重听是指

- A.程度较轻的耳聋
- B.程度较轻的耳鸣
- C.程度较重的耳聋
- D.程度较重的耳鸣
- E.程度极重的耳聋

答案：A

解析：此题暂无解析

199.(A1/A2 型题)长期服用水杨酸类药物引起的鼻出血的原因()

- A.凝血障碍
- B.血小管损伤
- C.破坏造血系统
- D.内源性凝血酶原减少
- E.药物过敏

答案：D

解析：此题暂无解析

200.(A1/A2 型题)鼻前部出血点明确的鼻出血适合采取哪种方法止血

- A.出血点收敛.压迫或烧灼
- B.前后鼻孔填塞
- C.补充缺乏的凝血因子
- D.鼻腔填塞
- E.结扎出血的动脉分支

答案：A

解析：此题暂无解析

201.(A1/A2 型题)鼻出血的局部原因不包括

- A.鼻和鼻窦外伤或医源性损伤
- B.鼻腔炎症
- C.鼻中隔病变
- D.肿瘤
- E.中毒

答案：E

解析：此题暂无解析

202.(A1/A2 型题)患者男，23 岁。因口角出现溃疡前来就诊。溃疡为圆或椭圆形，直径 2~4mm，边缘整齐，周围有 1mm 宽的红晕，溃疡数目不多，一般每次 1~5 个，10~14 天愈合

- A.轻型口疮
- B.重型口疮
- C.疱疹样口疮
- D.白塞病
- E.疱疹性口炎

答案：A

解析：轻型口疮一般直径较小.愈合快愈后不留瘢痕，1 题中溃疡直径 2~4mm，属轻型口疮的表现，故选 A；重型口疮直径较大超过 1cm，且深达黏膜下层或肌层，愈合慢且有瘢痕；疱疹性口疮直径小于 2mm 且数目特别多，可达几十个，疼痛较重，愈后不留瘢痕。三。

203.(A1/A2 型题)口腔创伤性溃疡的病因是

- A.病因不清，多种因素作用
- B.抗生素的大量使用，发生菌群失调，或免疫抑制剂的应用使免疫力降低
- C.病毒感染
- D.螺旋体感染
- E.局部刺激

答案：E

解析：创伤性溃疡由局部刺激引起。

204.(A1/A2 型题)治疗创伤性溃疡的首要措施是

- A.局部使用抗生素
- B.尽快去除刺激因素
- C.全身使用肾上腺皮质激素
- D.局部封闭
- E.理疗

答案：B

解析：此题暂无解析

205.(A1/A2 型题)女，60 岁。4 周来右上后牙胀痛，不能咀嚼。每日饭后要剔除嵌塞食物。查见右上磨牙龋中等深度，冷刺激同对照牙，轻度叩痛，龈红肿，探触痛并出血。应考虑的诊断最可能是

- A.牙髓炎和龈乳头炎
- B.中龋和牙髓炎
- C.深龋和牙髓炎
- D.中龋和龈乳头炎
- E.牙髓炎和牙周炎

答案：D

解析：因患牙冷刺激同对照牙，故不存在牙髓炎症。龋洞中等深度提示中龋，龈红肿探痛并出血是牙龈炎症的表现，患者有剔牙习惯，可导致龈乳头炎的发生，因此选择 D。

206.(A1/A2 型题)下列哪项症状不是深龋的临床表现

- A.无自症状
- B.冷热刺激痛
- C.酸甜食物刺激痛
- D.自发性疼痛
- E.进食性疼痛

答案：D

解析：此题暂无解析

207.(A1/A2 型题)急性根尖周炎早期特有的自觉症状是

- A.咬合轻钝痛
- B.牙根部发木感
- C.根尖部不适感
- D.紧咬时疼痛缓解

E.患牙浮出感觉

答案：D

解析：急性根尖周炎初期，根周膜的血管扩张充血，而咬合压力将血管中的血液暂时挤走，根尖周间隙压力减少，此时紧咬时疼痛缓解，是特有的自觉症状。二。

208.(A1/A2 型题)患儿，7 岁，急性肾小球肾炎入院 3 天。早上护士交班时，患儿突然出现呼吸困难，不能平卧，咳嗽，咳粉红色泡沫痰，尿量减少，此患儿是严重的

- A.急性全心衰竭
- B.急进型高血压
- C.急性肾衰竭
- D.胸腔积液
- E.循环充血急性肺水肿

答案：E

解析：此题暂无解析

209.(A1/A2 型题)咳铁锈色痰最常见的疾病是

- A.肺脓肿
- B.支气管哮喘
- C.大叶性肺炎
- D.慢性支气管炎
- E.慢性咽炎

答案：C

解析：此题暂无解析

210.(A1/A2 型题)咳嗽无痰或其量甚少为干性咳嗽，其病因多见于

- A.肺脓肿
- B.慢性支气管炎
- C.大叶性肺炎
- D.急性咽喉炎
- E.肺结核空洞

答案：D

解析：此题暂无解析

211.(A1/A2 型题)大量恶臭痰，静置后分三层见于

- A.肺结核
- B.肺癌
- C.肺脓肿

- D.急性支气管炎  
E.支气管哮喘

答案：C

解析：肺脓肿和支气管扩张的典型特点是大量脓臭痰，痰静置后分三层。故选 C。

212.(A1/A2 型题)咳出由血液和黏液混合的砖红色胶冻状痰为特征的疾病是

- A.克雷伯杆菌肺炎  
B.肺炎球菌肺炎  
C.葡萄球菌肺炎  
D.支原体肺炎  
E.念珠菌肺炎

答案：A

解析：咳出由血液和黏液混合的砖红色胶冻状痰为特征的疾病是克雷伯杆菌肺炎，故选 A，肺炎球菌肺炎以咳出铁锈色痰为特征，故不选；葡萄球菌肺炎以咳出脓血痰为特征，故不选；支原体肺炎为刺激性呛咳，咳少量黏液，故不选；念珠菌肺炎咳白色泡沫黏痰，有酵臭味，故不选。

213.(A1/A2 型题)急性左心力衰竭患者痰液呈

- A.黏液痰  
B.铁锈色痰  
C.大量脓痰分 3 层  
D.痰恶臭  
E.大量粉红色泡沫痰

答案：E

解析：此题暂无解析

214.(A1/A2 型题)每天咯血量为多少时属于大量咯血

- A.>100ml  
B.>500ml  
C.100ml~500ml  
D.>300ml  
E.>1000ml

答案：B

解析：此题暂无解析

215.(A1/A2 型题)不属于咯血特点的是

- A.出血前感胸闷

- B.咳嗽后咯出鲜红色血  
C.鲜红色血中含泡沫痰  
D.鲜血经酸碱测定呈酸性  
E.咯血 5 天后痰中仍带血

答案：D

解析：咯血的临床表现：咯血特点为出血前感咽喉痒、胸闷、咳嗽。继而咯出鲜红色含泡沫痰，鲜血经酸碱测定呈碱性。血痰持续数日。故本题应选 D。

216.(A1/A2 型题)女，45 岁，发作性呼吸困难 4 年，再发 3 天，伴咳嗽、咳白色泡沫痰，无咯血、发热。查体：

- A.大支气管狭窄  
B.大支气管梗阻  
C.小支气管狭窄  
D.呼吸面积减少  
E.肺泡张力增高

答案：C

解析：患者呼气延长，双肺哮鸣者，为呼气性呼吸困难，主要是由于肺泡弹性减弱和（或）小支气管的痉挛或炎症所致。常见于慢性支气管炎（喘息型）、慢性阻塞性肺气肿、支气管哮喘、弥漫性泛细支气管炎等。

217.(A1/A2 型题)癔症病人出现的呼吸困难是

- A.吸气性呼吸困难  
B.呼气性呼吸困难  
C.混合性呼吸困难  
D.精神性呼吸困难  
E.中毒性呼吸困难

答案：D

解析：癔症病人呼吸浅快，常伴有口周麻木、手足搐搦，引起的呼吸困难属于精神性呼吸困难，故选 D。

218.(A1/A2 型题)下列哪项可出现呼气性呼吸困难

- A.急性喉炎  
B.气管异物  
C.急性会厌炎  
D.支气管哮喘  
E.喉水肿

答案：D

解析：此题暂无解析

219.(A1/A2 型题)三凹征是指

- A.吸气时,胸骨上窝.锁骨上窝和肋间隙明显凹陷
- B.呼气时,胸骨上窝.锁骨上窝和肋间隙明显凹陷
- C.吸气时,呼吸肌用力收缩而使胸腔压力减少
- D.呼气时,呼吸肌用力收缩而使胸腔压力减少
- E.查体呼气相延长

答案：A

解析：三凹征是指吸气时,胸骨上窝.锁骨上窝和肋间隙明显凹陷,查体吸气相延长,是因为吸气时,呼吸肌用力收缩而使胸腔压力增大而出现。

220.(A1/A2 型题)吸气性呼吸困难的特点是

- A.吸气显著费力
- B.三凹征
- C.鼻翼煽动
- D.端坐呼吸
- E.蹲踞呼吸

答案：B

解析：吸气性呼吸困难严重者可见“三凹征”，表现为胸骨上窝.锁骨上窝和肋间隙凹陷,此为典型表现。

221.(A1/A2 型题)女性,65岁,劳动后突然出现左侧胸部绞痛伴咯血.呼吸困难,自含服“硝酸甘油”后未能缓解而急诊入院。查体:BP110/70mmHg,口唇发绀,双肺未闻及明显干.湿??音。最可能的疾病是

- A.肺栓塞
- B.食管炎
- C.心绞痛
- D.肺部肿瘤
- E.自发性气胸

答案：A

解析：肺栓塞病人有慢性血栓栓塞症的危险因素。突然发生一侧胸痛伴呼吸困难.发绀.咳嗽.咯血；重症者可有晕厥。

222.(A1/A2 型题)胸痛并向左肩.左前臂放射,最可能的诊断是

- A.急性心包炎
- B.纵膈疾病
- C.急性胸膜炎
- D.心绞痛
- E.食管炎

答案：D

解析：此题暂无解析

223.(A1/A2 型题)心绞痛疼痛的性质是

- A.刀割样痛
- B.烧灼样痛
- C.压榨样痛
- D.撕裂样痛
- E.隐痛

答案：C

解析：心绞痛是中老年病人胸痛的常见原因。其特点是:胸骨后或心前区压榨性疼痛/闷痛,范围如手掌大小。

224.(A1/A2 型题)餐后较久或数餐后呕吐,多见于

- A.幽门梗阻
- B.幽门管溃疡
- C.精神性呕吐
- D.胃张力下降
- E.食物中毒

答案：A

解析：此题暂无解析

225.(A1/A2 型题)下列可引起呕吐伴右上腹痛.发热.黄疸的疾病是

- A.急性肠炎
- B.急性胰腺炎
- C.急性腹膜炎
- D.急性肾盂肾炎
- E.急性化脓性胆管炎

答案：E

解析：此题暂无解析

226.(A1/A2 型题)引起黄疸的疾病中,下列哪项不是后天获得性溶血性黄疸

- A. 自身免疫性溶血性贫血
- B. 海洋性贫血
- C. 伯氨喹啉引起的溶血
- D. 新生儿溶血
- E. 蛇毒引起的贫血

答案: B

解析: 此题暂无解析

227.(A1/A2 型题)女性, 42 岁。突然上腹痛 1 天, 渐重, 恶心, 呕吐, 来诊后急查血尿酸淀粉酶, 均明显高于正常, 该患者最可能的病因为

- A. 胆道结石
- B. 急性胰腺炎
- C. 病毒感染
- D. 胺类药物
- E. 遗传或代谢障碍

答案: B

解析: 腹痛为本病的主要症状, 大多为突然发作, 常于饱餐和饮酒后 1~2 小时发病, 疼痛为持续性, 有阵发性加剧, 恶心、呕吐, 有时较频繁, 呕吐物为当日所进食物, 多同时伴有腹胀。淀粉酶测定: 血淀粉酶一般在发病后 8 小时开始升高, 48~72 小时后下降, 3~5 天内恢复正常。血清淀粉酶超过 500 苏氏单位有重要的诊断价值。尿淀粉酶在发病后 8~12 小时开始升高, 维持时间较长, 连续增高时间可达 1~2 周, 超过 300U/h 有诊断价值

228.(A1/A2 型题)关于腹痛部位, 下列叙述正确的是

- A. 胃、十二指肠溃疡疼痛多在脐周
- B. 急性阑尾炎疼痛在右下腹麦氏点
- C. 小肠疾病疼痛多在右上腹部
- D. 胆囊炎疼痛多在左上腹
- E. 肝脓肿疼痛多在中下腹

答案: B

解析: ①胃、十二指肠和胰腺疾病: 疼痛多在中上腹部。②胆囊炎、胆石症、肝脓肿等: 疼痛多在右上腹部。③急性阑尾炎: 疼痛在右下腹 McBurney 点。④小肠疾病: 疼痛多在脐部或脐周。⑤结肠疾病: 疼痛多在下腹或左下腹部。⑥膀胱炎、盆腔炎及异位妊娠破裂: 疼

痛亦在下腹部。故选 B。

229.(A1/A2 型题)腹痛患者需要及时转诊的情况不包括

- A. 伴有水电解及酸碱平衡紊乱严重的患者
- B. 伴有休克的患者
- C. 需要手术治疗的腹痛患者
- D. 怀疑有可能是急性胰腺炎的患者
- E. 怀疑有可能是急性胆囊炎的患者

答案: E

解析: 急性阑尾炎病情紧急, 遇到以下情况应及时转诊: ①诊断不明的腹痛。重症胰腺炎、肠梗阻、胃肠穿孔等与阑尾炎导致的腹痛症状接近, 但如果不及时救治, 会危及生命。②需要手术治疗的腹痛患者。③伴有休克、水电解及酸碱平衡紊乱严重的患者。测量并记录血压、心率、呼吸、脉搏等生命体征, 给予补液扩容, 使用升压药、补充电解质等, 以维持生命体征。转诊前如果未明确诊断, 慎用止痛药。功能性腹痛伴有抑郁, 常规处理后效果不明显, 可转精神科治疗。

230.(A1/A2 型题)小儿肠套叠的描述, 错误的是

- A. 3 岁以下儿童
- B. 最主要症状为腹痛、呕吐和果酱样血便
- C. 腹部可触及腊肠样包块
- D. 肛门指诊往往可见果酱样血便
- E. 可因肠蠕动紊乱而发生肠套叠

答案: A

解析: 此题暂无解析

231.(A1/A2 型题)上腹进行性疼痛伴黄疸可见于

- A. 消化性溃疡
- B. 胰腺癌
- C. 胆囊炎
- D. 胰腺炎
- E. 慢性胃炎

答案: B

解析: 此题暂无解析

232.(A1/A2 型题)女 58 岁, 近 1 月来经常腹痛腹泻, 粪便呈果酱样伴腥臭味, 右下腹压

痛明显，最可能的诊断是

- A. 细菌性痢疾
- B. 胰腺炎
- C. 阑尾炎
- D. 食物中毒
- E. 阿米巴痢疾

答案：E

解析：此题暂无解析

233.(A1/A2 型题)下列呈黏液脓性鲜血便同时伴里急后重的疾病是

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 直肠息肉
- C. 肠结核
- D. 消化性溃疡
- E. 急性细菌性痢疾

答案：E

解析：此题暂无解析

234.(A1/A2 型题)下列引起腹泻的疾病中哪项是肠道非感染性病变

- A. 肠结核
- B. 慢性阿米巴痢疾
- C. 伤寒
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 血吸虫病

答案：D

解析：肠道非感染性疾病包括克罗恩病、溃疡性结肠炎、结肠多发性息肉、吸收不良综合征、放射性肠炎及一些功能性胃肠疾病（如肠易激综合征）等。

235.(A1/A2 型题)下列属于引起功能性便秘原因的是

- A. 局部病变导致排便无力
- B. 结肠完全或不完全性梗阻
- C. 结肠运动功能紊乱
- D. 腹腔或盆腔内肿瘤的压迫
- E. 直肠与肛门病变

答案：C

解析：此题暂无解析

236.(A1/A2 型题)中老年人呕血伴反复发作的、无明显规律的上腹痛并有厌食及消瘦者，

应考虑

- A. 胃癌
- B. 慢性胃炎
- C. 幽门梗阻
- D. 消化性溃疡
- E. 慢性胰腺炎

答案：A

解析：中老年人，出现呕血伴慢性上腹痛且疼痛丧失规律性，伴食欲减退、消瘦或贫血，应警惕消化系统恶性肿瘤。

237.(A1/A2 型题)明确上消化道出血病因的首选检查方法是

- A. X 线钡餐
- B. 选择性动脉造影
- C. 血常规
- D. 胃镜
- E. 大便或呕吐物隐血试验

答案：D

解析：此题暂无解析

238.(A1/A2 型题)阿米巴痢疾表现为

- A. 暗红色果酱样脓血便
- B. 排便前后有鲜血滴出或喷射出
- C. 黏液脓性鲜血便
- D. 粪便灰黑色，无光泽
- E. 洗肉水样粪便伴腥臭味

答案：A

解析：急性细菌性痢疾多有黏液脓血便；急性出血性坏死性肠炎可排出洗肉水样血便，并有特殊的腥臭味；阿米巴痢疾的粪便多有暗红色果酱样的脓血。

239.(A1/A2 型题)患者，女性，30 岁，妊娠 7 个月，出现尿频、尿急、尿痛，提示该患者可能处于

- A. 妊娠压迫
- B. 气温过高
- C. 饮水量过多
- D. 泌尿系感染
- E. 食用过咸食物

答案：D

解析：此题暂无解析

240.(A1/A2 型题)急性肾盂肾炎膀胱刺激症状是

- A.血尿
- B.蛋白尿
- C.水肿
- D.脓尿
- E.尿频.尿急.尿痛

答案: E

解析:膀胱刺激征指尿频.尿急.尿痛.故选 E。

241.(A1/A2 型题)40 岁以上无痛性血尿多见于

- A.膀胱炎
- B.肾肿瘤
- C.膀胱癌
- D.前列腺增生症
- E.神经源性膀胱

答案: C

解析:此题暂无解析

242.(A1/A2 型题)血尿伴皮肤黏膜出血见于下列情况,但除外

- A.再生障碍性贫血(再障)
- B.白血病
- C.流行性出血热
- D.败血症
- E.肾肿瘤

答案: E

解析:此题暂无解析

243.(A1/A2 型题)对增生性脊柱炎描述,错误的是

- A.顽固性腰背痛,晨起更重
- B.平卧可缓解疼痛
- C.好发于 50 岁以上年龄
- D.局部常有压痛
- E.又称退行性脊柱炎

答案: D

解析:此题暂无解析

244.(A1/A2 型题)60 岁,男性患者,双侧掌指关节痛,尤以晨间加重,有僵硬感,活动受限,最可能的疾病是

- A.类风湿关节炎

- B.骨关节炎
- C.软组织炎
- D.退行性关节炎
- E.痛风

答案: A

解析:此题暂无解析

245.(A1/A2 型题)女性患者,62 岁。夜间看电视时出现头痛,随后恶心.呕吐胃内容物,呕吐呈喷射样,最可能的诊断为

- A.幽门梗阻
- B.胃潴留
- C.霍乱
- D.脑出血
- E.急性心肌梗死

答案: D

解析:头痛是脑出血的首发症状,常常位于出血一侧的头部;有颅内压力增高时,疼痛可以发展到整个头部。大约一半的脑出血患者发生呕吐,呈喷射样,可能与脑出血时颅内压增高.眩晕发作.脑膜受到血液刺激有关。

246.(A1/A2 型题)头面部阵发性电击样或撕裂样疼痛多见于

- A.脑供血不足
- B.三叉神经痛
- C.偏头痛
- D.肌紧张性头痛
- E.高血压病

答案: B

解析:此题暂无解析

247.(A1/A2 型题)强烈提示有脑膜炎存在的表现是头痛伴有

- A.眩晕
- B.发热
- C.精神症状
- D.Kernig 征阳性
- E.癫痫样发作

答案: D

解析:头痛伴剧烈呕吐者提示颅内压增高。头痛伴眩晕者见于小脑肿瘤、椎一基底动脉供血不足。头痛伴发热者常见于全身性感染性疾病。慢性进行性头痛伴精神症状者应注

意颅内肿瘤。头痛伴脑膜刺激征如 Kernig 征阳性者提示有脑膜炎或网膜下腔出血。头痛伴癫痫样发作常见于脑血管畸形、脑瘤、颅内寄生虫病。故本题应选 D。

248.(A1/A2 型题)下列关于头痛部位的叙述正确的是

- A.偏头痛多在双侧
- B.鼻源性头痛多为深在性头痛
- C.颅内深部病变的头痛部位一定与病变部位一致
- D.高血压引起的头痛多在枕部
- E.丛集性头痛多在一侧

答案: E

解析: 此题暂无解析

249.(A1/A2 型题)关于抽搐的概念,下列哪项是错误的

- A.抽搐是指四肢、躯干及颜面骨骼肌非自主强直与阵挛性抽搐,并引起关节运动
- B.抽搐表现为全身性、对称性、伴有或不伴有意识丧失
- C.癫痫大发作与惊厥的概念相同
- D.癫痫小发作也称惊厥
- E.惊厥的发生机制,可能是大脑运动神经元的异常放电所致

答案: D

解析: 当肌群收缩表现为强直性和阵挛性时,称为惊厥。惊厥表现的抽搐一般为全身性、对称性、伴有或不伴有意识丧失。癫痫大发作即惊厥, D 错误, 故选 D。

250.(A1/A2 型题)患者自幼开始左耳反复流脓。听力下降,检查见外耳道有臭味,鼓膜松弛部穿孔及肉芽组织,瘘管征阳性。近 1 周眩晕,视物旋转伴恶心、呕吐。其最可能的诊断是

- A.前庭神经炎
- B.梅尼埃病
- C.中枢性眩晕
- D.慢性中耳炎并发迷路炎
- E.位置性眩晕

答案: D

解析: 此题暂无解析

251.(A1/A2 型题)耳性眩晕不见于以下哪项疾病

- A.听神经瘤
- B.前庭神经元炎
- C.梅尼埃病
- D.迷路炎
- E.耳毒性药物中毒

答案: A

解析: 周围性眩晕(耳性眩晕)是指内耳前庭至前庭神经颅外段之间的病变所引起的眩晕,梅尼埃病、迷路炎、前庭神经元炎、耳毒性药物中毒等均可引起周围性眩晕。

252.(A1/A2 型题)梅尼埃病引起的眩晕特点是

- A.发作多短暂,很少超过 2 周
- B.无复发性
- C.多由中耳炎并发
- D.不伴眼球震颤
- E.不伴恶心、呕吐

答案: A

解析: 梅尼埃病以发作性眩晕伴耳鸣、听力减退及眼球震颤为主要特点,严重时可有恶心、呕吐、面色苍白和出汗,发作多短暂,很少超过 2 周。具有复发性特点。故选 A。

253.(A1/A2 型题)晕动病的特点是

- A.多由中耳炎并发
- B.常伴恶心、呕吐
- C.多在发热后突然出现
- D.常有口周及四肢发麻
- E.持续时间长,可达 6 周

答案: B

解析: 晕动病见于晕船、晕车等,常伴恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗等。二。

254.(A1/A2 型题)晕厥伴呼吸深而快、手足发麻、抽搐者,最可能为

- A.心源性晕厥
- B.脑源性晕厥
- C.通气过度综合征
- D.颈动脉窦综合征
- E.高原晕厥

答案：C

解析：通气过度综合征是由于情绪紧张或癔症发作时，呼吸急促、通气过度，二氧化碳排出增加，导致呼吸性碱中毒。脑部毛细血管收缩、脑缺氧，表现为头晕、乏力、颜面四肢针刺感，并因可伴有血钙降低而发生手足搐搦。故选 C。

255.(A1/A2 型题)患者服敌敌畏经抢救 1 周后无自主运动，呼之不应，瞳孔对光反射存在，压迫眶上神经出现痛苦表情，此情况属

- A.嗜睡
- B.昏睡
- C.浅昏迷
- D.深昏迷
- E.意识模糊

答案：C

解析：浅昏迷患者表现为意识丧失，高声喊叫不能唤醒，对强烈的疼痛刺激，如压眶上缘可有痛苦表情及躲避反射。可有较少的无意识自发动作。腹壁反射消失，但角膜反射、瞳孔对光反射、咳嗽反射、吞咽反射、腱反射存在，生命体征无明显改变；深昏迷是指患者表现眼球固定，瞳孔散大，角膜反射、瞳孔对光反射、咳嗽反射和吞咽反射等均消失。四肢呈弛缓性瘫，腱反射消失，病理反射也消失。呼吸、循环和体温调节功能发生障碍。根据此患者表现考虑浅昏迷，所以选 C

256.(A1/A2 型题)意识障碍伴瞳孔散大可见于

- A.颠茄类中毒
- B.吗啡类中毒
- C.巴比妥类中毒
- D.有机磷农药中毒
- E.毒蕈类中毒

答案：A

解析：意识障碍伴瞳孔散大可见于颠茄类、酒精、氰化物等中毒以及癫痫、低血糖状态等。意识障碍伴瞳孔缩小可见于吗啡类、巴比妥类、有机磷杀虫剂等中毒。故选 A。

257.(A1/A2 型题)患者处于浅昏迷时，可出现

- A.随意运动丧失
- B.浅、深反射均消失
- C.全身肌肉松弛
- D.呼吸不规则
- E.对任何刺激无反应

答案：A

解析：此题暂无解析

258.(A1/A2 型题)男，68 岁。反复咳嗽，咳痰 15 年，加重伴发热 3 天。吸烟史 40 年，1 包/天。查体：T38.8℃，口唇发绀。桶状胸，双肺可闻及哮鸣音和湿??音。血 WBC10.3×10<sup>9</sup>/L，N0.85。该患者最可能的诊断是

- A.支气管肺癌
- B.肺血栓栓塞
- C.慢性阻塞性肺疾病
- D.支气管扩张
- E.支气管哮喘

答案：C

解析：此题暂无解析

259.(A1/A2 型题)慢性支气管炎发展为阻塞性肺气肿时，主要症状为

- A.反复感染
- B.反复发热
- C.剧烈咳嗽
- D.咳大量脓痰
- E.逐渐加重的呼吸困难

答案：E

解析：慢性阻塞性肺气肿的典型症状就是逐渐加重的呼吸困难，早期在劳累时出现，逐渐加重，以致在日常活动甚至休息时也感到气短。故本题选 E。

260.(A1/A2 型题)不属于阻塞性肺气肿的体征是

- A.桶状胸
- B.触觉语颤增强
- C.肺泡呼吸音降低，呼气明显延长
- D.叩诊呈过清音，心浊音界缩小或不易叩出
- E.肺下界和肝浊音界下降

答案：B

解析：阻塞性肺气肿的体征为视诊见胸廓前后径增大、桶状胸，触诊时触觉语颤减弱而不

是增强，故选 B。叩诊肺部过清音，心脏浊音界缩小，肺下界和肝浊音界下降。听诊两肺呼吸音减弱，呼气相延长，部分患者闻及干??音或湿??音。故不选 A.C.D.E。

261.(A1/A2 型题)阵发性房颤的治疗原则是

- A.预防复发，发作时控制室率
- B.抗凝治疗，发作时控制室率
- C.抗凝治疗，发作时转复窦律
- D.转复窦律，发作时控制室率
- E.预防复发，发作时转复窦律

答案：A

解析：慢性房颤可分为阵发性、持续性与永久性三类。阵发性房颤常能自行终止急性发作时治疗的目标是减慢快速的心室率。

262.(A1/A2 型题)房颤最常见于下面哪种心血管疾病

- A.心肌病
- B.高血压性心脏病
- C.心包炎
- D.风湿性心脏病二尖瓣狭窄
- E.急性心肌梗死

答案：D

解析：心房颤动最常见于风湿性心脏病患者。

263.(A1/A2 型题)心电图示：提前发生的 P 波，形态与窦性 P 波略不同，PR 间期 0.14 秒，QRS 波群形态和时限正常。该心律失常最可能是

- A.房性期前收缩
- B.阵发性室性心动过速
- C.心房颤动
- D.室性期前收缩
- E.阵发性室上性心动过速

答案：A

解析：心电图示提前发生的 P 波，QRS 波群形态和时限正常，应诊断为房性期前收缩。

264.(A1/A2 型题)男性，40 岁。陈旧性心肌梗死 3 年，高血压病史 4 年，体检：BP150/95mmHg，心率 90 次/分，降压治疗宜首选

- A.  $\alpha$  受体阻滞剂

- B.  $\beta$  受体阻滞剂

- C.利尿剂

- D.二氢吡啶类钙通道阻滞剂

- E.神经节阻断剂

答案：B

解析：心肌梗死后的患者，可选择无内在拟交感作用的  $\beta$  受体阻滞剂或 ACEI。有临床试验证明  $\beta$  受体阻滞剂能显著降低心梗后高血压患者的再梗.卒中.冠脉搭桥.截肢及死亡的发生危险。故选 B。

265.(A1/A2 型题)胃溃疡最少见的并发症是

- A.癌变
- B.呕血
- C.幽门梗阻
- D.穿孔
- E.黑便

答案：A

解析：此题暂无解析

266.(A1/A2 型题)消化性溃疡穿孔的早期临床表现中不包括

- A.寒战.高热
- B.恶心.呕吐
- C.有局限性压痛和反跳痛
- D.腹肌紧张
- E.肠鸣音减弱或消失

答案：A

解析：消化性溃疡穿孔早期主要是胃肠道的症状：突然发生的剧烈腹痛，呈刀割样，从上腹部开始，很快扩散到全腹；与原有的症状不同，使患者非常清楚地记得此次发病的明确时间；常伴有恶心.呕吐。体格检查：患者腹肌紧张，呈“板状腹”，全腹有压痛和反跳痛，肠鸣音消失，肝浊音界缩小或消失。全身症状主要是脉率增快.多汗.烦躁，出现寒战高热的概率比较小。

267.(A1/A2 型题)通过抑制  $H^{+}K^{+}ATP$  酶而用于治疗消化性溃疡的药物是

- A.异丙嗪
- B.肾上腺皮质激素
- C.雷尼替丁
- D.奥美拉唑

E. 苯海拉明

答案: D

解析: 奥美拉唑属质子泵抑制剂, 是最强的一种抑酸剂, 通过抑制  $H^+ - K^+ATP$  酶而用于治疗消化性溃疡。奥美拉唑对胃酸分泌的抑制作用非常强, 作用时间也长, 服用一次药物后胃酸分泌量明显下降, 最高可下降 80%, 作用时间长达 48 小时。故选 D。

268.(A1/A2 型题)关于消化性溃疡的临床症状不正确的是

- A. 胃溃疡多为餐后痛
- B. 十二指肠溃疡多为空腹和夜间痛
- C. 消化性溃疡病人均有上腹痛
- D. 十二指肠溃疡易发展为穿透性溃疡
- E. 球后溃疡易发生大出血

答案: C

解析: 此题暂无解析

269.(A1/A2 型题)消化性溃疡患者的疼痛节律改变或消失, 常提示患者其可能的原因是

- A. 晨起
- B. 饮酒过度
- C. 夜晚
- D. 癌变
- E. 过度劳累

答案: D

解析: ABCE 均加重疼痛, 如果疼痛失去了上述规律性, 变为不定时发作, 或成为持续性隐痛, 或疼痛性质与以往相比发生了明显的改变, 则应警惕为癌变的先兆。故本题选 D。

270.(A1/A2 型题)上腹部疼痛.寒战.高热和黄疸, 最常见于

- A. 胆总管结石合并感染
- B. 急性胆囊炎
- C. 胆道蛔虫症
- D. 胆总管囊肿
- E. 先天性胆道闭锁

答案: A

解析: 若胆管结石阻塞胆管并继发胆管炎, 则会出现典型的三联征 (Charcot), 即腹痛.寒战.高热和黄疸。

271.(A1/A2 型题)女, 54 岁。有胆囊结石病史 8 年。上腹剧痛 2 天, 向腰部放射, 伴恶心.呕吐, 血淀粉酶升高 2 倍。以下最有价值的检查是

- A. 腹部平片
- B. 上消化道钡餐
- C. 心电图
- D. 腹部 CT
- E. 胃镜

答案: D

解析: 患者胆囊结石病史 8 年, 上腹剧痛 2 天, 向腰部放射, 伴恶心.呕吐, 血淀粉酶升高, 考虑急性胰腺炎, 最有价值的检查?腹部 CT。CT 根据胰腺组织的影像改变进行分级, 对急性胰腺炎的诊断和鉴别诊断.评估其严重程度, 尤其是对鉴别轻症和重症胰腺炎具有重要价值。轻症可见胰腺非特异性增大和增厚, 胰腺边缘不规则; 重症可见胰腺周围区消失; 网膜脂肪和网膜囊变性, 密度增加; 胸腹膜腔积液。增强 CT 是诊断胰腺坏死的最佳检查方法。

272.(A1/A2 型题)前列腺增生发生排尿困难的程度主要决定于

- A. 前列腺的大小
- B. 患者年龄
- C. 增生的部位
- D. 是否癌变
- E. 是否钙化

答案: C

解析: 此题暂无解析

273.(A1/A2 型题)患者, 男, 45 岁, 左腰部隐痛 1 个月多。体检:肾区有叩击痛; 尿常规检查可见镜下血尿, B 超:左肾内有一结石, 大小为  $1.2cm \times 1.4cm$ , IVP 示肾功能正常, 双侧输尿管通畅。目前最适宜的治疗是

- A. 多饮水.运动排石
- B. 体外震波碎石
- C. 肾实质切开取石
- D. 经皮肾镜取石或碎石
- E. 中药排石

答案: B

解析：此题暂无解析

274.(A1/A2 型题)10 岁男孩，一年来时有尿频、尿急、尿痛和排尿困难。尿流中断，改变体位后又能继续排尿，首先应考虑

- A.急性膀胱炎
- B.前列腺炎
- C.尿道狭窄
- D.膀胱结石
- E.输尿管结石

答案：D

解析：患者小儿，膀胱刺激征、排尿困难、尿流中断一年，改变体位后又能继续排尿，首先考虑诊断膀胱结石。急性膀胱炎通常不会出现排尿困难、尿流中断；前列腺炎儿童少见；尿道狭窄引起的排尿困难不会因改变体位后又能继续排尿；输尿管结石少见膀胱刺激征，通常不会引起排尿困难。故选 D。

275.(A1/A2 型题)患儿，4 个月。不活泼，食欲差，面色苍白。血红蛋白 80g/L，红细胞计数  $3 \times 10^{12}/L$ ，考虑为

- A.地中海贫血
- B.再生障碍性贫血
- C.维生素 B6 缺乏性贫血
- D.营养性缺铁性贫血
- E.营养性巨幼细胞贫血

答案：D

解析：该患儿血红蛋白 80g/L，红细胞计数  $3 \times 10^{12}/L$ ，属于中度贫血，而其又有不活泼、食欲差和面色苍白的表现，为营养性缺铁性贫血，选项 D 正确。营养性巨幼细胞贫血常有虚胖，毛发纤细、稀疏、发黄，皮肤蜡黄，睑结膜、口唇、指甲等处苍白，肝、脾大，精神神经症状和消化系统症状，选项 E 不正确。过关点睛：缺铁性贫血表现为烦躁不安或精神不振，不爱活动，食欲减退，皮肤黏膜变得苍白。

276.(A1/A2 型题)在缺铁性贫血的相应化验中唯一数值增高的指标是

- A.胆红素
- B.总铁结合力
- C.血红蛋白

D.铁

E.蛋白质

答案：B

解析：缺铁性贫血的铁代谢生化检查表明血清铁减少、转铁蛋白饱和度下降、血清铁蛋白减少、总铁结合力增高。血红蛋白量一定是减少的。故本题选择 B 项。

277.(A1/A2 型题)铁剂治疗缺铁性贫血最早出现的指标是

- A.血清铁蛋白升高
- B.血红蛋白升高
- C.红细胞升高
- D.网织红细胞升高
- E.骨髓细胞外铁升高

答案：D

解析：缺铁性贫血口服铁剂有效的表现：①服铁剂 2~3 天后外周血网织红细胞增多，高峰在开始服药后 5~10 天；②2 周后血红蛋白浓度上升，一般 2 个月左右恢复正常；③血红蛋白恢复正常后，铁剂治疗应至少持续 4~6 个月，待铁蛋白（贮存铁）正常后停药。注意目前临床上常用的、最早出现的指标为细胞内含铁酶，在补给铁剂 12~24 小时后，细胞内含铁酶开始恢复，烦躁等精神症状减轻，食欲增加。但本题选项中没给出含铁酶一选项，故选 D。

278.(A1/A2 型题)缺铁性贫血患者应用铁剂治疗有效的最早期指标是

- A.血清铁蛋白上升
- B.血红蛋白上升
- C.网织红细胞上升
- D.血清铁上升
- E.红细胞总数上升

答案：C

解析：此题暂无解析

279.(A1/A2 型题)对可疑糖尿病患者最有诊断价值的诊断检查是

- A.尿糖定性试验
- B.尿糖定量测定
- C.空腹血糖测定
- D.口服葡萄糖耐量试验

## E.胰岛细胞抗体测定

答案: D

解析: 尿糖定性试验.定量测定.空腹血糖测定,因影响因素较多且不敏感,可作为糖尿病的筛查方法。但是确诊需要做口服葡萄糖耐量试验。胰岛细胞抗体测定,主要是针对自身免疫标记物的测定。故本题选 D。

280.(A1/A2 型题)用口服葡萄糖耐量试验诊断糖尿病标准,其 2h 血糖应

A. ?R11.1mmol/L

B. ?R12.1mmol/L

C. ?R10.1mmol/L

D. ?R7.8mmol/L

E. ?R7.0mmol/L

答案: A

解析: 糖尿病诊断标准:糖尿病症状加随机血糖?R11.1mmol/L 或空腹血糖?R7.0mmol/L 或 75 克葡萄糖负荷后 2 小时血糖?R11.1mmol/L。故本题答案为 A。

281.(A1/A2 型题)延缓肠道碳水化合物吸收的药物是

A. 罗格列酮

B. 比格列酮

C. 阿卡波糖

D. 格列齐特

E. 二甲双胍

答案: C

解析: 降糖药中,磺脲类机制为刺激胰岛 $\beta$ 细胞分泌胰岛素,主要有格列齐特等。双胍类机制为增敏剂,主要有二甲双胍等。噻唑烷二酮类为胰岛素增敏剂,主要有罗格列酮、吡格列酮。葡萄糖苷酶抑制剂,能竞争性抑制葡萄糖淀粉酶、蔗糖酶、麦芽糖酶和异麦芽糖酶,抑制糖类分解,延缓葡萄糖和果糖吸收,可降低餐后血糖,主要有阿卡波糖等。故 44 题答案为 D, 45 题答案为 C。

282.(A1/A2 型题)双胍类口服降糖药最严重的副作用是

A. 胃肠道反应, 口苦

B. 低血糖

C. 腹泻

D. 过敏性皮疹

E. 乳酸酸中毒

答案: E

解析: 双胍类口服降糖药常见的副作用为胃肠道反应,主要表现为口内有金属味.厌食.恶心.呕吐.腹泻等。偶尔有过敏反应,表现为皮疹。由于双胍类口服降糖药促进无氧糖酵解,产生乳酸,在肝肾功能不全.低血容量和心衰等患者,容易诱发乳酸酸中毒,是此类药物最严重的副作用。

283.(A1/A2 型题)男, 65 岁, 有高血压.糖尿病多年。1 天前发现左侧上.下肢活动受限,吐字不清,神志清楚。无明显头痛.呕吐,检查发现左侧上.下肢肌力 3 级,左半身痛觉减退。头颅 CT 未见异常,临床上考虑可能性最大的疾病是

A. 脑出血

B. 脑栓塞

C. 脑血栓形成

D. 蛛网膜下腔出血

E. 短暂性脑缺血发作

答案: C

解析: 脑出血时往往伴有头痛.呕吐,故排除 A; 患者平常无房颤等心脏疾病,故脑栓塞可能性不大,排除 B; 短暂性脑缺血发作往往症状很快恢复正常,故排除 E; 蛛网膜下腔出血往往起病急,突然出现头痛.呕吐等,故排除 D; 年龄较大,糖尿病多年,为脑血栓形成的危险因素,且单侧出现“三偏征”,无明显头痛.呕吐,为典型的脑血栓,故选 C。

284.(A1/A2 型题)男, 60 岁。发作性右侧肢体无力伴言语不利 2 天,每次持续 20 分钟后可自行缓解。既往有高血压史。最可能的诊断是

A. 部分性癫痫

B. 周期性瘫痪

C. 短暂性脑缺血发作

D. 脑血栓形成

E. 脑栓塞

答案: C

解析: 每次发作时间通常在数分钟至 30 分钟左右,症状和体征完全消失,为短暂性脑

缺血发作诊断的最重要依据。癫痫为脑内异常放电，周围性瘫痪与钾代谢异常有关，既往无高血压病史，故排除 A、B；脑血栓形成临床表现为一至数日内出现局灶性脑损害症状和体征，排除 D；脑栓塞表现急性起病，局灶性神经体征在数秒至数分钟达高峰，排除 E。故选 C。

285.(A1/A2 型题)男性患者，56 岁，有高血压病史 10 年，急起言语不清，口角歪斜，左侧肢体活动障碍 3 小时。为明确诊断，首选哪项辅助检查：

- A. 头部 CT 扫描
- B. 腰椎穿刺脑脊液检查
- C. 脑电图检查
- D. TCD 检查
- E. 脑干诱发电位

答案：A

解析：此题暂无解析

286.(A1/A2 型题)53 岁，男性，饮酒中发生言语不清，呕吐，随即昏迷。查体：血压 26/16kPa，双眼球向左共同偏视，右鼻唇沟浅。右侧肢体坠落实验阳性，对针刺无反应。诊断脑出血，其部位是

- A. 左侧基底核
- B. 右侧基底核
- C. 左脑桥
- D. 右脑桥
- E. 左顶叶

答案：A

解析：此题暂无解析

287.(A1/A2 型题)高血压脑出血最常见的诱因是

- A. 劳累
- B. 外伤
- C. 情绪激动或活动过度
- D. 感染
- E. 寒冷

答案：C

解析：此题暂无解析

288.(A1/A2 型题)以下关于艾滋病的叙述，不

正确的是

- A. 是人类免疫缺陷病毒引起的
- B. 即获得性免疫缺陷综合征
- C. 人群对本病普遍易感
- D. 是性接触传染病
- E. HIV 主要侵犯和破坏部分 B 淋巴细胞

答案：E

解析：HIV 主要侵犯和破坏部分 T 淋巴细胞，导致机体细胞免疫明显受损，最终并发严重机会性感染和肿瘤，病死率极高。

289.(A1/A2 型题)以下哪一项不属于慢性化脓性中耳炎的常见症状或体征

- A. 长期或间歇性流脓
- B. 鼓膜穿孔
- C. 耳痛
- D. 听力下降
- E. 传导性聋

答案：C

解析：此题暂无解析

290.(A1/A2 型题)男，45 岁。进行性消瘦，贫血、乏力。右下腹扪及包块，大便隐血试验阳性。最可能的诊断是

- A. 降结肠癌
- B. 结肠息肉
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 升结肠癌
- E. 慢性细菌性痢疾

答案：D

解析：右侧（升）结肠癌以全身症状，贫血，腹部肿块为主；左侧结肠癌以便秘，腹痛，便血，肠梗阻为主。

291.(A1/A2 型题)重症一氧化碳中毒患者的最有效的治疗措施是

- A. 鼻导管间断低流量吸氧
- B. 高压氧舱治疗
- C. 吸入纯氧
- D. 鼻导管持续低流量吸氧
- E. 面罩吸氧

答案：B

解析：高压氧适用于以下疾病：煤气、硫化氢、沼气等有害气体中毒；脑血栓、脑出血、

脑外伤、神经炎；脉管炎、糖尿病坏疽、难愈合的溃疡；胎儿发育不良、新生儿窒息；急性气栓征、减压病、高原病；突发性耳聋、美尼尔综合征、眩晕症。故本题答案为 B。  
过关点睛：一氧化碳中毒应用高压氧舱治疗。

292.(A1/A2 型题)对阴阳偏盛采用的治疗原则是

- A.损其有余
- B.补其不足
- C.寒者热之
- D.热者寒之
- E.调整阴阳

答案：A

解析：此题暂无解析

293.(A1/A2 型题)以下哪项不是实喘的特征

- A.发作急骤
- B.呼吸深长
- C.息粗声高
- D.呼多吸少
- E.张口抬肩

答案：D

解析：此题暂无解析

294.(A3/A4 型题)某患者夜间突发急腹症被送到某医院看急诊，初诊为急性胆囊炎。负责医生因自己年轻，怕担风险，未作任何处理，即让家属把患者送到 20 里外的中心医院就诊，延误了治疗时间，致使病人胆囊穿孔，中毒性休克。后虽经抢救保住了生命，但医药费用去 2 万多元。对当班医生的正确伦理评价是

- A.没有什么问题，不想接诊的病人就可以让他转诊
- B.没有什么问题，风险太大时首先要保护好自己
- C.没有什么问题，当时情况可以转诊
- D.错误，违反首诊负责制要求，给病人造成严重伤害
- E.错误，没有把这件事报告给院长，擅自决定转诊

答案：D

解析：此题暂无解析

295.(A3/A4 型题)张某，男，37 岁，酒后驾车，发生车祸，头部受伤，当场昏迷，被送入我院。经医护人员的全力抢救，患者一天后恢复意识，病情有所好转，能够自己进食，可以有轻微的活动，但仍不能下床，此时的医患模式应为

- A.主动——被动模式
- B.指导——合作模式
- C.共同参与模式
- D.以上均可
- E.以上均不可

答案：B

解析：此题暂无解析

296.(A3/A4 型题)患者男性，40 岁。因艾滋病.肺部感染住院治疗。患者对医生提出要求，不要将病情跟家人.单位领导讲，医生尊重患者要求，住院期间病情交待只跟患者交流。医生维护的患者权利是

- A.选择权
- B.决定权
- C.知情权
- D.隐私权
- E.回避权

答案：D

解析：此题暂无解析

297.(A3/A4 型题)男，53 岁，公司经理，吸烟 15 年，每天 2 包，体重 75kg，身高 164cm。从临床预防心血管疾病的角度讲应该检查

- A.血脂
- B.血常规
- C.心超
- D.心电图
- E.冠状动脉造影

答案：A

解析：血脂为心血管疾病的易发因素，因此需要检查血脂。

298.(A3/A4 型题)一个健康 5 岁小儿，体格生长发育正常。腕骨骨化中心的数目是

- A.3 个
- B.4 个

C.6 个

D.8 个

E.9 个

答案: C

解析: ~9 岁骨龄简易计算法:腕部骨化中心的数目约为小儿的年龄加 1。

299.(A3/A4 型题)男, 36 岁, 心悸, 怕热, 手颤, 乏力 1 年, 大便不成形, 每天 3~4 次。体重下降 11.5kg。查体:P90 次/分,

BP128/50mmHg, 皮肤潮湿, 双手细颤, 双眼突出, 甲状腺弥漫性 II 度肿大, 可闻及血管杂音, 心率 104 次/分, 律不齐, 心音强弱不等, 腹平软, 肝脾肋下未触及, 双下肢无水肿。本例心律不齐, 最可能的是

A.窦性心律不齐

B.频发室性期前收缩

C.心房颤动

D.心房扑动

E.二度房室传导阻滞

答案: C

解析: 此题暂无解析

300.(A3/A4 型题)女, 17 岁。疲乏无力.心烦易怒.怕热多汗多年。易饿, 体重下降 11kg。月经量减少, 经期仅 1~2 天。查体:P108 次/分, BP140/70mmHg, 皮肤微潮, 手有细颤, 轻微突眼, 甲状腺 I 度弥漫性肿大, 质软, 无触痛。最可能的检查结果是

A.FT3 及 FT4 升高

B.TSH 升高

C.甲状腺摄 131 I 率降低

D.继发性垂体功能降低

E.血糖升高

答案: A

解析: 此题暂无解析