

临床执业医师资格真题卷



关注山东金英杰医学，查看更多医考资料



第一单元

A1 型选择题 (1—42 题)

答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 最有助于诊断室性心动过速的心电图特点是
A. T 波和主波方向相反
B. 心室夺获
C. QRS 波群宽大畸形
D. QRS 波群呈束支传导阻滞图形
E. PR 间期延长
2. 属于支气管扩张手术治疗禁忌证的是
A. 双下肺均存在局限性支气管扩张病变
B. 合并反复感染
C. 窦性心动过缓,阿托品试验(+)
D. 合并大咯血
E. 合并肺心病
3. 提高人群肺癌筛查检出率的首选方法是
A. 痰细胞学检查
B. PET-CT
C. 低剂量 CT
D. 高分辨 CT
E. 血清肿瘤标志物
4. 急性肾小球肾炎 II 型最常见的检测异常是
A. 循环免疫复合物阳性
B. 血抗肾小球基底膜抗体阳性
C. 血清中性粒细胞胞浆抗体 (ANCA) 阳性
D. 血单克隆免疫球蛋白升高
E. 血冷球蛋白阳性
5. 使用血管紧张素转换酶抑制剂降压的患者血清肌酐水平不宜超过
A. 177 $\mu\text{mol/L}$
B. 88 $\mu\text{mol/L}$
C. 133 $\mu\text{mol/L}$
D. 221 $\mu\text{mol/L}$
E. 265 $\mu\text{mol/L}$
6. 心室颤动电除颤的正确方法是
A. 必须在心电监测下进行
B. 不能反复多次电除颤
C. 首先需静脉推注安定
D. 非同步电除颤
E. 电击能量一般 < 200J
7. 因毛细血管通透性增加而致胸腔积液的疾病是
A. 肾病综合征
B. 肝硬化
C. 类风湿性关节炎
D. 左心衰竭
E. 缩窄性心包炎
8. 肾盂结石 2.8cm, 肾功能正常, 中度肾积水, 首选的治疗方法是
A. 肾盂切开取石
B. 药物排石
C. 体外冲击波碎石
D. 多饮水密切观察
E. 经皮肾镜碎石取石
9. 支气管镜检查对下述疾病诊断意义不大的是
A. 支气管肺癌
B. 弥漫性肺泡出血
C. 结节病
D. 支气管扩张
E. 肺孢子菌肺炎
10. 以下关于尿道损伤的叙述, 不正确的是
A. 阴茎部尿道损伤多见
B. 球部损伤多见于骑跨性损伤
C. 前尿道损伤多发生于球部
D. 后尿道损伤多发生于骨盆骨折
E. 医源性尿道狭窄有增多趋势
11. 二尖瓣狭窄患者最常见的心律失常是
A. 三度房室传导阻滞
B. 窦性心动过缓
C. 心室颤动
D. 室性心动过速
E. 心房颤动
12. 造成气流受限的病因中, 最常出现肺脏弹性回缩力减弱的是
A. 弥漫性泛细支气管炎
B. 支气管扩张

- C. 慢性支气管炎
D. 慢性纤维空洞性肺结核
E. 阻塞性肺气肿
13. 下述疾病中最可能引起金黄色葡萄球菌肺脓肿的是
A. 鼻窦炎
B. 皮肤疖肿
C. 牙周脓肿
D. 食管穿孔
E. 膈下脓肿
14. 不符合室性期前收缩的心电图表现是
A. 提前出现的 QRS 波, 主波方向与 T 波相反
B. QRS 波宽大畸形
C. 代偿间歇完全
D. 联律间期恒定
E. P 波与提前出现的 QRS 波群有相关性
15. 糖尿病高渗高血糖综合征常见于
A. 2 型糖尿病合并妊娠
B. 饮食控制不佳的 2 型糖尿病
C. 青少年 2 型糖尿病
D. 1 型糖尿病
E. 老年 2 型糖尿病
16. 针对我国结核病疫情, 首先需要控制的是
A. 活动性肺结核的高患病率
B. HIV 感染增加
C. 城市人口的高感染率
D. 地区患病率差异大
E. 结核病患者的死亡率
17. 小剂量地塞米松抑制试验适用于
A. 肾上腺皮质功能减退症定性
B. 肾上腺皮质增多症定性
C. 肾上腺皮质增多症定位
D. 肾上腺皮质功能减退症定位
E. 醛固酮增多症定性
18. 腰椎间盘突出症与腰椎管狭窄症临床症状的主要鉴别点是
A. 有无鞍区感觉障碍
B. 间歇性跛行是否为主要特点
C. 双下肢无力的程度
D. 二便是否障碍
E. 腰痛及下肢放射痛的程度
19. 对于高血压合并 2 型糖尿病患者, 下列药物中有利于延缓糖尿病肾病进展的是
A. 普萘洛尔
B. 吲达帕胺
C. 缬沙坦
D. 硝苯地平
E. 氢氯噻嗪
20. 符合二尖瓣关闭不全的典型表现是
A. 右心房增大
B. S_1 增强
C. 心尖部全收缩期吹风样杂音
D. P_2 降低
E. 右心室增大
21. 肾细胞癌最常见的组织病理类型是
A. 乳头状肾细胞癌
B. 未分类肾细胞癌
C. 嫌色细胞癌
D. 集合管癌
E. 透明细胞癌
22. 关于支气管哮喘的药物治疗, 不正确的是
A. 规律联合使用吸入糖皮质激素 + 长效 β_2 受体激动剂
B. 规律使用吸入糖皮质激素
C. 规律长效 β_2 受体激动剂单独治疗
D. 按需使用短效 β_2 受体激动剂
E. 规律使用白三烯调节剂
23. 顽固性心力衰竭的最关键治疗是
A. 寻找并纠正可能的原因
B. 心脏移植
C. 静脉注射强心药
D. 静脉滴注血管扩张剂
E. 静脉注射利尿剂
24. 骨关节炎最典型的 X 线表现是
A. 关节肿胀
B. 关节周围骨质疏松
C. 关节软骨侵蚀
D. 软骨下骨软化
E. 关节间隙变窄
25. 急性肺源性心脏病最常见的病因是
A. 重症肺结核
B. 支气管哮喘
C. 肺血栓栓塞
D. 过敏性肺炎
E. 慢性阻塞性肺疾病
26. 原发性肾小球疾病的临床分类不包括
A. 慢性肾小球肾炎
B. 肾盂肾炎
C. 急进性肾小球肾炎
D. 肾病综合征
E. 无症状性血尿或(和)蛋白尿
27. 引起老年人继发性膜性肾病最常见的病因是
A. 系统性红斑狼疮
B. 恶性肿瘤
C. 系统性血管炎

- D. 过敏性紫癜
E. 乙肝病毒相关性肾小球肾炎
28. 无器质性心脏病慢性心房颤动患者静息心率的控制目标是
- A. <100 次/分
B. <80 次/分
C. <60 次/分
D. <90 次/分
E. <110 次/分
29. 下列成分可见于肾小管性蛋白尿的是
- A. 补体
B. β_2 微球蛋白
C. IgG
D. 本周蛋白
E. IgM
30. Thomsen 征阳性提示
- A. 髌髌关节炎
B. 膝关节屈曲挛缩
C. 腰椎间盘突出症
D. 髋关节屈曲挛缩
E. 腰椎管狭窄
31. 下列细胞因子中,与慢性阻塞性肺疾病慢性气道炎症发病关系最密切的是
- A. IL-4
B. IL-10
C. IL-5
D. IL-8
E. IL-13
32. 目前慢性阻塞性肺疾病治疗的最重要药物是
- A. 支气管舒张剂
B. 吸入糖皮质激素
C. 抗氧化剂
D. 祛痰药
E. 黏液生成抑制剂
33. IgA 肾病最常见的临床表现为
- A. 蛋白尿
B. 白细胞尿
C. 血尿
D. 水肿
E. 高血压
34. 主要表现为餐前(午、晚)低血糖的疾病是
- A. 腺垂体功能减退症
B. 2 型糖尿病
C. 胰岛素瘤
D. 糖原累积症
E. 肝硬化
35. 心尖部收缩中晚期喀喇音提示
- A. 二尖瓣狭窄
B. 室间隔穿孔
C. 室壁瘤形成
D. 主动脉瓣关闭不全
E. 二尖瓣脱垂
36. 主要调节甲状腺激素分泌的因素是
- A. 血 $1,25-(OH)_2$ -维生素 D_3
B. 血钙
C. 血镁
D. 降钙素
E. 血磷
37. 下述疾病最易出现 II 型呼吸衰竭的是
- A. 糖尿病酮症酸中毒
B. 慢性阻塞性肺疾病
C. 哮喘急性发作
D. 重症肺炎
E. 肺血栓栓塞
38. 肾结核多来源于
- A. 骨结核
B. 肠结核
C. 肺结核
D. 膀胱结核
E. 生殖系结核
39. 对解剖复位要求最高的骨折是
- A. 胫骨平台骨折
B. 桡骨干骨折
C. 腓骨中段骨折
D. 锁骨骨折
E. 掌骨骨折
40. 关节内骨折最常见的并发症是
- A. 骨折不愈合
B. 创伤性关节炎
C. 缺血性骨坏死
D. 骨化性肌炎
E. 骨折畸形愈合
41. 女性尿路感染最常见的感染途径是
- A. 淋巴道感染
B. 血行感染
C. 医源性感染
D. 上行感染
E. 直接感染
42. 肱骨髁上骨折最容易出现的晚期并发症是
- A. 肱动脉损伤
B. 肘内翻畸形
C. 肘关节外翻畸形
D. 尺神经损伤
E. 骨折不愈合



A2 型选择题 (43—108 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方格涂黑。

43. 男,75 岁。反复咳嗽、咳痰、喘憋 40 余年,加重伴发热 3 天。查体:R 24 次/分,BP 145/85mmHg,昏睡,颈静脉怒张,双肺散在哮鸣音,双下肺可闻及湿性啰音,心率 128 次/分,双下肢轻度凹陷性水肿。该患者目前应首先进行的检查是
- 检眼镜
 - 肝肾功能 + 电解质
 - 动脉血气分析
 - UCG
 - 头颅 CT
44. 男,68 岁。痰中带血 1 个月。无发热,抗菌药物治疗无效。慢性支气管炎病史 20 年。查体:右下肺呼吸音减弱。该患者应首先考虑的诊断是
- 支气管肺癌
 - 支气管扩张
 - 支气管哮喘
 - 肺结核
 - 肺血栓栓塞症
45. 女,67 岁。阵发性心房颤动 1 年,持续心悸 2 天,既往无高血压病史。2 小时前急诊查体:P 102 次/分,BP 110/60mmHg,心率 130 次/分,心律绝对不齐,心音强弱不等。予以普罗帕酮静脉推注后,心悸缓解离院。1 小时前因左腹痛再次就诊,无呕吐和腹泻。尿常规正常。该患者腹痛首先考虑的疾病是
- 肝淤血
 - 肾结石
 - 内脏动脉栓塞
 - 急性下壁心肌梗死
 - 主动脉夹层
46. 女,22 岁。突发右侧胸痛伴胸闷 1 小时,搬重物时突发右侧胸痛,疼痛剧烈,深呼吸时加重,伴刺激性咳嗽,继之出现胸闷,进行性加重,BP 100/65mmHg,最可能的诊断是
- 肺栓塞
 - 自发性气胸
 - 主动脉夹层
 - 肋间神经痛
 - 心肌梗死
47. 男,19 岁。初发肾病综合征,应用泼尼松 60mg/d 治疗 8 周,水肿无明显好转,复查尿蛋白仍大于 3.5g/d,肾活检提示微小病变型肾病。下一步最适宜的治疗是
- 加用人血白蛋白
 - 加用免疫抑制剂
 - 增加泼尼松剂量
 - 大剂量静脉应用免疫球蛋白
 - 加用 ACEI/ARB
48. 女,67 岁。发热、咳嗽 1 个月,胸闷 3 天。体温最高 38℃,咳少量痰,近 3 天感渐进性胸闷,卧位时更明显,曾抗感染治疗效果欠佳。查体:右下胸略膨隆,语音震颤减弱,叩诊实音,呼吸音消失,该患者首先考虑的诊断是
- 脓胸
 - 阻塞性肺炎
 - 浸润性肺结核
 - 肺炎支原体肺炎
 - 结核性胸膜炎
49. 男,38 岁。发热 2 周,胸闷 5 天。无咳嗽、咳痰、咯血,曾使用“头孢曲松”抗感染治疗无效。查体:T 37.8℃,BP 140/90mmHg,右下肺呼吸音消失,语音共振减弱。胸部 X 线片示右下肺大片状高密度增高影,上缘呈外高内低弧形,为明确诊断,应首选的检查是
- 支气管镜
 - 胸腔穿刺抽液
 - 胸部 CT
 - 血肿瘤标志物
 - 超声心动图
50. 男,24 岁。发作性呼吸困难 2 年,曾肺功能检查诊断:“支气管哮喘”,控制使用吸入糖皮质激素 + 长效受体激动剂,2 天来症状加重,连续吸入短效 β_2 受体激动剂效果欠佳。此时患者应首先采取的措施是
- 口服抗生素
 - 再次吸入糖皮质激素 + 长效 β_2 受体激动剂
 - 继续吸入短效 β_2 受体激动剂
 - 口服糖皮质激素
 - 口服氨茶碱
51. 男,50 岁。间断水肿 3 年,加重伴乏力 1 个月。3 年来反复出现颜面和双下肢水肿,未予诊治。1 个月来水肿加重,查体:BP 170/85mmHg,双下肢中度水肿,尿常规:尿 RBC(-),蛋白(++)。血 Hb 70g/L,SCr 865 μ mol/L, K^+ 6.5mmol/L, Ca^{2+}

1. 79mmol/L, 全段甲状旁腺激素(ipTH) 710pg/ml, 需要紧急处理的临床情况是
- 血 K^+ 6.5mmol/L
 - 血 Ca^{2+} 1.79mmol/L
 - 血 Hb 70g/L
 - 血 SCr 865 μ mol/L
 - 血 ipTH 710pg/ml
52. 女, 21 岁。右大腿下端肿痛 2 个月, 查体: T 36.9 $^{\circ}$ C, P 85 次/分, R 18 次/分, BP 110/60mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及杂音, 腹软, 无压痛, 未触及包块。右下腿下端肿胀、压痛。X 线检查示股骨下端有界限不清的骨质破坏区, 骨膜增生及放射状阴影, 最可能的诊断是
- 骨巨细胞瘤
 - 骨髓炎
 - 骨结核
 - 骨转移瘤
 - 骨肉瘤
53. 男, 38 岁。醉酒后出现发热, 咳嗽、咳脓臭痰 5 天, 右侧胸痛, 查体: T 39.2 $^{\circ}$ C, P 112 次/分, R 26 次/分, BP 130/80mmHg, 神志清楚, 右中肺少许湿性啰音。胸部 X 线片示右中肺团块状影。可见空洞和液平面。血 WBC 16.3 $\times 10^9$ /L, N 0.88, L 0.10。该患者最可能的诊断是
- 大叶性肺炎
 - 肺脓肿
 - 肺结核
 - 肺癌
 - 真菌性肺炎
54. 男, 50 岁。无明显诱因出现左肩, 上臂, 前臂外侧放射痛 3 个月。既往体健。查体: T 36.6 $^{\circ}$ C, P 82 次/分, BP 110/60mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 未闻及杂音, 腹软, 无压痛, 未触及包块, 肩关节活动正常, 上肢感觉及肌力均正常。Eaton 试验和 Spurling 试验阳性。首先考虑的诊断是
- 冈上肌腱炎
 - 肩峰撞击综合征
 - 肩袖损伤
 - 神经根型颈椎病
 - 粘连性肩关节囊炎
55. 男, 32 岁。反复活动时气短 3 年余, 加重伴双下肢水肿 2 周, 无发热。查体: BP 100/60mmHg, 颈静脉怒张, 双肺可闻及湿性啰音, 心界明显向两侧扩大, 心率 120 次/分, 心尖部可闻及舒张早期奔马律和 2/6 级收缩期吹风样杂音。该患者最可能的诊断是
- 心包炎
 - 扩张型心肌病
 - 肥厚型心肌病
 - 风湿性心脏瓣膜病
 - 缺血性心肌病
56. 女, 62 岁。间断咳嗽, 咳少量白黏痰 10 年。查体: 双肺呼吸音粗, 未闻及干湿性啰音。血常规正常。胸部 X 线片示肺纹理增粗紊乱, 肺功能示 FEV₁ 占预计值 83%, FEV₁/FVC = 67% (舒张后)。该患者最可能的诊断是
- 支气管哮喘
 - 特发性肺纤维化
 - 支气管肺结核
 - 慢性阻塞性肺疾病
 - 支气管扩张
57. 女, 62 岁。发现右侧乳房肿块 3 个月, 诊断为乳腺癌。发现血脂异常 3 年, 未诊治。右乳腺癌改良根治术后第 4 天, 感左小腿疼痛, 左脚不能着地踏平。查体: T 37.2 $^{\circ}$ C, P 86 次/分, BP 120/80mmHg, 伤口局部无异常渗出, 左小腿肿胀最可能的原因是
- 血栓性浅静脉炎
 - 急性动脉栓塞
 - 血栓闭塞性脉管炎
 - 大隐静脉曲张
 - 深静脉血栓形成
58. 女, 43 岁。近 1 月来发热, 乏力, 气短。有先天性心脏病史。查体: T 37.2 $^{\circ}$ C, 双肺呼吸音清, 心率 100 次/分, 心律齐, 胸骨左缘第 3 肋间可闻及响亮粗糙的收缩期杂音。实验室检查血 WBC 13.4 $\times 10^9$ /L, N 0.89, Hb 104g/L, 尿常规沉渣镜检 RBC 5 个/HP, 该患者需首先考虑的诊断是
- 急性肾小球肾炎
 - 急性心包炎
 - 风湿热
 - 感染性心内膜炎
 - 急性心肌炎
59. 男, 24 岁。右股骨中段粉碎性骨折, 手术复位时彻底清除骨折碎片, 行钢板内固定。半年后骨折仍未愈合。最可能的原因是
- 骨折碎片清除过多
 - 骨折处血液循环差
 - 骨折固定不确定
 - 未配合药物治疗
 - 功能锻炼不够
60. 男, 38 岁。心悸, 多汗, 食欲亢进 2 个月。体重下降 3kg, 大便 2 次/日, 糊状, 昨夜聚餐, 大量饮用可乐, 今晨起乏力, 下肢无法活动。查体: T 37.1 $^{\circ}$ C, P 108 次/分, R 18 次/分, BP 145/70mmHg, 双肺呼

- 吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,腹软,无压痛。双下肢肌力1级,肌张力明显减弱。实验室检查:血 K^+ 2.8mmol/L, Na^+ 140mmol/L, Glu 6.4mmol/L。下列检查对明确病因意义最大的是
- 肾上腺皮质功能
 - 甲状腺功能
 - 血儿茶酚胺
 - OGTT试验
 - 血气分析
61. 女,28岁。劳累后心悸、气短6年,加重伴咳粉红色泡沫痰1周。查体:心界扩大,心律绝对不齐,心尖部可闻及双期杂音。超声心动图示二尖瓣重度狭窄及中度关闭不全。该患者最恰当的治疗方案是
- 先抗心衰治疗,择期行二尖瓣瓣膜修补术
 - 先抗心衰治疗,择期行二尖瓣置换术
 - 立即行二尖瓣球囊扩张术
 - 抗心衰治疗后口服药物治疗,随访
 - 立即行二尖瓣置换术
62. 男,59岁。发现右侧阴囊内肿物5年,逐渐增大。肿物呈球形,表面光滑,有囊性感,无压痛,触不到睾丸和附睾。透光试验阳性。B超示液性暗区,平卧后肿物无消失或缩小。最可能的诊断是
- 腹股沟斜疝
 - 附睾炎
 - 精索囊肿
 - 睾丸鞘膜积液
 - 睾丸肿瘤
63. 男,59岁。头痛、头晕1周,感恶心,未呕吐。既往有支气管哮喘、痛风病史。查体:BP 160/80mmHg,心率55次/分,心律齐。该患者宜首选的降压药物是
- 氨氯地平
 - 卡维地洛
 - 维拉帕米
 - 美托洛尔
 - 氢氯噻嗪
64. 男,59岁。反复胸痛3天,劳累时发作。休息15分钟或含服硝酸甘油1分钟后可缓解,每天发作3~5次。既往糖尿病史10年。不适宜立即进行的检查是
- 动态心电图
 - 静息心电图
 - 冠状动脉造影
 - 心电图负荷试验
 - 超声心动图
65. 男,50岁。胸部不适2个月,无咳嗽、发热。胸部CT示右前上纵隔肿物,直径约3cm,边缘光滑,上极清晰。首先考虑的诊断是
- 胸腺瘤
 - 胸骨后甲状腺
 - 支气管囊肿
 - 食管囊肿
 - 神经纤维瘤
66. 女,62岁。膀胱炎病史多年,近期反复出现肉眼血尿。膀胱镜检查可见膀胱左侧乳头状肿瘤,大小1.5cm×1cm,有蒂,活组织病理检查为尿路上皮癌1级。最适宜的治疗措施是
- 放疗
 - 膀胱全切除术
 - 经尿道膀胱肿瘤电切术
 - 开放保留膀胱手术
 - 膀胱内药物灌注治疗
67. 女,34岁。突发右下胸痛,少量咯血2天,已婚,自然流产2次。查体:T 37.5℃,P 85次/分,右下肺叩诊呈浊音,呼吸音减弱,右下肢轻度肿胀。血常规:WBC $8.8 \times 10^9/L$,Hb 124g/L,PLT $64 \times 10^9/L$ 。胸部X线片示右侧少量胸腔积液。该患者最可能的诊断是
- 肺结核
 - 肺炎旁胸腔积液
 - 肺血管炎
 - 肺血栓栓塞症
 - 支气管肺癌
68. 男,24岁。间断咳嗽2天。伴阵发性胸闷,无痰,无发热、胸痛。查体:右下肺呼吸音稍低,未闻及干湿性啰音,为明确诊断,首选的检查是
- 血D-二聚体
 - 胸部B超
 - 胸部X线片
 - 肺功能
 - 动脉血气分析
69. 男,24岁。在工厂流水线工作时,电锯切割致左手示指离断。对断指的正确保存方法是用无菌纱布包好放置在
- 干燥冷藏容器中
 - 酒精中
 - 福尔马林溶液中
 - 生理盐水中
 - 冰箱冷冻室中
70. 男,38岁。反复发作肉眼血尿8年,均在上呼吸道感染后1~2天出现。发作间期多次查尿常规示蛋白(+~++),沉渣镜检RBC 8~10个/HP,双下肢无水肿。尿蛋白定量0.8g/d,肾功能正常。该患者临床诊断为
- 高血压肾损害

- B. 无症状性血尿和蛋白尿
 C. 慢性间质性肾炎
 D. 慢性肾小球肾炎
 E. 肾病综合征
71. 男, 24 岁。因体检发现心律不齐 1 周就诊。平素无心悸和头晕, 既往体健。查体: BP 110/60mmHg, 心界不大, 心律不齐, 可闻及早搏 2 次/分。心电图室性期前收缩。超声心动图提示心结构正常。该患者最适宜的处理措施是
 A. 继续随访, 暂不予药物治疗
 B. 口服 I C 类抗心律失常药物
 C. 口服 β 受体拮抗剂
 D. 口服 I B 类抗心律失常药物
 E. 口服 III 类抗心律失常药物
72. 女, 67 岁, 行冠脉介入治疗过程中突发心悸, 气短。查体: BP 80/70mmHg, 口唇无发绀, 颈静脉怒张, 心率 90 次/分, 心律齐, 心音低钝, 奇脉, 已停止冠脉介入治疗, 还应立即采取的治疗措施
 A. 皮下注射低分子肝素
 B. 静脉注射西地兰
 C. 心包穿刺抽液
 D. 呼吸机辅助呼吸
 E. 静脉滴注去甲肾上腺素
73. 女, 62 岁, 尿频, 尿急、尿痛 1 天, 尿中可见血丝, 伴排尿时下腹痛, 无发热, 不宜采取的检查方法是
 A. 尿菌落计数
 B. 尿细菌培养 + 药物敏感试验
 C. 静脉尿路造影
 D. 膀胱镜检查
 E. 尿常规检查
74. 男, 59 岁。发现血糖升高, 既往体健。查体: T 36.5°C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg, BMI 29kg/m², 腹型肥胖, 75g 葡萄糖耐量试验结果如下: 糖化血红蛋白 7.9%, ALT 86U/L, AST 34U/L, SCr 101 μ mol/L。腹部超声提示中度脂肪肝。患者首选的降糖药物是
 A. 阿卡波糖
 B. 那格列奈
 C. 胰岛素
 D. 二甲双胍
 E. 罗格列酮
75. 男, 38 岁。肱骨干骨折行手法复位, 夹板外固定治疗, 既往体健, 8 个月后复查 X 线片示骨折线存在, 断端有 0.3cm 间隙, 断端骨髓腔已封闭硬化, 此时应选择的治疗是
 A. 中医中药治疗
 B. 改为牵引固定
 C. 继续夹板固定
 D. 手术植骨并内固定
 E. 改为石膏外固定
76. 女, 67 岁。劳力性呼吸困难 4 年, 加重 2 天。4 年前开始出现活动后呼吸困难, 休息状态下症状消失, 2 天前呼吸困难加重后夜间不能平卧, 高血压病史 20 年。查体: BP 160/100mmHg, 端坐呼吸, 双肺底可闻及湿啰音, 心率 102 次/分, P₂ 亢进, 可闻及 S₃ 奔马律, 该患者不宜立即使用的药物是
 A. 呋塞米
 B. 硝酸甘油
 C. 硝普钠
 D. 吗啡
 E. 美托洛尔
77. 男, 59 岁。突发持续性胸痛 3 小时, 黑矇 1 次, 高血压病史 5 年, 间断服用降压药物。查体: BP 85/50mmHg, 心率 35 次/分, 心律齐, 心电图示 II、III、aVF 导联, ST 段抬高 0.3mV, 三度房室传导阻滞。在置入临时起搏器以前, 提高该患者心率的药物治疗措施是
 A. 肾上腺静脉注射
 B. 多巴酚丁胺静脉滴注
 C. 阿托品静脉注射
 D. 去甲肾上腺素静脉滴注
 E. 异丙肾上腺素静脉滴注
78. 女, 67 岁。因“急性广泛前壁心肌梗死”于 4 天前入院治疗。今日患者突然喘憋, 不能平卧, 查体: BP 120/80mmHg, 心率 107 次/分, 胸骨左缘第 3 肋间可触及震颤并可闻及粗糙的 4/6 级全收缩期杂音。该患者突发喘憋的最可能病因是
 A. 乳头肌功能不全
 B. 室壁瘤形成
 C. 心室游离壁破裂
 D. 室间隔穿孔
 E. 主动脉瓣狭窄
79. 女, 67 岁。5 年来出现进行性乏力、纳差, 逐渐加重, 且不能耐受饥饿。既往有肺结核病史, 查体: BP 90/60mmHg, 肤色黑, 掌纹处明显, 双肺呼吸音清, 心率 90 次/分, 腹软, 无明显压痛。该患者的最可能诊断是
 A. 肝硬化
 B. 肺结核
 C. Addison 病
 D. 黑棘皮病
 E. Nelson 综合征
80. 男, 32 岁。活动后心悸、胸痛、喘息 2 月余。其兄 24 岁时猝死。查体: P 78 次/分, BP 105/75mmHg, 双肺呼吸音清, 胸骨左缘第 4 肋间可闻及 3/6 级收缩期喷射样杂音。胸部 X 线片示心脏外形大致

正常。该患者最可能的诊断是

- A. 风湿性心脏瓣膜病
B. 房间隔缺损
C. 肥厚型心肌病
D. 限制型心肌病
E. 冠心病
81. 女, 28岁。咳嗽、流涕2周, 心悸2天, 无发热及疼痛。既往体健。查体: BP 100/60mmHg, 心界不大, 心率108次/分, 可闻及早搏4次/分, 心尖部可闻及2/6级收缩期杂音, 柔和, 未闻及心包摩擦音。实验室检查: 血肌钙蛋白I升高。心电图示房性期前收缩。该患者最可能的诊断是
- A. 病毒性心肌炎
B. 扩张型心肌病
C. 感染性心内膜炎
D. 风湿性心脏瓣膜病
E. 急性心包炎
82. 男, 59岁。外伤致右腕部疼痛、肿胀1小时。既往体健, 无糖尿病病史。查体: T 36.8℃, P 70次/分, R 18次/分, BP 100/60mmHg, 心肺腹未见异常, 右腕部疼痛、肿胀、活动受限。X线片检查: 桡骨下端骨皮质不连续, 对位对线良好, 并有嵌插。最恰当的治疗措施是
- A. 皮牵引
B. 中药活血化瘀
C. 切开复位内固定
D. 骨牵引
E. 手法复位外固定
83. 男, 59岁。活动后气短半年, 夜间憋醒1周。既往陈旧性心肌梗死3年。查体: 血压110/80mmHg, 双下肺可闻及少许湿性啰音, 心率98次/分, 心律齐。最有助于明确该患者气短原因的检查是
- A. 超声心动图
B. 胸部X线片
C. 动脉血气分析
D. 肺功能
E. 血常规
84. 女, 54岁。手指活动时时有弹响, 最有可能的诊断是
- A. 痛风
B. 风湿热
C. 狭窄性腱鞘炎
D. 骨关节炎
E. 类风湿性关节炎
85. 男, 38岁。突发呼吸困难伴短暂意识丧失, 无咳嗽、咳痰及咯血, 既往体健。查体: BP 85/65mmHg, 呼吸急促, 口唇发绀, 双肺可闻及少量哮鸣音, 心率110次/分, P₂亢进。心电图示窦性心动过速, 对明确诊断意义最大的检查是
- A. CT肺动脉造影
B. 动脉血气分析
C. 胸部X线片
D. 血心肌坏死标记物
E. 血D-二聚体
86. 男, 19岁。反复镜下血尿2年。无水肿、高血压。尿沉渣镜检红细胞10~20HP, 变形红细胞为主, 尿蛋白阴性, 血肌酐70μmol/L。临床应诊断为
- A. 无症状性血尿
B. IgA肾病
C. 慢性肾小球肾炎
D. 泌尿系统肿瘤
E. 急性肾小球肾炎
87. 男, 38岁。3个月前搬重物后出现腰痛伴右下肢麻木疼痛, 诊断为腰椎间盘突出症, 经保守治疗后症状缓解, 症状逐渐加重。2小时前出现大小便障碍, 查体: T 36.6℃, P 89次/分, BP 110/60mmHg, 心肺腹未见异常, 右下肢肌力4级, 感觉减退, 会阴部感觉减退, 目前首选的治疗方法是
- A. 理疗按摩
B. 激素注射
C. 牵引治疗
D. 急诊手术
E. 卧床休息
88. 男, 59岁。吞咽困难半年余, 进行性加重, 现只能进流食, 并出现胸痛及咳嗽。该患者食管X线钡剂造影检查不可能出现的影像是
- A. 食管造影时气道内出现造影剂
B. 食管下段呈鸟嘴状改变, 边缘光滑
C. 局部食管腔扩张
D. 部分食管腔明显狭窄
E. 食管管壁僵硬, 蠕动中断
89. 男, 59岁。排尿困难2年。2年来排尿困难逐渐加重, 表视为尿线变细, 尿滴沥。夜尿3~4次。无尿痛及肉眼血尿, 直肠指检及B超诊断为前列腺增生, 确定排尿梗阻程度的有效检查方法是
- A. 尿流率检查
B. 膀胱镜
C. 残余尿测定
D. CT
E. MRI
90. 男, 19岁。发热、咳嗽伴左胸痛5天, 既往体健, 查体: T 39.5℃, 左下肺叩诊呈浊音, 可闻及支气管呼吸音。该患者最可能感染的病原体是
- A. 结核分枝杆菌
B. 肺炎链球菌
C. 金黄色葡萄球菌
D. 肺炎支原体



- E. 铜绿假单胞菌
91. 男,68 岁。慢性咳嗽咳痰 5 年,近 1 年来自觉长距离行走时感气短,休息后可好转。否认呼吸系统疾病及心脏病史。查体未见明显异常。血常规及胸部 X 线片检查大致正常。为明确诊断应首先进行的检查是
- A. UCG
B. D-二聚体
C. 动脉血气分析
D. 胸部 CT
E. 肺功能
92. 女,28 岁。进行性背痛半年,下肢乏力,食欲减退。查体: T 37.8℃, P 90 次/分, R 18 次/分, BP 100/60mmHg, 未见皮疹,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,未闻及杂音,腹软,无肌紧张,移动性浊音阴性,胸椎后凸,有叩痛。X 线片示:第 6、7 胸椎间隙变窄,椎旁软组织阴影增宽。实验室检查,血常规: Hb 118g/L、WBC $7.0 \times 10^9/L$, L 0.40, Plt $112 \times 10^9/L$, ESR 60mm/h。最可能的诊断是
- A. 胸椎结核
B. 胸椎转移癌
C. 化脓性脊椎炎
D. 胸椎间盘突出症
E. 胸椎血管瘤
93. 女,28 岁。低热、干咳 2 周。胸部 X 线片示右侧中等量胸腔积液。胸腔积液检查示有核细胞总数 $1460 \times 10^6/L$, 单核细胞 0.85。给予四联抗结核药物治疗。下列对防止该患者出现胸膜肥厚最重要的措施是
- A. 胸腔内注射糖皮质激素
B. 胸腔内注射抗结核药物
C. 口服糖皮质激素
D. 胸腔内注射尿激酶
E. 反复胸腔穿刺抽取胸腔积液
94. 女,28 岁。恶心、呕吐 1 天,诊断为急性胃炎。查体: BP 120/80mmHg, 心率 55 次/分。心电图示窦性心动过缓。该患者心动过缓的最恰当处理措施是
- A. 植入临时起搏器
B. 口服阿托品
C. 植入永久起搏器
D. 静脉滴注异丙肾上腺素
E. 治疗胃炎,继续观察
95. 女,28 岁,间断发热、刺激性咳嗽 3 周。查体: T 37.5℃, 右上肺可闻及哮鸣音。血常规正常, ESR 45mm/L。自服“头孢菌素”及“阿奇霉素”治疗无效,胸部 X 线片示上肺纹理增粗、紊乱。痰涂片抗酸染色可疑阳性,对明确诊断最有意义的处理措施是
- A. 支气管镜检查
B. 诊断性抗结核治疗
C. 痰分枝杆菌培养
D. 胸部 CT 检查
E. 肺功能检查
96. 男,38 岁。健康体检胸部 X 线片发现右肺上叶后段直径约 2cm 高密度结节影,边界欠清楚。查体: T 36.5℃, P 72 次/分。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音。为明确诊断应首选的检查是
- A. PET-CT
B. 肺相关肿瘤标志物
C. 支气管镜
D. 胸部 CT
E. 肺功能
97. 女,34 岁,右前臂骨折 2 小时,予手法复位,管型石膏固定 5 小时后,患者感觉右手指麻木,肿胀,活动不灵。查体: 生命体征平稳,心肺腹未见异常,目前最恰当的处理方法是
- A. 脱水
B. 立即手术
C. 止痛
D. 立即松解外固定
E. 扩血管药物治疗
98. 女,62 岁。发热,咳嗽,咳脓痰 3 天,支气管扩张病史 20 年,近年来曾因感染反复住院治疗,频繁使用广谱抗生素,查体: T38.5℃, 左下肺可闻及湿性啰音,心率 90 次/分,心律齐,患者感染的病原体最可能是
- A. 肺炎支原体
B. 肺炎链球菌
C. 铜绿假单胞菌
D. 肺炎克雷伯杆菌
E. 金黄色葡萄球菌
99. 女,43 岁。近 2 周来发热,乏力,痰中带血,最高体温 38℃,经“头孢菌素”抗感染治疗 1 周无效。查体: T37.8℃, P84 次/分,左上肺语颤减弱,呼吸音低,实验室检查血常规, WBC $7.8 \times 10^9/L$, N 0.73, L 0.24。ESR 43mm/h,胸部 X 线片示左上肺斑片状阴影,其内可见透亮区,该患者最可能的诊断是
- A. 肺癌
B. 肺结核
C. 肺脓肿
D. 支气管扩张
E. 肺炎
100. 男,38 岁,口干,多饮,多尿 3 个月。查体: 双唇肥厚,下颌前突,咬合困难,手脚粗大肥厚,实验室

检查,空腹血糖 7.2mmol/L, TG 3.0mmol/L,尿比重 1.020,最可能的诊断是

- A. 糖尿病
- B. 尿崩症
- C. 甲状腺功能减退症
- D. 高甘油三酯血症
- E. 肢端肥大症

101. 女,67岁。双下肢水肿1个月,既往高血压病史15年,未规范用药治疗,查体:BP 160/100mmHg,双下肢轻度凹陷性水肿,实验室检查:血肌酐 97 μ mol/L,血钾 3.4mmol/L,尿蛋白。应首选的降压药物是

- A. 钙通道阻滞剂
- B. α 受体拮抗剂
- C. 噻嗪类利尿剂
- D. 血管紧张素转换酶抑制剂
- E. β 受体拮抗剂

102. 女,34岁,停经,溢乳3个月,查体:T36.5 $^{\circ}$ C, P80次/分, R 18次/分, BP 120/80mmHg,乳房挤压有少量乳白色液体未触及肿块,余体格检查未见异常,该患者最可能的诊断是

- A. 多囊卵巢综合征
- B. 颅咽管瘤
- C. 垂体柄损伤
- D. 早期妊娠
- E. 泌乳素瘤

103. 男,50岁。车祸致下腹部受伤2小时。查体:T 36.8 $^{\circ}$ C, P 90次/分, R 20次/分, BP 140/70mmHg,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心律齐,未闻及杂音,下腹膨隆,有压痛,腹肌紧张,移动性浊音阴性,耻骨联合处压痛,骨盆分离挤压试验阳性,予导尿,导尿管插入后仍未引出尿液,导尿管尖端见血迹,最可能的原因是

- A. 导尿管阻塞
- B. 导尿管插入方法不对
- C. 骨盆骨折并膀胱损伤
- D. 导尿管插入深度不足
- E. 骨盆骨折合并尿道断裂

104. 女,34岁。全程肉眼血尿1天,无血丝,血块,无尿频、尿急、尿痛,无发热及腰腹疼痛,尿沉渣镜检 RBC 满视野, WBC 4~5/HP,尿蛋白(++). 首先应进行的检查是

- A. 膀胱镜检查
- B. 清洁中断尿培养
- C. 静脉肾盂造影
- D. 尿相差显微镜检查

E. 同位素肾动脉扫描

105. 男,68岁。近2年反复出现发作性心悸,伴头晕、黑蒙,查体:BP 135/65mmHg,心率52次/分,心律齐,心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音,动态心电图:窦性心律为主,平均心率56次/分, R-R长间歇35次,最长4.2秒伴房室交界逸搏,房性期前收缩,短阵房性心动过速,一度房室传导阻滞。最能提示该患者为病态窦房结综合征诊断的动态心电图表现是

- A. 一度房室传导阻滞
- B. R-R长间歇35次,最长4.2秒伴房室交界逸搏
- C. 窦性心律为主,平均心率56次/分
- D. 房性期前收缩
- E. 短阵房性心动过速

106. 男,38岁,右上指刀割伤3小时,查体:T 36.9 $^{\circ}$ C, P 102次/分, BP 120/70mmHg,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,未闻及杂音,腹软,无压痛,右手小指及环指的小指半侧感觉明显减退,手指内收障碍,损伤的神经是

- A. 肌皮神经
- B. 正中神经
- C. 尺神经
- D. 腋神经
- E. 桡神经

107. 女,67岁。间断咳嗽、咳痰15年,心悸、气短伴双下肢水肿3天。心电图示胸前导联重度顺时针向转位, V₁导联呈Rs型, V_s R/S < 1, RV₁ + SV₅ = 1.5mV。该患者最可能的诊断是

- A. 心包积液
- B. 扩张型心肌病
- C. 风湿性心脏瓣膜病
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. 冠心病,心肌梗死

108. 男,50岁。水肿2周,少尿伴血压升高1周。3周前曾有皮肤感染史。尿常规:尿蛋白(+),沉渣镜检 RBC 20~30/HP,血肌酐 140 μ mol/L,尿素 11 μ mol,血 C₃降低,肾穿刺提示为毛细血管内增生性肾小球肾炎。通常该患者 C₃恢复正常的的时间约为

- A. 半年
- B. 1年
- C. 8周
- D. 3个月
- E. 2周



A3/A4 型选择题 (109—136 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息,在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(109—111 题共用题干)

女,48 岁。近 1 个月来出现口渴。每日饮水量约 2000ml。身高 156cm,体重 70kg。患者空腹血糖 12.0mmol/L,餐后血糖 14.8mmol/L。过去无糖尿病病史。

109. 给患者的治疗措施

- A. 饮食 + 运动
- B. 磺脲类降血糖药
- C. α -葡萄糖苷酶抑制剂
- D. 双胍类降血糖药
- E. 使用胰岛素

110. 【假设信息】治疗 3 个月后,空腹血糖 5.5mmol/L,餐后血糖 17.5mmol/L。治疗改为

- A. 使用胰岛素
- B. 格列齐特
- C. 阿卡波糖
- D. 那格列奈
- E. 二甲双胍

111. 【假设信息】4 年后该患者被发现有浸润性肺结核,降血糖治疗宜选用

- A. 增加原降血糖药剂量
- B. 改用降血糖作用更强的口服降血糖药
- C. 增加一种口服降血糖药
- D. 使用胰岛素
- E. 联合使用双胍类、磺脲类、 α -葡萄糖苷酶抑制剂

(112—113 题共用题干)

女,42 岁。咳嗽,痰中带血伴右胸痛 6 个月,既往体健,吸烟 30 年,30 支/天。查体:T 36.5℃,右侧肺部可闻及湿性啰音,实验室检查血 WBC $8 \times 10^9/L$,胸部 CT 如下。



112. 初步诊断首先考虑

- A. 后纵隔肿瘤
- B. 浸润型肺结核
- C. 支气管扩张
- D. 大叶性肺炎

E. 中央型肺癌

113. 为进一步明确诊断,首选的检查是

- A. 纤维支气管镜
- B. 胸腔镜
- C. PET-CT
- D. 纵隔镜
- E. 磁共振

(114—117 题共用题干)

男,19 岁。咽痛、发热伴咳嗽 2 周,眼睑水肿伴肉眼血尿 3 天。查体:BP 150/100mmHg,全身皮肤无皮疹。实验室检查:尿蛋白(++),尿红细胞 30~40/HP,管型 3~5/LP,血 C3 降低,SCr 126 μ mol/L。

114. 该患者最可能的诊断为

- A. 急进性肾小球肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 急性肾盂肾炎

115. 该患者最可能出现的管型是

- A. 上皮细胞管型
- B. 透明管型
- C. 红细胞管型
- D. 白细胞管型
- E. 蜡样管型

116. 该患者治疗应不包括

- A. 糖皮质激素
- B. 利尿
- C. 控制血压
- D. 休息
- E. 抗生素

117. 【假设信息】若患者 4 天后出现尿量进行性减少,肌酐进行性升高,应首先考虑进行的检查是

- A. 同位素肾动态显像
- B. 肾穿刺活检
- C. 泌尿系统 B 超
- D. 清洁中段尿培养 + 药敏
- E. 静脉肾盂造影

(118—119 题共用题干)

男,50 岁。车祸 2 小时急诊入院,经抢救后生命体征平稳,神志清醒。现出现下腹部疼痛,不能排尿 4 小时。查体:下腹部叩诊呈浊音,直肠指检可触及直

肠前方饱满,前列腺尖端浮动感。X线摄片显示骨盆骨折(耻骨下肢断裂)。

118. 最可能的诊断是

- A. 肾损伤
- B. 前尿道损伤
- C. 输尿管损伤
- D. 后尿道损伤
- E. 膀胱破裂

119. 后期需要补充的最重要的检查是

- A. B超
- B. 尿道造影
- C. CT
- D. 膀胱造影
- E. 静脉尿路造影

(120—121 题共用题干)

男,24岁。阵发性心悸3年,突发突止,每次持续0.5~3小时不等,无头晕和黑蒙,发作时查体:BP 120/70mmHg,心率180次/分,心律齐。心电图示:心率180次/分,QRS波形正常。

120. 该患者最可能的诊断是

- A. 室性期前收缩
- B. 阵发性室性心动过速
- C. 窦性心动过速
- D. 心房颤动
- E. 阵发性室上性心动过速

121. 该患者心悸发作时,下列可首选的治疗是

- A. 口服 β 受体拮抗剂
- B. 静脉注射西地兰
- C. 静脉注射腺苷
- D. 口服地高辛
- E. 静脉注射利多卡因

(122—124 题共用题干)

男,7岁。突发寒战,高热,右膝下方剧痛3天。查体:T 39.8℃,P 86次/分,R 25次/分,BP 110/60mmHg。烦躁不安,右膝关节呈半屈曲状,拒动,右小腿近端皮温高,肿胀不明显,压痛阳性。

122. 最可能的诊断是

- A. 风湿性关节炎
- B. 急性血源性骨髓炎
- C. 膝关节结核
- D. 类风湿性关节炎
- E. 化脓性关节炎

123. 早期确诊最可靠的是

- A. 血常规
- B. 局部分层穿刺
- C. CT
- D. X线
- E. 体格检查

124. 诊断明确后首选的处理措施

- A. 足量抗生素
- B. 物理降温
- C. 支持治疗
- D. 手术
- E. 肢体制动

(125—127 题共用题干)

女,21岁。1型糖尿病8年,平素4次(R-R-R-N)胰岛素皮下注射治疗,定期查糖化血红蛋白7.5%~8%,2日前患者受凉后发热,体温37.5~38℃,因食欲不佳,自行停用胰岛素,改用阿卡波糖治疗。渐出现恶心、食欲不振,呕吐少量胃内容物,尿中有异味。查体:P 102次/分,BP 90/60mmHg,体重55kg,轻度脱水貌,精神萎靡,实验室检查:随机血糖25.6mmol/L,血钾4.8mmol/L,血钠144mmol/L,尿糖(++++) ,尿酮体(+++) ;动脉血气分析pH值7.25。

125. 该患者目前最佳胰岛素治疗方案是

- A. 速效胰岛素类似物持续静脉滴注,起始量11IU/小时
- B. 长效胰岛素类似物持续静脉滴注,起始量5.5IU/小时
- C. 常规人胰岛素持续静脉滴注,起始量11IU/小时
- D. 恢复4次胰岛素注射治疗,并适当增加剂量
- E. 常规人胰岛素持续静脉滴注,起始量5.5IU/小时

126. 该患者pH值降低,合理的治疗是

- A. 静脉滴注0.9%生理盐水
- B. 静脉注射5%碳酸氢钠,至血pH值正常
- C. 静脉滴注1.25%碳酸氢钠,至血pH值正常
- D. 静脉滴注1.25%碳酸氢钠,至尿酮体转阴
- E. 静脉滴注5%碳酸氢钠至尿酮体转阴

127. 患者入院后尿量约50ml/h,复查血钾4.0mmol/L,关于补钾治疗应采取

- A. 每2小时测定血钾,低于3.5mmol/L开始补钾
- B. 开始口服补钾
- C. 开始静脉补钾
- D. 两次检测血钾均正常,不需要补钾
- E. 观察尿量如果有进一步的增加,则补钾

(128—130 题共用题干)

男,50岁。持续胸痛8小时。喘憋2小时入院。既往无高血压病史。查体:BP 150/70mmHg,端坐位,双肺可闻及少许细湿啰音,心界不大,心率110次/分,率齐, $P_2 > A_2$ 。心电图示I、aVL、 $V_1 \sim V_6$ 导联ST段抬高0.1~0.4mV。可见病理性Q波。

128. 该患者最可能的诊断是

- A. 高血压急症

- B. 肥厚型心肌病
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性心肌炎
- E. 急性心包炎

129. 该患者的心功能分级为

- A. NYHA 分级Ⅳ级
- B. Killip 分级Ⅲ级
- C. NYHA 分级Ⅲ级
- D. Killip 分级Ⅱ级
- E. Killip 分级Ⅰ级

130. 该患者应慎用的药物治疗为

- A. 皮下注射吗啡
- B. 静脉注射毛花苷丙
- C. 口服阿司匹林
- D. 静脉注射硝酸甘油
- E. 静脉注射呋塞米

(131—132 题共用题干)

男,32岁。支气管哮喘20年。喘息加重1周。意识恍惚1天来急诊。查体:T 37.5℃,P 94/分。面色暗红,口唇发绀。可见胸腹矛盾运动,双肺呼吸音低,可闻及低调哮鸣音。

131. 该患者此时最可能出现的动脉血气变化

- A. PaO₂ 降低、PaCO₂ 降低、pH 升高
- B. PaO₂ 降低、PaCO₂ 升高、pH 降低
- C. PaO₂ 降低、PaCO₂ 升高、pH 升高
- D. PaO₂ 降低、PaCO₂ 升高、pH 正常
- E. PaO₂ 降低、PaCO₂ 正常、pH 降低

132. 该患者首选的治疗措施是

- A. 大剂量糖皮质激素静脉滴注
- B. 气管插管、机械通气
- C. β₂ 受体激动剂雾化吸入
- D. 面罩吸氧
- E. 无创通气

(133—134 题共用题干)

男,75岁。排尿困难3年,加重2周。直肠指检发现前列腺结节,质地硬。血清PSA 30ng/ml。

133. 为明确诊断,最重要的检查是

- A. 前列腺穿刺活检
- B. 前列腺 MRI
- C. 膀胱尿道镜检查
- D. 前列腺增强 CT
- E. 经直肠前列腺超声

134. 下列检查对患者病情评价意义不大的是

- A. 前列腺 MRI
- B. 泌尿系 B 超
- C. 放射性核素骨显像
- D. X 线胸片
- E. 膀胱尿道造影

(135—136 题共用题干)

男,40岁。痰中带血1个月,乏力、头晕1周。实验室检查:血钠 114mmol/L,补钠治疗效果欠佳。胸部 X 线片检查发现右肺门状影 4cm×4cm。纤维支气管镜检查示右主支气管黏膜粗糙水肿,管腔狭窄,黏膜活检可见肿瘤细胞。

135. 最可能的病理类型是

- A. 大细胞癌
- B. 腺癌
- C. 类癌
- D. 小细胞癌
- E. 鳞癌

136. 对该患者首选的治疗方法是

- A. 免疫治疗
- B. 放疗
- C. 手术治疗
- D. 靶向药物治疗
- E. 化疗

B1 型选择题 (137—150 题)

答 题 说 明

以下提供若干组试题,每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(137—138 题共用备选答案)

- A. 膀胱结石
- B. 急性膀胱炎
- C. 膀胱肿瘤
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 泌尿系结核

137. 男,32岁。慢性膀胱刺激症状伴终末血尿,应首先考虑

138. 男,40岁。慢性膀胱刺激症状,伴排尿困难及尿流中断,改变体位后可继续排尿,应首先考虑

(139—140 题共用备选答案)

- A. 经蝶手术

- B. 开颅手术
- C. 长效奥曲肽
- D. 放疗
- E. 溴隐亭

139. 巨大生长激素瘤首选的治疗方法是

140. 泌乳素瘤应首选的治疗方法

(141—142 题共用备选答案)

- A. 心室率不规整
- B. 出现 f 波
- C. PR 间期逐渐延长, QRS 波周期性脱落
- D. 刺激迷走神经后心室率明显加快伴心律不齐
- E. 出现 F 波

141. 提示二度 I 型房室传导阻滞的心电图表现是

142. 提示心房扑动的心电图是

(143—144 题共用备选答案)

- A. 肺炎链球菌
- B. 病毒
- C. 肺炎克雷伯杆菌
- D. 肺炎支原体
- E. 金黄色葡萄球菌

143. 男, 24 岁。急性起病, 高热伴右胸痛, 胸部 X 线片示右肺下叶实变影, 其内可见多发气囊。其感染的病原体最可能是

144. 男, 68 岁。急性起病, 高热伴呼吸衰竭。胸部 X 线示双肺弥漫磨玻璃影。其感染的病原体最可能是

(145—146 其共用备选答案)

- A. 膝关节脱位

- B. 髋关节脱位
- C. 肘关节脱位
- D. 肩关节脱位
- E. 腕关节脱位

145. Hippocrates 法治疗的是

146. Allis 法治疗的是

(147—148 题共用备选答案)

- A. 美托洛尔
- B. 卡托普利
- C. 哌唑嗪
- D. 硝苯地平
- E. 氢氯噻嗪

147. 最易引起低钾血症的降压药是

148. 最易引起干咳的降压药是

(149—150 题共用备选答案)

- A. 急性间质性肾炎
- B. 急性肾小管坏死
- C. 肾后性急性肾衰竭
- D. 急进性小球肾炎
- E. 肾前性氮质血症

149. 男, 32 岁。误服生鱼胆后恶心、呕吐、腹痛, 腹泻伴少尿, 尿比重 1.009, 尿钠 45mmol/L, SCr 225 μ mol/L, BUN 8.97 μ mol/L。少尿最主要的原因是

150. 男, 59 岁。慢性充血性心力衰竭患者, 上呼吸道感染后喘憋加重, 尿量减少, 尿比重 1.020, 尿钠 18.6mmol/L, SCr 256 μ mol/L, 少尿最主要的原因是



第二单元

A1 型选择题 (1—74 题)

答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 环境污染物危险度评价中的暴露评价可以估计出
 - A. 某化学物在环境介质中的浓度
 - B. 某化学物对机体产生危害的程度
 - C. 某化学物是否对机体产生危害
 - D. 危险物特征
 - E. 人群对某化学物暴露的强度、频率和持续时间
2. 我国卫生事业的性质是
 - A. 政府实行福利政策的事业
 - B. 政府通过购买形式为人民提供服务的事业
 - C. 政府许可的营利性事业
 - D. 政府实行一定福利政策的社会公益事业
 - E. 政府实行的社会公益事业
3. 诊断羊水栓塞的主要病理依据是
 - A. 肺泡腔内透明膜形成
 - B. 肺泡腔内有胎粪小体
 - C. 肺泡腔内广泛出血
 - D. 肺血管内有角化上皮
 - E. 微循环内透明血栓
4. 地塞米松的临床应用不包括
 - A. 风湿性心肌炎
 - B. 感染中毒性休克
 - C. 过敏性紫癜
 - D. 骨质疏松
 - E. 系统性红斑狼疮
5. 下列属于正氮平衡的情况是
 - A. 创伤
 - B. 饥饿
 - C. 妊娠
 - D. 出血
 - E. 贫血
6. 肠道病毒一般不引起的疾病是
 - A. 尿道炎
 - B. 手足口病
 - C. 脊髓灰质炎
 - D. 无菌性脑炎
 - E. 心肌炎
7. 《医疗机构从业人员行为规范》提出的医疗机构从业人员执业的价值目标是
 - A. 为人民健康服务
 - B. 发扬人道主义精神
 - C. 树立大医精诚理念
 - D. 以患者为中心
 - E. 救死扶伤、防病治病
8. 依据《精神卫生法》,给予吊销精神科医师执业证书处罚的情形是
 - A. 未及时对有伤害自身危险的患者进行检查评估的
 - B. 精神障碍患者对再次诊断结论有异议的
 - C. 故意将非精神障碍患者诊断为精神障碍患者的
 - D. 对实施住院治疗的患者未根据评估结果作出处理的
 - E. 拒绝对送诊的疑似精神障碍患者作出诊断的
9. 观察某种新研制甲肝疫苗的预防效果,研究对象最好选择
 - A. 甲肝高发区无免疫人群
 - B. 医院中非肝病区患者
 - C. 甲肝低发区无免疫人群
 - D. 医院中血制品接触者
 - E. 近期曾有甲肝暴发地区的人群
10. 反映均数抽样误差大小的指标是
 - A. 变异系数
 - B. 标准误
 - C. 均数
 - D. 标准差
 - E. 全距
11. 对感染性腹泻进行监测应选择的疾病频率测量指标是
 - A. 期间患病率
 - B. 现患率
 - C. 罹患率
 - D. 发病率
 - E. 病残率

12. 主要由自身反应性 T 细胞介导的自身免疫性疾病是
- 链球菌感染后肾小球肾炎
 - 系统性红斑狼疮
 - 肺出血-肾炎综合征
 - 血小板减少性紫癜
 - 多发性硬化
13. 某地区成年人的首位死因是心脏病,下列各项措施中不属于该地区优先防治策略的是
- 通过媒体倡导居民增加身体活动
 - 在社区人群中开展减少心脏病危险因素的咨询
 - 加强公共场所与工作场所的控烟
 - 大力发展心脏专科医院,为患者提供心脏介入治疗
 - 以高胆固醇血症和家族史为指标
14. 属于影响行为的倾向因素的是
- 态度
 - 资源
 - 政策
 - 法律
 - 奖励
15. 甘油三酯合成的基本原料是
- 甘油
 - 胆固醇酯
 - 胆碱
 - 鞘氨醇
 - 胆固醇
16. 呈对数正态分布的数值变量资料,描述集中趋势的指标最好选用
- 几何均数
 - 众数
 - 算术均数
 - 调和均数
 - 中位数
17. 下列不参与肝生物转化第二相反应的酶是
- 硫酸基转移酶
 - 谷胱甘肽-S-转移酶
 - 胺基转移酶
 - 葡萄糖醛酸基转移酶
 - 甲基转移酶
18. 肺换气的驱动力是
- 呼吸膜两侧气体分压梯度
 - 呼吸膜气体交换面积
 - 呼吸膜通透性
 - 气体分子与血红蛋白亲和力
 - 气体分子溶解度
19. 符合良性高血压血管病变的是
- 小动脉外膜纤维增生
 - 小动脉玻璃样变性
 - 细动脉胶原纤维增生
 - 细动脉平滑肌增生
 - 细动脉玻璃样变性
20. 某人做事总是风风火火,速度很快,脾气暴躁,缺乏耐心,而且时不时会出些错误。其气质类型属于
- 胆汁质
 - 多血质
 - 黏液质
 - 多动质
 - 抑郁质
21. 有权对收受药物经营企业财务的医务人员做出没收违法所得的处罚的单位是
- 卫生计生行政部门
 - 公安机关
 - 食品药品监督管理部门
 - 医师协会
 - 工商行政管理部门
22. 医疗机构临床用血管理的第一责任人是
- 临床用血的医师
 - 医疗机构输血科主任
 - 临床用血所在科室的负责人
 - 临床用血医师的上级医师
 - 医疗机构法定代表人
23. 医疗保险制度的资金来源主要是
- 个人、保险公司、政府
 - 个人、集体、国家
 - 职工、雇主、保险公司
 - 职工、雇主、保险公司
 - 个人、单位、保险公司
24. 下列食物未煮熟时易导致食物中毒的是
- 赤豆
 - 豌豆
 - 荷兰豆
 - 绿豆
 - 四季豆
25. 有关 DNA 碱基组成规律的叙述,错误的是
- 适用于不同种属
 - 嘌呤与嘧啶分子相等
 - 与遗传特性有关
 - 主要有腺嘌呤组成
 - 不受年龄与营养状态影响
26. 可以引起菌血症的细菌是
- 肉毒梭菌
 - 霍乱弧菌

- C. 白喉棒状杆菌
D. 破伤风梭菌
E. 伤寒沙门菌
27. 健康促进的核心策略包括
A. 保护环境
B. 职业卫生
C. 社会动员
D. 疾病控制
E. 学校卫生
28. 肿瘤相关抗原通常不能诱导有效抗肿瘤免疫的原因是
A. 无诱导抗体产生能力
B. 表达量低
C. 多为自身抗原
D. MHC II 分子表达低
E. 多为 T1 抗原
29. 在突触传递过程中, 触发神经末梢递质释放的关键因素是
A. 末梢内囊泡数量增加
B. Ca^{2+} 进入末梢内
C. 末梢膜发生超极化
D. 末梢膜上 K^{+} 通道激活
E. 末梢内线粒体数量增加
30. 慢性肾盂肾炎大体描述正确的是
A. 肾弥漫性颗粒状
B. 肾肿大、苍白
C. 肾表面散在出血点
D. 肾不对称性缩小
E. 肾弥漫性肿大
31. 多肽链中肽键的本质是
A. 磷酸二酯键
B. 二硫键
C. 糖苷键
D. 酰胺键
E. 疏水键
32. 关于 DNA 变性概念叙述, 错误的是
A. 变性后 260nm 波长吸收不改变
B. 变性时两条链解离
C. 变性时二级结构被破坏
D. 变性不伴有共价键断裂
E. 加热可导致变性
33. 免疫缺陷患者不可接种的疫苗是
A. 灭活脊髓灰质炎疫苗
B. 流行性出血热疫苗
C. 麻疹活疫苗
D. 多糖疫苗
E. 重组乙型肝炎疫苗
34. 治疗变异型心绞痛的药物是
A. 多巴胺
B. 肾上腺素
C. 维拉帕米
D. 麻黄碱
E. 普萘洛尔
35. 流行病学研究的观察法与实验法的根本区别在于
A. 盲法
B. 是否有人为干预
C. 统计学检验
D. 设立对照组
E. 不设立对照组
36. “无论是致病、治疗, 还是预防和康复都应将人视为一个整体, 需要考虑各方面因素的交互作用, 而不能机械地将他们分割开”。此观点所反映的医学模式是
A. 自然哲学的医学模式
B. 生物 - 心理 - 社会医学模式
C. 神灵主义的医学模式
D. 机械论医学模式
E. 生物医学模式
37. 关于青少年情绪、情感的特点, 以下说法不正确的是
A. 情绪敏感
B. 情绪反应强烈
C. 情绪心境化
D. 情感丰富
E. 情绪稳定
38. 选定暴露和未暴露于某种因素的两种人群, 追踪其各自的发病结局, 比较两者发病结局的差异, 从而判断暴露因素与发病有无因果关联及关联程度, 该研究为
A. 病例对照研究
B. 现场干预试验
C. 队列研究
D. 临床试验研究
E. 现况研究
39. 磷酸戊糖途径的主要产物之一是
A. NADPH
B. FMN
C. CoQ
D. cAMP
E. ATP
40. 血浆蛋白浓度降低所致水肿的原因是
A. 血浆胶体渗透压降低
B. 动脉血压升高
C. 毛细血管壁通透性增加

- D. 淋巴回流量减少
E. 组织液静水压升高
41. 医疗机构使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作应给予罚款处罚,其最高金额是
A. 5千元
B. 8千元
C. 2千元
D. 1万元
E. 3千元
42. 医务人员必须经过省级卫生计生行政部门考核并取得相应合格证书方可从事的母婴保健服务项目是
A. 结扎手术
B. 家庭接生
C. 产前诊断
D. 婚前医学检查
E. 终止妊娠手术
43. 与 CO_2 呼出量关系最密切的肺功能指标是
A. 肺通气量
B. 肺活量
C. 肺泡通气量
D. 最大通气量
E. 用力呼气量
44. 属于乳腺癌特殊类型的是
A. 浸润性导管癌
B. 导管原位癌
C. 浸润性小叶癌
D. 小管癌
E. 小叶原位癌
45. 依据《侵权责任法》,医务人员实施手术前应当向患者说明的事项是
A. 医疗纠纷处理方式
B. 隐私保密要求
C. 替代医疗方案
D. 承担赔偿责任的情形
E. 复印病例资料范围
46. 有关同工酶概念的叙述,错误的是
A. 同工酶常由几个亚基组成
B. 不同器官的同工酶谱不同
C. 同工酶的理化性质不同
D. 同工酶催化不同的底物反应
E. 同工酶的免疫学性质不同
47. 不参与 ADCC 作用的免疫分子是
A. 补体
B. Fc 受体
C. 免疫球蛋白
D. 颗粒酶
E. 穿孔素
48. 不会出现肉芽肿性病变的疾病是
A. 结节病
B. 细菌性痢疾
C. 结核病
D. 血吸虫病
E. 伤寒
49. 有助于患者记忆的信息沟通方式不包括
A. 规范使用医学缩略术语
B. 指导问题力求具体
C. 重要医嘱首先提出
D. 语言表达通俗易懂
E. 归纳总结医嘱内容
50. 相对于一般契约关系而言,医生在医患关系负有更重的义务,但这些义务中不包括
A. 监督义务
B. 保密义务
C. 披露义务
D. 注意义务
E. 忠实义务
51. 关于经济因素对健康的影响,不正确的说法是
A. 经济因素对健康的影响是多方面的
B. 单纯注重经济增长将危害人类的健康
C. 人群收入的绝对水平决定着经济对健康的影响程度
D. 经济的发展应与社会发展及促进人类健康水平同步
E. 人群的健康水平影响经济的发展
52. 符合早期胃癌诊断条件的是
A. 肿瘤仅限于胃窦
B. 癌未累及肌层
C. 肿瘤直径小于 0.5cm
D. 黏膜皱襞消失
E. 肿瘤直径小于 1cm
53. α -酮酸可转变生成的物质是
A. CO_2 和 H_2O
B. 营养必须脂肪酸
C. 维生素 A
D. 营养必需氨基酸
E. 维生素 E
54. 用酒精给高热患者擦浴的散热方式是
A. 蒸发散热
B. 辐射散热
C. 不感蒸发散热
D. 传导散热
E. 对流散热

55. 负责向社会发布突发公共卫生事件信息的法定单位是
- A. 县级人民政府
 - B. 省级人民政府
 - C. 国务院卫生计生行政部门
 - D. 国务院新闻办公室
 - E. 设区的市级人民政府
56. 琥珀酸氧化呼吸链不含有的组分是
- A. FMN
 - B. CoQ
 - C. Cyt c
 - D. Cyt b
 - E. Cyt C₁
57. 属于医务人员自我道德评价方式的是
- A. 慎独
 - B. 内心信念
 - C. 传统习俗
 - D. 名誉
 - E. 社会舆论
58. 抗菌药物的细菌耐药率超过一定的百分比时, 慎重经验用药, 该百分比是
- A. 50%
 - B. 20%
 - C. 10%
 - D. 40%
 - E. 30%
59. 临床预防服务的主要内容不包括
- A. 化学预防
 - B. 筛查
 - C. 健康咨询
 - D. 免疫接种
 - E. 药物治疗
60. 帕金森病患者可出现症状是
- A. 静止性震颤
 - B. 意向性震颤
 - C. 运动共济失调
 - D. 骨骼肌张力降低
 - E. 皮肤感觉迟钝
61. 目前我国提倡的活体供体器官获取的方式是
- A. 自由买卖
 - B. 推定同意
 - C. 自愿捐献
 - D. 家属决定
 - E. 医生强制
62. 医生在诊疗过程中经常对患者使用医学专业术语, 使患者难以理解, 容易造成误解。这种医患交流的问题属于
- A. 回忆不良
 - B. 沟通障碍
 - C. 信息缺乏
 - D. 同情不够
 - E. 依从性差
63. 医患关系的实质是
- A. 具有经济性质的商业关系
 - B. 具有契约性质的信托关系
 - C. 具有法律性质的契约关系
 - D. 具有市场性质的交换关系
 - E. 具有宗教性质的文化关系
64. 免疫标记降钙素阳性的甲状腺肿瘤是
- A. 梭形细胞癌
 - B. 滤泡腺癌
 - C. 髓样癌
 - D. 巨细胞癌
 - E. 乳头状癌
65. 即可通过水平传播, 也可通过垂直传播的疾病是
- A. 麻疹
 - B. 流行性感胃
 - C. 流行性脑脊髓膜炎
 - D. 甲型肝炎
 - E. 乙型肝炎
66. 吗啡和哌替啶的共同作用不包括
- A. 体位性低血压
 - B. 止泻
 - C. 抑制呼吸
 - D. 镇痛
 - E. 成瘾性
67. 某心理治疗师婉拒了一位正在接受其治疗的患者请其吃饭的邀请。该心理治疗师的这一行为所遵循的心理治疗原则是
- A. 保密原则
 - B. 关系限定原则
 - C. 真诚原则
 - D. 客观中立原则
 - E. 回避原则
68. 计算患病率的分子是
- A. 观察期间某病的暴露人口数
 - B. 观察期间某病的新旧病例数
 - C. 观察期间某病的新发病例数
 - D. 观察开始之前某病的患病人数
 - E. 观察期间所有人口数
69. II型超敏反应导致的疾病是
- A. 青霉素过敏性休克
 - B. 新生儿溶血病
 - C. 接触性皮炎



- D. 食物过敏性腹泻
E. 花粉过敏性哮喘
70. 关于流行病学, 下列说法正确的是
- 从个体的角度研究疾病和健康状况分布及其影响因素
 - 侧重研究传染病的流行特征和防治措施
 - 研究人群中疾病和健康状况的分布及其影响因素
 - 只研究疾病的防治措施
 - 侧重研究慢性病的危险因素
71. 在继发性主动转运过程中, 驱动小管液葡萄糖进入肾小管上皮细胞的直接动力是
- 膜内外两侧的电位差
 - 钠泵活动造成的膜两侧 Na^+ 浓度差
 - 泵蛋白水解 ATP 释放的能量
 - 由同向转入细胞的物质提供能量
 - 同向转运体水解 ATP 释放的能量
72. 适用于“主动-被动型”医患关系模式的患者群体中一般不包括

- 昏迷患者
- 婴幼儿患者
- 焦虑症患者
- 痴呆患者
- 精神分裂症缺乏自知力患者

73. 结核分枝杆菌敏感的理化因素是

- 碱
- 酸
- 紫外线
- 干燥
- 寒冷

74. 对疑似甲类传染病患者予以隔离所体现的公共卫生伦理原则是

- 社会公益原则
- 互助协同原则
- 信息公开原则
- 社会公正原则
- 全社会参与原则

A2 型选择题 (75—116 题)

答题说明

每一道考题下面是一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

75. 男, 17 岁。水肿 1 周, 辅助检查: 尿蛋白 (+ + +), 尿沉渣镜检: 红细胞 0~1/HP, 24 小时尿蛋白定量 7.6g, 血肌酐 $76\mu\text{mol/L}$, 肾穿刺提示微小病变型肾病。其主要发病机制为
- 补体 C3 异常
 - 免疫复合物沉积
 - T 细胞功能紊乱
 - 肾小球微血栓形成
 - 抗基底膜抗体形成
76. 一名 45 岁的男性, 由于患肺结核病而就诊, 经问诊得知他已经吸烟 20 年, 每天吸一包烟。他表示考虑在未来一个月内戒烟, 作为一名临床医生, 你要做的是
- 强调戒烟的好处
 - 和病人一起确定戒烟日
 - 提供戒烟药物
 - 随访
 - 告知吸烟的危害
77. 炎热夏季的某一天, 气压很低, 强烈阳光照射着交通繁忙的城市, 一些居民突然出现了不同程度的眼睛红肿、流泪、咽痛、喘息、咳嗽、呼吸困难、头

痛、胸闷等症状, 导致出现这些症状可能的原因

- CO 急性中毒
- 煤烟型烟雾
- 光化学烟雾
- 附近火山喷发烟雾
- 某种传染病流行

78. 女, 30 岁。呕吐, 腹胀 5 天。神志不清, 胡言乱语 1 天。平素体健。查体: $T 36.5^{\circ}\text{C}$, $P 90$ 次/分, $R 18$ 次/分, $BP 120/80$ mmHg, 巩膜明显黄染, 心肺未见明显异常。腹软, 无压痛。肝浊音界缩小。实验室检查: 血 ALT 520U/L , $\text{TBiL } 215\mu\text{mol}$, $\text{DBiL } 138\mu\text{mol}$ 。其典型的肝脏病理改变主要是

- 汇管区纤维化
- 多个小叶或大块肝细胞坏死
- 淤血性改变
- 汇管区中性粒细胞浸润
- 肝细胞脂肪变性

79. 男, 68 岁。吸烟、饮酒 40 多年。有高血压病史。某年冬天晨起时发现左下肢不能动, 入院后诊断为脑卒中。以下医生的建议不合理的是

- 不良生活方式是疾病原因之一, 应戒烟限酒

- B. 控制血压,预防再发
 C. 告知患者定期来医院检查身体
 D. 告知患者康复注意事项
 E. 告知患者天气太冷是引发该病的直接因素
80. 女,30岁。因慢性皮肤溃疡迁延不愈需接受高压氧治疗。患者对高压氧舱的封闭环境感到十分恐惧。心理医生与患者进行了充分的沟通,在做好各种应急准备之后,让患者直接进入高压氧舱以快速克服恐惧心理。同时完成高压氧治疗。这种心理治疗方法是
 A. 放松训练
 B. 冲击疗法
 C. 厌恶疗法
 D. 系统脱敏法
 E. 认知疗法
81. 梁某的姐姐因患子宫脱垂在某医院接受手术治疗,术后第3天突然死亡。梁某对死因提出质疑,要求复印其姐姐的全部病例资料。医院工作人员依据《医疗事故处理条例》提供了其有权复印的病例资料。以下病例资料中可复印的是
 A. 会诊意见
 B. 上级医师查房记录
 C. 死亡病例讨论记录
 D. 病程记录
 E. 住院志
82. 男,35岁。反复上腹痛5年,再发1个月,加重2天,5年来反复上腹痛,多发生于饥饿时,进食及口服碱性药可缓解,1个月来再发上腹痛,口服碱性药物缓解不满意,2天上腹痛加重向后背放射,查体:上腹部压痛。血清淀粉酶 320U/L,该患者最可能的诊断是
 A. 十二指肠球前壁溃疡
 B. 胃窦溃疡
 C. 胃底溃疡
 D. 胃体溃疡
 E. 十二指肠球后壁溃疡
83. 为保障工人的健康,预防职业病的发生,按照《职业病防治法》的要求,某化工厂定期进行生产环境监测,为工人进行健康检查,建立健康档案并定期分析。以上所做的工作为
 A. 职业流行病学研究
 B. 现场劳动卫生学调查
 C. 生物监测
 D. 健康监护
 E. 职业危险风险评估
84. 男,78岁。反复咳嗽、咳痰50年,心悸、气促10年,再发10天。吸烟40年,30支/日。查体: T 36.0℃, P 120次/分, R 32次/分, BP 135/80mmHg, SpO₂ 87% (吸氧)。桶状胸,肋间隙增宽,两侧呼吸运动对称,触觉语颤减低,胸部叩诊呈过清音,双肺呼吸音减弱,双肺可闻及细湿啰音和少量哮鸣音。动脉血气分析示 pH 7.38, PaO₂ 50.4mmHg, PaCO₂ 56.8mmHg, 肺功能检查: FEV₁ 占预计值 27%, FEV₁/FVC 34%, 该患者不宜吸入高浓度氧的原因是高浓度可解除
 A. 外周化学感受器对低氧存在的适应现象
 B. 低氧对呼吸中枢的直接兴奋作用
 C. 中枢化学感受器对低氧存在的适应现象
 D. 低氧对外周化学感受器的兴奋作用
 E. 低氧对中枢化学感受器的兴奋作用
85. 研究者欲比较两种中成药对口腔溃疡的治疗效果是否有差别,用“有效、一般、无效”作为评价疗效的指标。宜采用的统计分析方法是
 A. t 检验
 B. 方差分析
 C. Z 检验
 D. 秩和检验
 E. 回归分析
86. 男,45岁。湖北渔民,经常腹痛、腹泻,体力逐渐下降半年,当地有类似患者。查体:体温正常,慢性病容,腹膨隆,脾肋下2cm,移动性浊音(+),血常规: Hb 90g/L, WBC 2.5 × 10⁹/L, N 0.6, 本患者所患疾病的病理特点是
 A. 门静脉血栓形成
 B. 肝细胞坏死及假小叶形成
 C. 肝内门静脉周围纤维化
 D. 肝静脉血栓形成
 E. 干酪样坏死
87. 女,45岁。体检发现右乳肿块,直径2cm,活动度差,边界不清。术后病理可见乳腺间质中有串珠样单行癌细胞排列。最可能的诊断是
 A. 导管原位癌
 B. 小叶原位癌
 C. 小叶浸润癌
 D. 髓样癌
 E. 导管浸润癌
88. 为加强妇女保健工作,某大型企业组织全体女职工进行健康检查,采用快速的医学检查方法,从表面健康的女职工中查出乳腺癌和宫颈癌的可疑患者,再进一步确诊后给予早期治疗,这种疾病防治策略属于
 A. 早期特异预防
 B. 疾病的筛检
 C. 高危人群的健康体检
 D. 重点疾病的抽样调查
 E. 一般健康促进

89. 男,45岁。因焦虑症接受心理治疗,在治疗过程中患者多次约治疗师看电影,并多次打电话叮嘱治疗师“可能下雨要带雨伞”或者“气温下降要添加衣服”等。患者的这种表现是
- 象征
 - 移情
 - 认同
 - 阻抗
 - 投射
90. 男,45岁。因“胃溃疡”行胃部分切除术,卧床7天后出现高热,咳脓血痰伴气促。查体:T 39℃,P 120次/分,R 30次/分。双肺可闻及少许湿啰音。痰液涂片检查可见大量脓细胞,成堆排列的G⁺球菌,白细胞内也可见G⁺球菌。最可能感染的细菌是
- 金黄色葡萄球菌
 - D族链球菌
 - A族链球菌
 - 脑膜炎奈瑟菌
 - 肺炎链球菌
91. 男,45岁。双上睑下垂伴四肢无力1年,晨轻暮重。治疗过程中出现呼吸困难、多汗、流涎、瞳孔缩小,最可能的原因是
- 5-HT系统亢进
 - 重症肌无力危象
 - 胆碱能系统抑制
 - 肾上腺素能系统抑制
 - 胆碱能系统亢进
92. 心理评估师给患者进行心理评估时,向患者出示了三张意义含糊的图片,并请他根据对图片内容的理解讲一个较为完成的故事,医生由此可以推测患者的个性特征和心理问题。该测验方法属于
- 调查法
 - 作业法
 - 观察法
 - 投射法
 - 问卷法
93. 女,30岁。腹痛、腹泻伴里急后重3天。最初为稀便,2天后为黏液脓血便,偶见片状灰白色膜状物排出。此病变最可能的炎症类型是
- 纤维索性炎
 - 变质性炎
 - 出血性炎
 - 浆液性炎
 - 化脓性炎
94. 男,25岁。高热1周,头疼,呕吐,血常规Hb 87g/L,WBC $33.2 \times 10^9/L$,Plt $56.0 \times 10^9/L$,骨髓细胞学检查见分类不明的原始、幼稚细胞占0.82,为鉴别该细胞的来源,目前最准确的检查技术是
- 细胞非特异性脂酶染色
 - 细胞糖原染色
 - 流式细胞术检查
 - 染色体检查
 - 细胞髓过氧化物酶染色
95. 男,68岁。反复咳嗽,咳痰20余年,气短5年。患者长期使用吸入糖皮质激素及支气管舒张剂治疗,近1周症状控制欠满意,联合使用某药物治疗后,出现排尿困难。该患者近来增加的药物最可能的
- 茶碱类
 - M受体拮抗剂
 - β_2 受体激动剂
 - 口服糖皮质激素
 - 祛痰
96. 男,57岁。心前区疼痛2年,多于安静状态发生,近日常于睡眠中突发心前区疼痛。查心电图ST段抬高,冠脉造影见一过性狭窄。予硝苯地平治疗的主要药理学依据是
- 选择性扩张外冠状动脉,增加心肌供血
 - 显著减慢心率,降低心肌耗氧量
 - 选择性增加心内膜下心肌供血
 - 显著抑制心肌收缩力,降低心肌耗氧量
 - 抑制或逆转心肌肥厚,降低心肌耗氧量
97. 男,70岁。因脑出血1小时入院,病情危重。医生建议立即手术,并告知家属手术可能存在的风险,不手术则会有生命危险。家属因经济困难,示意医生只需作简单处置,放弃救治,听任其死亡,但拒绝对此签字。此时医生应选择的最佳决策是
- 一定要家属签字,否则让患者转院
 - 听从家属决定,并在病历上如实记录家属意见
 - 征求医院领导意见并与家属充分沟通,确定符合实际的救治手段
 - 提请法院做出决策
 - 不考虑家属意见,医生直接手术
98. 男,12岁。因频发时轻时重的口吃就诊,经晤谈,心理治疗师认为患儿的口吃症状与其父母感情不好,总在他面前争吵并动辄以离婚相威胁有关,遂要求三人一起接受心理治疗,并采用了循环提问等技术,该心理治疗法称为
- 家庭治疗
 - 精神分析疗法
 - 人本主义疗法
 - 行为疗法
 - 认知疗法
99. 20世纪90年代。某地水源污染引发一起传染病爆发流行。在80万人的供水范围内。有40.3万人罹患经自来水传播的隐孢子病。此次突发公共卫生事件突出体现的特点是

- A. 局限性
B. 普遍性
C. 常规性
D. 散发性
E. 聚集性
100. 男, 45 岁。平素体健。为抢救一外伤的幼儿献血 100ml, 如果不考虑交感/副交感神经兴奋性, 最可能的血压, 心率变化是
A. 心率和血压均无明显变化
B. 血压升高, 心率加快
C. 血压升高, 心率减慢
D. 血压降低, 心率加快
E. 血压降低, 心率减慢
101. 女, 16 岁。发热伴头痛, 恶心 2 天, 于 8 月 10 日入院。呕吐 3 次, 为胃内容物。查体: T 39.6°C, BP 120/80mmHg。精神萎靡, 定向力差。颈抵抗 (+), 克氏症及巴氏征均阳性。该患者病变最严重的部位是
A. 大脑皮质和小脑
B. 小脑和丘脑
C. 小脑和脊髓
D. 大脑皮质及丘脑
E. 延髓和桥脑
102. 男, 45 岁。右足底外伤 5 小时, 伤口深, 及时彻底清创后, TAT(破伤风抗毒素) 皮试阳性。首先考虑给予注射
A. 人体破伤风免疫球蛋白
B. 破伤风抗毒素(脱敏注射)
C. 青霉素
D. 破伤风类毒素
E. 白喉、百日咳、破伤风三联疫苗
103. 男, 35 岁。1 小时前车祸外伤出血, 出血量约为 1 000ml。查体: BP 100/70mmHg, 体重 70kg, 面色苍白, 心率 125 次/分。该患者受伤后机体首先发生的反应是
A. 外周血管阻力降低
B. 循环血液中儿茶酚胺减少
C. 外周血管阻力不变
D. 脑和心脏的血管收缩
E. 外周血管阻力增加
104. 女, 72 岁。乏力、面色苍白 1 年。40 年前行胃大部切除术。查体: T 36.5°C, P 90 次/分, R 16 次/分, BP 110/80mmHg, 皮肤及睑结膜苍白, 双肺呼吸音清, 心律齐, 各瓣膜听诊区未闻及杂音, 腹软, 上腹部见一长约 7cm 陈旧性手术瘢痕, 全腹无压痛及反跳痛, 未触及包块。实验室检查: Hb 70g/L, 粪隐血(-)。胃镜: 吻合口炎症。与病人贫血有关的因素不包括
A. 胃蛋白酶缺乏
B. 铁缺乏
C. 胃酸缺乏
D. 叶酸缺乏
E. 维生素 B₁₂ 缺乏
105. 某县医院在处方检查中发现某医师开具了 3 张超常处方, 医院领导询问其原因, 该医师未能作出合理解释。于是, 医院根据相关规定对其作出了处理。该处理是
A. 责令暂停执业
B. 限制处方权
C. 取消处方权
D. 记过
E. 吊销医师证
106. 男, 57 岁。反复咳嗽, 咳痰 10 余年, 加重伴喘憋 3 年余。吸烟 10 年, 20 支/日。查体: 桶状胸, 双肺呼吸音低, 叩诊过清音, 未闻及干湿啰音。动脉血气分析: pH 7.39, PaO₂ 65mmHg, PaCO₂ 43mmHg, 肺功能检查: FEV₁ 占预计值 52%, FEV₁/FVC 51%, 造成该患者通气功能障碍的主要病理生理机制是
A. 肺内功能性分流减少
B. 肺脏弹性阻力减少
C. 肺弥散面积增大
D. 肺脏非弹性阻力减少
E. 肺脏无效腔减少
107. 男, 45 岁。血 AFP 明显升高 1 个月。有慢性乙型肝炎病史 10 年。腹部 B 超发现肝内有 3 个实性结节, 最大径分别为 0.5cm, 0.7cm, 和 1.2cm, 周围肝组织是明显的肝硬化改变, 术后病理为原发性肝细胞性肝癌, 其分型属于
A. 大肝癌
B. 弥漫型肝癌
C. 结节型肝癌
D. 小肝癌
E. 巨块型肝癌
108. 男, 17 岁。发热伴乏力, 纳差, 眼黄, 尿黄 5 天。实验室检查: ALT 860U/L, AST 620U/L, TBiL 60μmol/L。经常在街边小摊进餐。曾注射乙肝疫苗。本患者所患疾病的病原属于
A. 单股负链 RNA 病毒
B. 双股 RNA 病毒
C. 单股正链 RNA 病毒
D. DNA 病毒
E. 小 RNA 病毒
109. 男, 35 岁。其妻在一场车祸中丧生, 其后患者表现为依赖性增强, 兴趣变得狭窄, 以自我为中心。心理医生认为患者的表现属于应激反应。这类应激反应属于

- A. “或战或逃”反应
B. 情绪反应
C. 行为退缩反应
D. 认知反应
E. 自我防御反应
110. 男, 35岁。感冒后出现双下肢无力, 感觉消失伴尿潴留1天。查体: 肌张力低, 腱反射消失, 双侧剑突以下感觉消失, 病理征未引出。患者运动障碍的机制是
A. 脊髓突然失去高位中枢的调节
B. 脊髓高位中枢损伤性刺激
C. 脊髓高位中枢抑制减弱
D. 脊髓横断面损伤性刺激
E. 脊髓高位中枢过度抑制
111. 某县医院医师张某在一个考核周期内开具不合理处方达5次以上, 被认定考核不合格。县卫生计生行政部门根据《执业医师法》责令其暂停一定期限的执业活动并接受培训。该期限是
A. 3~9个月
B. 3~6个月
C. 1~6个月
D. 6~12个月
E. 1~3个月
112. 某县医院因收治多例人感染高致病性禽流感患者未按规定报告受到行政处罚。为此, 该医院积极整改, 加强《传染病防治法》的宣传, 并落实各项传染病防治任务, 不属于医院应承担的任务是
A. 开展流行病学调查
B. 承担责任区域内传染病预防工作
C. 承担医疗活动中与医院感染有关的威胁因素检测
D. 防止传染病的医源性感染
E. 防止传染病的医院感染
113. 回肠及部分空肠切除术后出现腹泻, 每日10余次稀水样便, 进食后加剧。腹泻原因主要是
A. 肠道感染
B. 分泌增加
C. 消化不良
D. 吸收不良
E. 肠蠕动加快
114. 某癌症患者, 心理状态较差且预后不良, 治疗过程中需要家属的积极配合。对此, 医生关于患者的最佳告知方式是
A. 告知家属部分病情并向患者保密
B. 告知家属实情并对患者适度告知
C. 告知患者部分病情并向家属保密
D. 直接告知患者实情
E. 告知患者及家属实情
115. 男, 35岁。田间耕作时被带锈铁钉刺伤右足, 伤口约3cm, 自行包扎未就医。6天后患者出现全身乏力, 头晕, 头痛, 并觉张口困难, 颈强直(+), 头后仰, 角弓反张。对造成该疾病的致病菌特点的描述, 正确的是
A. 细菌形态为球菌
B. 致病菌素主要为内毒素
C. 感染必须具有缺氧环境
D. 革兰染色阴性
E. 芽孢对热、干燥不受
116. 男, 45岁。乏力、双下肢水肿2年。母亲及哥哥患有乙型肝炎多年。查体: T 36.5℃, P 80次/分。R 18次/分, BP 120/80mmHg。前胸可见数个蜘蛛痣, 可见肝掌, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率80次/分, 心律齐, 未闻及杂音, 腹软, 肝肋下未触及, 脾肋下5cm。血 ALB 28g/L。如果该患者行肝穿刺活组织病理检查, 最可能存在的特征性肝脏组织学病理改变的是
A. 肝细胞桥接坏死
B. 肝细胞脂肪样变
C. 肝细胞碎片状坏死
D. 肝细胞气球样变
E. 假小叶形成

A3/A4型选择题(117—126题)

答题说明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(117—119题共用题干)

男, 35岁, 已婚。因尿道口有脓性分泌物到医院就诊, 被诊断为淋病。

117. 根据《传染病防治法》对传染病分类的规定, 该患者所患疾病属于

A. 按乙类管理的丙类传染病

B. 丙类传染病

C. 甲类传染病

D. 按甲类管理的乙类传染病

E. 乙类传染病

118. 为防止该病传染给患者妻子, 医师符合伦理的最

佳做法是

- A. 请示当地疾病预防控制中心
- B. 劝说患者告知其妻子实情
- C. 将实情直接告知其妻子
- D. 告知患者所在单位
- E. 同意不告知患者妻子

119. 如果患者拒绝将病情如实告知其妻子, 医师所面对的境况属于

- A. 多重趋避冲突
- B. 趋避冲突
- C. 双趋冲突
- D. 双重趋避冲突
- E. 双避冲突

(120—122 题共用题干)

某学者为探讨某药物对某病的疗效, 选取了 120 例该患者, 随机分为服用该药的治疗组和使用标准疗法的对照组, 随访观察时, 观察者与患者均不知道两组接受的措施, 一个月后观察疗效, 结果治疗组 60 名患者中有 40 人有效, 对照组 60 名中有 20 人有效, 经统计学检查, 两组差异具有统计学意义。

120. 该药物对疾病治疗的有效率为

- A. $(20/120) \times 100\% = 16.7\%$
- B. $(40/60) \times 100\% = 66.7\%$
- C. $[(40+20)/120] \times 100\% = 50.0\%$
- D. $(40/120) \times 100\% = 33.3\%$
- E. $(20/60) \times 100\% = 33.3\%$

121. 由结果推出的结论为

- A. 该药材对该疾病有效
- B. 资料不足, 尚不能下结论
- C. 该药对该疾病的治疗效果高于标准疗法的疗效
- D. 标准疗法无效
- E. 该药对该疾病无效

122. 该研究采用的盲法为

- A. 没有盲法
- B. 三盲
- C. 双盲
- D. 随机盲法

E. 单盲

(123—124 题共用题干)

男, 57 岁。体检发现血糖升高。既往有高血压、高脂血症史。其母患糖尿病。查体: BP 160/100mmHg, 身高 175cm, 体重 90kg。双肺听诊未见异常。心率 76 次/分, 心律齐, 肝脾肋下未触及, 实验室检查: 空腹血糖 7.8mmol/L, Hb Alc 8.0%。

123. 该患者首选的降糖治疗药物是

- A. 吡格列酮
- B. 格列齐特
- C. 二甲双胍
- D. 西格列汀
- E. 阿卡波糖

124. 下列降压药物中, 应首选的是

- A. 血管紧张素转换酶抑制剂
- B. 钙通道阻滞剂
- C. α 受体拮抗剂
- D. β 受体拮抗剂
- E. 利尿剂

(125—126 题共用题干)

男, 25 岁。间断咳嗽、咳痰带血 1 个月, 乏力、纳差伴尿少、水肿 1 周。实验室检查: 血 WBC $8.6 \times 10^9/L$, 血红蛋白 90g/L, 尿蛋白(++) , 尿沉渣镜检红细胞 8~10/HP, 血肌酐 268 $\mu\text{mol/L}$, 尿素氮 22.6mmol/L, 抗肾小球基底膜抗体(+), ANCA 阴性。

125. 其肾脏最可能的病理类型为

- A. 微小病变型
- B. 新月体性肾小球肾炎
- C. 系膜增生性肾小球肾炎
- D. 毛细血管内增生性肾小球肾炎
- E. 膜性肾病

126. 最可能的免疫病理所见是

- A. 无或仅微量免疫复合物
- B. IgG 和 C3 呈颗粒状沉积于系膜区及毛细血管壁
- C. IgG、IgA、IgM、C3 呈多部位沉积
- D. IgG 和 C3 呈细颗粒状沿毛细血管壁沉积
- E. IgG 和 C3 呈线条状沉积于毛细血管

B1 型选择题 (127—150 题)

答 题 说 明

以下提供若干组试题, 每组试题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(127—128 共用备选答案)

- A. 呼吸道合胞病毒
- B. 风疹病毒
- C. 腮腺炎病毒
- D. 腺病毒
- E. 麻疹病毒

127. 可以引起人类呼吸道、胃肠道、泌尿道及眼部感染的病毒是
128. 可引起先天性耳聋的病毒是
- (129—130 题共用备选答案)
- A. 普萘洛尔
B. 环丙沙星
C. 阿托品
D. 华法林
E. 洋地黄
129. 防止心房颤动患者血栓形成的药物是
130. 治疗泌尿生殖道感染的药物是
- (131—133 题共用备选答案)
- A. 动脉血压升高,尿量减少
B. 动脉血压降低,尿量减少
C. 动脉血压升高,尿量增加
D. 动脉血压降低,尿量增加
E. 动脉血压和尿量无明显变化
131. 重症急性胰腺炎患者出现血压下降,给予快速补液后,患者可出现的临床表现是
132. 重度失血患者失代偿时,可出现的临床表现是
133. 肾动脉狭窄患者可出现的临床表现是
- (134—135 题共用备选答案)
- A. 分叶状
B. 乳头状
C. 结节状
D. 囊状
E. 菜花样
134. 皮下脂肪瘤的常见肉眼形态是
135. 乳腺纤维腺瘤的常见肉眼形态是
- (136—137 题共用备选答案)
- A. HMG - CoA
B. 乙酰 CoA
C. 琥珀酰 CoA
D. 丙酰 CoA
E. 丙二酰 CoA
136. 三羧酸循环的中间产物是
137. 水解脱去 CoA 生成酮体的物质是
- (138—139 题共用备选答案)
- A. 标准差
B. 四分位数间距
C. 算术均数
D. 几何均数
E. 中位数
138. 反映一组观察值离散程度最好的指标是
139. 若偏态分布资料一端或两端无确切的数值,描述其集中趋势指标是
- (140—141 题共用备选答案)
- A. 肺孢子菌感染
B. 病毒性肺炎
C. 大叶性肺炎
D. 肺结核病
E. 小叶性肺炎
140. 分枝杆菌感染引起的疾病是
141. 真菌感染引起的疾病是
- (142—143 题共用备选答案)
- A. 2 年
B. 3 年
C. 1 年
D. 4 年
E. 5 年
142. 对中止执业活动达到一定年限的医师,应当注销其执业注册,该年限是
143. 急诊处方依法应保存的年限是
- (144—145 题共用备选答案)
- A. ADP
B. FAD
C. UTP
D. NADH
E. NADPH
144. 属于核黄素活性形式的物质是
145. 直接参与糖原合成的核苷酸是
- (146—147 题共用备选答案)
- A. B 淋巴细胞
B. 树突状细胞
C. NK 细胞
D. 巨噬细胞
E. T 淋巴细胞
146. 即能产生抗体又能提呈抗原的免疫细胞是
147. 可用于艾滋病辅助诊断的免疫细胞是
- (148—150 题共用备选答案)
- A. 平等相待,廉洁奉公
B. 积极进取,保证安全
C. 精诚团结,密切协作
D. 耐心倾听,正确引导
E. 关心体贴,减少痛苦
148. 体格检查的伦理要求是
149. 询问病史的伦理要求是
150. 医务人员在手术中应遵循的伦理要求是

第三单元

A1 型选择题 (1—35 题)

答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 急性胰腺炎的典型症状是
 - 脐周阵发性疼痛,停止肛门排便和排气
 - 上腹部剧烈疼痛,向左上臂内侧放射
 - 上腹部烧灼样疼痛,进食后可缓解
 - 上腹部持续性剧烈疼痛,向腰背部放射
 - 阵发上腹部钻顶样疼痛,辗转体位
- 拟实施储存式自体输血的患者,其血红蛋白水平至少应大于
 - 110g/L
 - 100g/L
 - 130g/L
 - 120g/L
 - 140g/L
- 下列细胞中,能分泌降钙素的是
 - 甲状腺滤泡细胞
 - 甲状旁腺细胞
 - 腺垂体细胞
 - 神经垂体细胞
 - 甲状腺滤泡旁细胞
- 手术病人胃肠准备中要求术前 12 小时禁食,4 小时禁水的目的是
 - 减少术后感染
 - 防止麻醉或手术中呕吐
 - 防止术后切口裂开
 - 防止术后吻合口瘘
 - 防止术后腹胀
- 急性单纯性阑尾炎时,最不符合临床表现的是
 - 右下腹局限性压痛
 - 脐周疼痛
 - 白细胞计数轻度升高
 - 局部腹肌紧张
 - 有低热表现
- 采取非手术方法治疗急性消化性溃疡穿孔,错误的处理措施是
 - 静脉应用质子泵抑制剂
 - 胃肠减压
 - 静脉应用抗生素
 - 静脉输液,营养支持
 - 静脉应用糖皮质激素
- MDS - RCMD 不可能出现的异常表现是
 - 骨髓造血祖细胞培养集落形成减少
 - 难治性贫血
 - 外周血可见幼稚细胞
 - 血小板减少
 - 骨髓原始细胞 > 5%
- 根除幽门螺杆菌治疗后,首选的复查方法是
 - 幽门螺杆菌培养
 - 血清幽门螺杆菌抗体检查
 - ^{13}C 或 ^{14}C 尿素呼气试验
 - 快速尿素酶试验
 - 组织学检查
- 以慢性腹痛和下肢大关节不对称关节炎为特征临床表现的疾病是
 - 腰椎间盘突出症
 - 类风湿性关节炎
 - 强直性脊柱炎
 - 痛风性关节炎
 - 腰肌劳损
- 疟疾患者血常规的特点是
 - 红细胞及血红蛋白减少
 - 白细胞总数明显升高
 - 血小板明显降低
 - 淋巴细胞比例增加
 - 网织红细胞减少
- 初治急性早幼粒白细胞白血病首选的药物是
 - 全反式维 A 酸
 - 羟基脲
 - 1,25 - (OH) $_2$ - 维生素 D $_3$
 - 阿糖胞苷
 - 高三尖杉酯碱
- 关于下肢丹毒临床表现的描述,正确的是
 - 在中央部的表面有脓栓

- B. 局部多呈紫红色
C. 界线清楚
D. 局部硬肿
E. 常累及双侧肢体
13. 烧伤后第一个 8 小时应输入的液体量为估计伤后第一个 24 小时补液总量的
A. 2/3
B. 1/3
C. 1/2
D. 1/4
E. 1/5
14. 具有降低食管下括约肌压力作用的药物是
A. 钙通道阻滞剂
B. 质子泵抑制剂
C. H_2 受体拮抗剂
D. β 受体拮抗剂
E. 促胃肠动力剂
15. 腹部钝性损伤, 腹壁未破裂却导致腹内下列某一脏器破裂, 出现腹膜炎症状最晚的是
A. 空肠
B. 回肠
C. 结肠
D. 十二指肠
E. 胃
16. 甲状腺患侧腺叶大部切除术适用于
A. 甲状腺乳头状癌
B. 青少年原发性甲亢
C. 单纯性弥漫性甲状腺肿
D. 甲状腺高功能腺瘤
E. 桥本病
17. 下列指导低血容量性休克补液治疗最可靠的检测指标是
A. 血红蛋白
B. 颈外静脉充盈度
C. 中心静脉压
D. 肢端温度
E. 血细胞比容
18. 霍乱的典型临床表现是
A. 发热, 腹痛, 黏液脓血便, 里急后重
B. 大量水样便, 剧烈呕吐, 无发热或明显腹痛
C. 发热, 腹痛, 果酱样便
D. 无发热, 剧烈呕吐, 少量黄水样便
E. 发热, 剧烈腹痛, 水样便或血便
19. 与动、静脉血栓形成及反复流产相关的自身抗体是
A. 抗 SSA 抗体
B. 抗核抗体
C. 抗 Sm 抗体
D. 抗 dsDNA 抗体
E. 抗心磷脂抗体
20. 属于破伤风较为特异的临床表现是
A. 稽留热
B. 张口困难
C. 恐水
D. 昏迷
E. 坏疽
21. 下列乳腺癌病理类型中, 预后最好的是
A. 黏液腺癌
B. 硬癌
C. 单纯癌
D. 髓样癌
E. 导管内癌
22. 孕早期妇女感染下列哪种病原体易导致胎儿先天性感染
A. 人乳头瘤病毒
B. 沙眼衣原体
C. 白假丝酵母菌
D. 淋病奈瑟菌
E. 巨细胞病毒
23. 来源于 T 淋巴细胞的淋巴瘤类型是
A. 滤泡性淋巴瘤
B. 套细胞淋巴瘤
C. 边缘区淋巴瘤
D. 毛细胞白血病
E. 蕈样霉菌病
24. 正常成人热量的基本需要量是
A. 25kcal (kg · d)
B. 55kcal (kg · d)
C. 45kcal (kg · d)
D. 35kcal (kg · d)
E. 15kcal (kg · d)
25. 向肝脏输送血液最多的血管是
A. 肝静脉
B. 胃右动脉
C. 肝动脉
D. 门静脉
E. 肠系膜上动脉
26. 血清淀粉酶水平是临床上诊断和监测急性胰腺炎的重要指标, 其升高的高峰一般出现在发病后
A. 4 小时
B. 48 小时
C. 12 小时
D. 24 小时
E. 8 小时

27. 病人因急性弥漫性腹膜炎需急症手术, 正确的原则和步骤不包括
- 关腹前在腹腔内用抗生素控制感染
 - 术后一般放置腹腔引流
 - 寻找引起腹膜炎的原发灶
 - 根据怀疑病变脏器的部位确定手术切口
 - 用生理盐水冲洗腹腔至清洁
28. 克罗恩病的主要手术指征是
- 持续性粪隐血阳性
 - 严重腹泻
 - 营养不良, 体重减轻
 - 疑有恶变
 - 合并结肠息肉
29. 全身性外科感染的综合性治疗中, 最关键的是
- 保护最重要脏器功能
 - 全身支持治疗
 - 处理原发感染灶
 - 对症治疗
 - 应用抗菌药物
30. 典型伤寒的临床表现不包括
- 脾大
 - 相对缓脉
 - 表情淡漠
 - 持续发热
 - 出血性皮疹
31. 属于非特异性免疫的是
- 致敏 T 淋巴细胞
 - IgG 抗体
 - IgM 抗体
 - IgE 抗体
 - 单核 - 巨噬细胞
32. 中毒后临床表现为双侧瞳孔散大的毒物是
- 有机磷杀虫剂
 - 氯丙嗪
 - 阿片类药物
 - 吗啡
 - 阿托品
33. 肝硬化最常见的并发症是
- 自发性腹膜炎
 - 肝性脑病
 - 门静脉血栓形成
 - 上消化道出血
 - 原发性肝癌
34. 急性梗阻性化脓性胆管炎典型临床表现“Reynolds 五联征”不包括
- 腹痛
 - 神经系统症状
 - 休克
 - 黄疸
 - 呕吐
35. 高钾血症的病因不包括
- 慢性肾衰竭
 - 应用袢利尿剂
 - 应用螺内酯
 - 大量输入库存血
 - 挤压综合征

A2 型选择题 (36—105 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

36. 男, 45 岁。餐后突发右上腹阵发性绞痛伴恶心 2 天, 尿色呈浓茶样。既往有类似发作。查体: 急性病容, 巩膜黄染, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 右上腹深压痛, 无肌紧张, 最可能的诊断是
- 急性胰腺炎
 - 胆道蛔虫病
 - 急性胆囊炎
 - 胆总管结石
 - 胆总管囊肿
37. 男, 62 岁。腹痛、腹胀、乏力半年、腹部隐痛阵发性发作, 无恶心、呕吐。查体: T 36.5℃, P 88 次/分, R 22 次/分, BP 120/80mmHg, 贫血貌, 浅表淋巴结无肿大, 巩膜无黄染, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率 88 次/分, 心律齐, 腹软, 未见肠型, 右下腹可触及一活动性包块。实验室检查: 血常规示 Hb 90g/L, WBC $9.5 \times 10^9/L$, Plt $195 \times 10^9/L$, 肝功能正常, CEA 20μg/L。粪隐血实验阳性。最可能的诊断是
- 回盲部肠套叠
 - 回盲部结核
 - 克罗恩病
 - 溃疡性结肠炎
 - 回盲部肿瘤
38. 女, 35 岁。术后粘连性梗阻 3 天, 加重 1 天。查

体:腹部可见肠型,右下腹有局限性压痛,肠鸣音亢进。多次腹部X线平片可见固定肠襻。首选的治疗措施是

- A. 继续补液,观察病情变化
B. 灌肠治疗
C. 剖腹探查
D. 注射吗啡止痛
E. 出现腹膜刺激征后手术
39. 男,32岁。左下腹痛2个月伴腹泻。大便为黄稀便,时有黏液血便,每日3次。查体:T 36.5℃,P 80次/分,R 18次/分,BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心律齐,腹软,左下腹轻压痛,无反跳痛。结肠镜检查:直肠、乙状结肠黏膜弥漫充血、水肿,粗颗粒样改变,多发糜烂及浅溃疡。最可能的诊断是
- A. 结肠癌
B. 克罗恩病
C. 慢性结肠炎
D. 溃疡性结肠炎
E. 肠结核
40. 男,45岁。骑车时摔倒。左前臂可见皮肤破损、肿胀。查体:T 36.5℃,P 80次/分,R 18次/分,BP 120/80mmHg,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心律齐,腹软,无压痛。血常规:Hb 120g/L,WBC $9.6 \times 10^9/L$ 。X线提示左前臂桡骨中段骨折。其创伤按伤情分类是
- A. 中度闭合伤
B. 轻度开放伤
C. 重度闭合伤
D. 中度开放伤
E. 轻度闭合伤
41. 男,62岁。上腹痛10天。既往高血压病史10余年,反复心前区疼痛发作2个月,口服阿司匹林100mg/日、降压药物、他汀类降脂药等治疗。查体:T 36.5℃,P 80次/分,R 18次/分,BP 120/80mmHg,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心律齐,腹软,无压痛。上消化道X线钡剂造影:胃角切迹壁外龛影。¹³C尿素呼气试验阴性。最适宜的治疗药物是
- A. 氢氧化铝
B. 雷尼替丁
C. 枸橼酸铋钾
D. 多潘立酮
E. 奥美拉唑
42. 女,65岁。食用坚果后突发呕血4小时,伴心悸。胸闷、气短。既往慢性乙型肝炎病史20年,冠心病病史8年。查体:T 36.5℃,P 110次/分,R 24次/分,BP 90/50mmHg,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律不齐,可闻及早搏10次/分,腹软,无压痛。最适合的治疗药物是
- A. 西咪替丁
B. 硝酸甘油
C. 血管加压素
D. 普萘洛尔
E. 生长抑素
43. 女,45岁,厨师。头痛半年,加重伴呕吐1个月。无高血压,心脏病病史。查体:BP 130/86mmHg,颈无抵抗,眼底检查发现视盘水肿,头颅CT检查提示脑实质多个低密度病灶,最可能的诊断是
- A. 脑肿瘤
B. 囊尾蚴病
C. 腔隙性脑梗死
D. 脑出血
E. 脑脓肿
44. 女,65岁。乏力,胸痛1个月,既往体健,查体:轻度贫血貌,双侧肋骨有局部压痛,实验室检查:血常规:Hb 80g/L,WBC $5.6 \times 10^9/L$,Plt $120 \times 10^9/L$,血清总蛋白100g/L,白蛋白27g/L,Scr $190 \mu\text{mol/L}$,骨髓细胞学检查时骨髓中幼浆细胞占0.45。为明确诊断,最重要的检查是
- A. 血、尿免疫固定电泳
B. 血清 β_2 微球蛋白测定
C. 尿常规
D. 尿本周蛋白
E. 血沉
45. 男,55岁。被重物砸伤双下肢2小时。查体:P 108次/分,BP 113/64mmHg,神志清楚,双肺呼吸音清未闻及干湿性啰音,心律齐,腹软,无压痛,双下肢肿胀,广泛软组织挫裂伤,最佳处理方法是
- A. 快速输平衡盐溶液
B. 输血
C. 使用升压药
D. 输葡萄糖溶液
E. 输血浆代用品
46. 女,55岁。寒战,发热,右上腹痛15天,体温每日高达39.8℃左右,CT提示肝内两个脓肿,最大直径达6cm,其治疗方法应首选
- A. 全身大剂量应用抗生素
B. 右半肝切除术
C. 经皮穿刺置管引流术
D. 脓腔内注入抗生素
E. 支持治疗
47. 男,72岁。10小时前突发昏迷。CT诊断为脑出血,2小时前胃管引流咖啡色液体约50ml,其上消化道出血最可能的原因是
- A. 缺血性胃病

- B. 胆汁反流性胃炎
 C. 感染引起急性胃黏膜病变
 D. 药物性胃炎
 E. 应激引起急性胃黏膜病变
48. 女, 45 岁。突发右下腹痛伴呕吐, 停止排气排便 7 小时, 查体: P 110 次/分, BP 130/80mmHg, 右侧腹股沟韧带下方卵圆窝处可触及半球形包块, 压痛明显, 不能还纳。正确的处理是
 A. 立即扩容补液
 B. 手法还纳包块
 C. 应用吗啡, 缓解疼痛
 D. 密切观察病情变化
 E. 立即手术治疗
49. 女, 62 岁, 肝癌切除术后 1 天。查体: P120 次/分, BP80/60mmHg。下列哪项不能提示有内出血
 A. CVP 低于 5cmH₂O
 B. 胸腔穿刺出不凝血
 C. 每小时尿量少于 25ml
 D. 2 时引流出血液 150ml
 E. 休克给予足量血液后好转, 随后再次出现休克
50. 男, 45 岁。右上腹胀痛伴间断发热 4 个月。1 年前曾因“菌痢?”住院治疗缓解。曾于粪便中发现有叶状伪足的滋养体。腹部 B 超示肝右叶单发直径 10cm 囊肿。此病原体从肠道感染至肝的途径是
 A. 从腹腔经淋巴系统入肝
 B. 从结肠经门静脉入肝
 C. 从小肠经门静脉入肝
 D. 从胆道上行入肝
 E. 从胃经门静脉入肝
51. 女, 45 岁。间断胸骨后疼痛、反酸、烧心 1 年。饮酒后加重。查体: T 36.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg。浅表淋巴结未触及肿大, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹软, 全腹无压痛及反跳痛。胃镜: 食管下段可见长约 0.3cm 纵行黏膜破损。首选的治疗药物是
 A. 碳酸氢钠
 B. 奥美拉唑
 C. 多潘立酮
 D. 硫糖铝
 E. 莫沙必利
52. 男, 32 岁。大量呕吐、腹泻、少尿 1 天。查体: T 36.5℃, P 110 次/分, R 24 次/分, BP 85/55mmHg, 体重 70kg, 脉搏细速, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律 110 次/分, 心律齐, 腹软, 无压痛。估计液体丢失量至少是
 A. 2 100ml
 B. 4 900ml
 C. 4 200ml
 D. 2 800ml
 E. 3 500ml
53. 女, 45 岁。茶色尿伴腰背痛 1 个月。查体: 贫血貌, 巩膜黄染, 肝肋下未触及, 脾肋下 2cm, 腹部移动性浊音(-)。血常规: Hb 72g/L, WBC 6.0 × 10⁹/L, Plt 126 × 10⁹/L, 网织红细胞 0.12。Coombs 试验(+), Ham 试验(-)。该患者最可能的诊断是
 A. 自身免疫性溶血性贫血
 B. 巨幼细胞贫血
 C. 脾功能亢进
 D. 骨髓增生异常综合征
 E. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
54. 男, 62 岁。半日前进食苹果后呕鲜血约 300ml, 随后排黑便约 400g。慢性乙型肝炎病史 30 余年。查体: P 112 次/分, BP 100/60mmHg。神志清楚, 腹软, 无压痛, 肠鸣音 12 次/分。该患者消化道出血最有可能的原因是
 A. 糜烂性胃炎
 B. 食管贲门黏膜撕裂综合征
 C. 胃癌
 D. 消化性溃疡
 E. 胃底静脉曲张破裂
55. 女, 55 岁。上腹不适, 纳差 3 年。胃镜及胃黏膜活组织病理检查: 慢性萎缩性胃炎, 重度肠上皮化生。最适合的随访检查方法是
 A. 胃镜
 B. 血清肿瘤标志物
 C. 腹部 B 超
 D. 腹部 CT
 E. 上消化道 X 线钡剂造影
56. 男, 45 岁。行走时右小腿和足部出现间歇性疼痛 1 年余。近 3 个月夜间呈持续性疼痛, 足趾呈紫黑色、干冷。吸烟史 20 余年, 每日 2 包。该患者不应该选择的治疗措施是
 A. 严格戒烟
 B. 手术治疗
 C. 高压氧舱治疗
 D. 热疗
 E. 给予止痛剂及镇静剂
57. 男, 45 岁。不明原因发热半个月。查体: T 38℃, 两侧颈部、腋窝和腹股沟区均可触及淋巴结肿大, 最大者 3cm × 2cm, 均质硬、活动、无压痛, 肝肋下 2cm, 脾肋下 4cm。颈部淋巴结活检诊断为非霍奇金淋巴瘤。要确定该患者的临床分期, 所需的辅助检查不包括
 A. 腹部 B 超

- B. 骨髓细胞学检查
C. 浅表淋巴结 B 超
D. 盆腔 CT
E. 胸部 CT
58. 女, 55 岁。恶心、呕吐、少尿 6 小时, 呕吐量大, 无口渴。2 年前有腹部手术史。此时患者最可能出现的水电解质紊乱是
A. 高渗性脱水
B. 稀释性低钠血症
C. 高钾血症
D. 低渗性缺水
E. 等渗性缺水
59. 男, 62 岁。上腹胀、隐痛 2 个月, 伴食欲减退、乏力、消瘦、大便发黑。查体: 消瘦, 浅表淋巴结无肿大, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。上消化道钡剂造影见胃窦部小弯侧黏膜紊乱, 可见直径 3.5cm 不规则充盈缺损, 胃壁僵直。其最常见的扩散转移途径是
A. 直接浸润
B. 腹腔内种植
C. 胃肠道内转移
D. 淋巴结转移
E. 血行转移
60. 男, 32 岁。发热、下腹痛、腹泻 1 个月。体温最高 38.1℃, 大便 3 次/日, 黄稀便, 无脓血。查体: T 37.5℃, P 90 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。腹部 B 超示右下腹部肠壁增厚。对诊断最有意义的检查是
A. 腹腔镜
B. 下消化道 X 线钡剂造影
C. 腹部 CT
D. 结肠镜
E. 腹部 X 线平片
61. 女, 35 岁。颈前包块 8 年, 心慌、气短、怕热、多汗半年。查体: P 110 次/分, BP 160/70mmHg, 无突眼, 甲状腺触及多个结节, 中等硬度, 表面光滑, 随吞咽可上下移动。实验室检查: T_3 、 T_4 增高, TSH 降低, TPOAb 及 TGAb 均阴性。最可能的诊断是
A. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
B. 结节性甲状腺肿继发甲亢
C. 甲状腺自主高功能腺瘤
D. 单纯性甲状腺肿
E. 原发性甲状腺功能亢进症
62. 男, 7 岁。发热、头痛、恶心、呕吐 2 天, 嗜睡 1 天。查体: T 39.5℃, 浅昏迷, 瞳孔等大, 对光反射存在, 腹部可见多个出血点, 颈抵抗(+), 克氏症(+). 实验室检查: 血 WBC $19 \times 10^9/L$, N 0.85。最可能的诊断是
A. 结核性脑膜炎
B. 流行性脑脊髓膜炎
C. 流行性乙脑炎
D. 中毒型细菌性痢疾
E. 肾综合征出血热
63. 女, 35 岁。肛门周围肿胀伴发热 3 天。排便时疼痛加重。查体: T 38.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。肛门周围皮肤发红、压痛明显。最可能的诊断是
A. 肛门周围脓肿
B. 直肠下黏膜脓肿
C. 肛门括约肌间隙脓肿
D. 盆骨直肠间隙脓肿
E. 直肠后间隙脓肿
64. 女, 21 岁。1 小时前被人发现昏迷, 身边有空瓶, 瓶内有刺激性气味。查体: P 60 次/分, 全身大汗, 呼吸有蒜臭味, 瞳孔针尖大小, 两肺满布湿性啰音。最可能的诊断是
A. 糖尿病酮症酸中毒
B. 镇静剂催眠药中毒
C. 一氧化碳中毒
D. 乙醇中毒
E. 有机磷杀虫药中毒
65. 男, 32 岁。锐器刺伤右上腹 1 小时。查体: T 36.5℃, P 100 次/分, R 26 次/分, BP 100/65mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率 100 次/分, 心律齐。诊断性腹腔穿刺抽出不凝血。急症手术探查。正确的腹腔探查顺序首先探查
A. 小肠
B. 胃后壁及胰腺
C. 右肾
D. 肝脏
E. 胃、十二指肠
66. 男, 32 岁。炸石作业时不慎炸伤右大腿 5 小时。伤后出血约 400ml。查体: T 36.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 110/80mmHg, 神志清楚, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。右大腿可见一长约 10cm 不规则皮肤伤口, 肌肉部分破损。对该患者处理错误的是
A. 清创后一期缝合伤口
B. 扩创、引流后延期缝合
C. 同时应用抗生素和 TAT
D. 清创时探查深部组织损伤情况
E. 伤口近心端扎止血带, 送医院
67. 女, 28 岁。阴道分泌物增多 5 天。有不洁性交史。检查: 右侧大阴唇可见 1.0cm × 1.0cm、质硬、无痛

隆起物。本例最可能的诊断是

- A. 巨细胞病毒感染
B. 淋病
C. 生殖器疱疹
D. 尖锐湿疣
E. 梅毒
68. 女,45 岁。肛门肿胀 1 周,为持续性痛,逐渐加重,排便和行走时出现剧痛,有里急后重感和排便困难,伴发热,全身不适。查体:T 39.6℃,肛门左侧红肿,有明显压痛,直肠指诊:直肠左侧饱满,压痛(+),有波动感。血常规:Hb 102g/L,WBC 21.0 × 10⁹/L,N 0.92,Plt 210 × 10⁹/L,决定立即行切开引流术,最主要的依据是
- A. 排便有困难
B. 局部饱满有波动感
C. 高热,全身症状
D. 血白细胞增高
E. 行走时出现剧痛
69. 男,55 岁。出车祸后 6 小时。6 小时来未排尿,放置导尿管导出黄色尿液 50ml。查体:T 36.5℃,P 140 次/分,R 28 次/分,BP 65/50mmHg,意识模糊,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,腹部膨隆,四肢冰冷。最可能的诊断为
- A. 轻度休克,神经源性休克
B. 重度休克,神经源性休克
C. 重度休克,低血容量性休克
D. 中度休克,低血容量性休克
E. 中度休克,神经源性休克
70. 男,45 岁。突发中上腹持续性疼痛,伴呕吐、尿黄 2 小时,发病前 3 小时大量饮酒,并进食较多油腻食物。查体:T 37.5℃,P 98 次/分,R 22 次/分,BP 130/80mmHg,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心率 98 次/分,心律齐,上腹有压痛及反跳痛。最有诊断价值的检查是
- A. 腹部 CT
B. 胃镜
C. 尿淀粉酶
D. 腹部 X 线平片
E. 血清淀粉酶
71. 男,55 岁。右上腹疼痛 3 个月。呈持续性钝痛,向右肩背部放射,伴乏力,发病以来体重减轻 6kg。查体:T 36.5℃,P 80 次/分,R 18 次/分,BP 120/80mmHg,巩膜无黄染,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,肝肋下 3cm,质地稍硬,有结节感。实验室检查 AFP 800μg/L,CEA 正常。腹部 B 超:肝右叶 8cm × 6cm 占位性病变,向外生长,周边血流量增强,门静脉正常。最理想的治疗方法是
- A. 肿瘤切除加放疗
B. 姑息性肝切除术
C. 根治性肝切除术
D. 局部射频治疗
E. 经肝动脉化疗栓塞
72. 女,21 岁。关节疼痛、口腔溃疡 4 个月,双手指遇冷变白、变紫 2 个月,发热、下肢水肿 2 周。实验室检查:血 Hb 89g/L,WBC 2.3 × 10⁹/L,Plt 80 × 10⁹/L;尿蛋白(++);尿红细胞(++)。最可能的诊断是
- A. 再生障碍性贫血
B. 肾结核
C. 系统性红斑狼疮
D. 急性肾小球炎
E. 类风湿性关节炎
73. 女,35 岁。发热、牙龈出血 20 天。查体:左侧颈部触及一个 2cm × 2cm 大小淋巴结,质韧,无压痛。胸骨压痛(+),肝肋下未触及,脾肋下 2cm。血常规:Hb 105g/L,WBC 3.6 × 10⁹/L,骨髓细胞学检查示大的原始细胞占 0.80,细胞大小均一,胞浆内可见明显空泡,PAS 细胞(+).该患者最可能的诊断是
- A. 急性髓细胞白血病(M1)
B. 急性淋巴细胞白血病(L1)
C. 急性细胞白血病(M2)
D. 急性淋巴细胞白血病(L2)
E. 急性淋巴细胞白血病(L3)
74. 男,32 岁。肛门肿胀伴畏寒、发热 4 周。症状反复发作并逐渐加重,伴有排尿不适,肛门旁出现局部红肿疼痛,继之破溃流出脓液。确保疗效的关键步骤是
- A. 瘻管切开,形成敞开的创面
B. 抗感染治疗后手术
C. 1:5 000 高锰酸钾溶液坐浴
D. 明确破溃外口和内口的位置
E. 首先充分扩肛
75. 男,62 岁。进行性吞咽困难 2 月余。既往体健。查体:T 36.5℃,P 80 次/分,R 18 次/分,BP 120/80mmHg。浅表淋巴结未触及肿大,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,未闻及杂音,腹软,无压痛。上消化道 X 线钡剂造影:食管下段黏膜紊乱,部分管壁僵硬。为明确诊断,首选的检查是
- A. 食管 B 超
B. 胃镜
C. PET-CT
D. 胸部增强 CT
E. 食管拉网细胞学检查

76. 男, 32 岁。因十二指肠溃疡行毕 II 式胃大部切除术后 6 个月。术后出现反酸、烧心症状。应用抑酸剂治疗无效。上述症状逐渐加重, 并呕吐胆汁样物, 上腹部及胸骨后灼烧样疼痛, 体重减轻。查体: T 36.5°C, P 80 次/分, BP 120/80mmHg, 贫血貌, 消瘦, 营养不良, 巩膜无黄染, 心肺查体未见异常。胃镜检查见黏膜充血、水肿、糜烂, 胃液中无游离酸, 最适当的治疗措施是
- 采取少食多餐方式
 - 行 Roux-en-Y 胃空肠吻合术
 - 长期应用消胆胺治疗
 - 应用 H₂ 受体拮抗剂
 - 注意餐后平卧
77. 女, 28 岁。发热、皮肤出血点 2 周。查体: 贫血貌, 四肢皮肤散在出血点, 胸骨压痛(+), 左肺可闻及少许湿啰音, 腹软, 脾肋下 1cm。血常规: Hb 71g/L, WBC 3.0 × 10⁹/L, Plt 6 × 10⁹/L。骨髓细胞学检查见原始细胞占比 0.90, 细胞化学染色: MPO(-), PAS(+), 骨髓染色体检查为正常核型。应首选的治疗是
- 全反式维 A 酸口服液
 - VDLP 方案化疗
 - 甲磺酸伊马替尼口服
 - DA 方案化疗
 - 环孢素口服
78. 男, 32 岁。间断上腹痛 3 年。腹痛多发生在饥饿时, 进食后可缓解。查体: T 36.5°C, P 18 次/分, R 18 次/分, BP 100/60mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。胃镜检查: 十二指肠溃疡愈合期, ¹³C 尿素呼气实验阳性。最有效的治疗方案是
- 奥美拉唑 + 枸橼酸铋钾 + 克拉霉素
 - 西咪替丁 + 克拉霉素 + 左氧氟沙星
 - 奥美拉唑 + 阿莫西林 + 替硝唑 + 枸橼酸铋钾
 - 奥美拉唑 + 硫糖铝
 - 法莫替丁 + 阿莫西林 + 克拉霉素 + 铝碳酸镁
79. 女, 72 岁。腹部绞痛 4 小时, 伴腹胀, 无呕吐、发热。下消化道 X 线钡剂造影见直肠上段钡剂受阻, 钡影尖端呈“鸟嘴”形。最可能的诊断是
- 直肠癌
 - 乙状结肠癌
 - 小肠扭转
 - 乙状结肠扭转
 - 肠套叠
80. 男, 72 岁。胃大部切除毕 I 式吻合术后 6 天, 有肛门排气后开始进流质物质饮食, 进食后腹胀并呕吐, 呕吐物中含胆汁。查体: 心肺未见明显异常, 腹部可见胃型, 无蠕动波。腹部 X 线片示残胃内大量液体潴留。最可能的原因是
- 残胃蠕动功能障碍
 - 吻合口不全梗阻
 - 吻合口水肿
 - 近端空肠逆流
 - 远端空肠梗阻
81. 男, 45 岁。上腹痛伴烧心 4 年。多在餐后约 1 小时出现剑突下疼痛, 1~2 小时后可缓解。内科规范治疗 1 年, 症状反复发作, 曾有 2 次黑便。胃镜及 X 线钡剂造影均在胃角处见直径 1.6cm 大小溃疡, 决定手术治疗。首选的术式为
- 胃大部切除毕 I 式吻合术
 - 选择性迷走神经切断术加引流术
 - Roux-en-Y 吻合术加速走神经干切断术
 - 胃大部切除毕 II 式吻合术
 - 高选择性迷走神经切断术加引流术
82. 女, 21 岁。腹痛、呕吐 3 小时。进食生冷食物后出现上腹痛伴恶心、剧烈呕吐, 呕吐物初为胃内容物, 后为少量鲜血。引起呕血最可能的原因是
- 急性糜烂出血性胃炎
 - 食管贲门黏膜撕裂综合征
 - 应激性溃疡
 - 十二指肠合并出血
 - 反流性食管炎合并出血
83. 女, 55 岁。上腹胀痛 8 个月, 突发剧痛 2 小时。查体: T 36.5°C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg, 消瘦、贫血貌, 左锁骨上淋巴结肿大 1.8cm × 1.5cm, 质硬, 无压痛。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 全腹肌紧张, 上腹明显压痛、反跳痛。立位腹部 X 线平片可见膈下游离气体。下一步治疗最合理的术式为
- 姑息性胃大部切除术
 - 胃造瘘术
 - 胃癌根治术
 - 穿孔修补术
 - 胃空肠吻合术
84. 男, 32 岁。聚餐后出现右上腹疼痛 2 天, 向右肩胛区放射。查体: T 37.5°C, P 90 次/分, R 22 次/分, BP 130/80mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率 90 次/分, 心律齐, 右上腹肌紧张, 压痛(+), Murphy 征(+). 最可能的诊断是
- 急性胃炎
 - 右肾结石
 - 十二指肠球部溃疡
 - 急性胰腺炎
 - 急性胆囊炎
85. 男, 32 岁。腹泻 3 个月。大便每日 7~10 次, 稀便, 无脓血黏液, 伴乏力, 体重减轻 5kg。患者 7 年

前曾到东南亚某国打工 3 年。查体:慢性病容,肛
门周围有疱疹,疱疹内容物镜检查偶见白细胞。
最可能的诊断是

- A. 艾滋病
- B. 慢性菌痢
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 慢性肠炎
- E. 结肠癌

86. 男,55 岁。车祸伤,现场查体:T 36.5℃, P 100 次/
分,R 22 次/分,BP 100/60mmHg,意识模糊,呼吸
浅促,右侧额部皮肤裂口 1cm,裂口内见搏动性出
血,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,腹
软,无压痛。现场紧急的止血方法是

- A. 指压法
- B. 填塞法
- C. 止血带法
- D. 三角巾包扎法
- E. 局部止血剂

87. 男,62 岁。上腹胀伴食欲下降 4 年。查体:
T 36.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 130/
80mmHg。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心
律齐,腹软,无压痛。胃镜检查:胃黏膜菲薄,可见
血管显露。血常规提示大细胞性贫血,血抗壁细
胞抗体阳性。最可能的诊断是

- A. 慢性萎缩性胃炎
- B. 慢性淋巴细胞性胃炎
- C. 消化性溃疡
- D. 慢性浅表性胃炎
- E. 慢性萎缩性胃炎

88. 女,21 岁。早晨被发现昏睡不醒,枕头旁边有呕吐
物。同寝室人有头晕、乏力、恶心症状,房间用煤
炉取暖。既往体健。查体:T 35.6℃, P 100 次/
分, R 26 次/分, BP 120/75mmHg。神志不清,双侧瞳
孔等圆等大,对光反射存在,心、肺检查未见异常,
无颈强直,病理反射未引出。为明确诊断,最有意
义的检查是

- A. 脑脊液常规检查
- B. 头颅 CT
- C. 血碳氧血红蛋白浓度测定
- D. 血及呕吐物毒物检查
- E. 全血胆碱酯酶活力测定

89. 男,55 岁。间断少尿、腹胀 1 年,腹痛、低烧 1 周。
既往肝炎肝硬化病史 15 年。查体:T 37.5℃, P 84
次/分, R 18 次/分, BP 90/60mmHg。双肺呼吸音
清,未闻及干湿啰音,心律齐,腹膨隆,全腹轻压
痛,无反跳痛,移动性浊音阳性。腹水常规:比重
1.017,蛋白 28g/L,细胞总数 $920 \times 10^6/L$,白细胞
数 $800 \times 10^6/L$,多形核细胞 0.80。最可能的诊

断是

- A. 肝肾综合征
- B. 自发性腹膜炎
- C. 原发性肝癌
- D. 门静脉血栓形成
- E. 结核性腹膜炎

90. 女,65 岁。阵发性腹痛、腹胀、停止排气排便 2 天。
既往有类似发作,程度较轻,未诊治。查体:P 100
次/分,BP 110/70mmHg,双肺呼吸音清,未闻及干
湿性啰音,心率 100 次/分,心律齐。腹肌紧张,压
痛明显,反跳痛阳性,移动性浊音阳性。最可能的
诊断是

- A. 不全性粘连性肠梗阻
- B. 单纯性机械性肠梗阻
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 麻痹性肠梗阻
- E. 完全性高位肠梗阻

91. 男,32 岁。左上腹被撞伤后钝痛 1 天,突发腹痛加
重 3 小时。查体:P 140 次/分,BP 60/45mmHg,面
色苍白,四肢厥冷,双肺呼吸音清,心率 140 次/
分,上腹中度压痛,肌紧张,移动性浊音(+).腹
腔穿刺抽出不凝血。最可能的诊断是

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂
- C. 结肠破裂
- D. 小肠破裂
- E. 胃破裂

92. 男,62 岁。全麻下腹膜后肿瘤切除术后 3 日,晨起
剧烈咳嗽后觉腹部切口剧痛。查体:生命体征平
稳,切口敷料湿透。检查切口更换敷料发现小肠
自伤口膨出。在病房中的紧急处理措施正确的是

- A. 局麻下全层缝合伤口
- B. 立即还纳小肠
- C. 无菌盐水清洗后还纳小肠
- D. 局麻下分层缝合伤口
- E. 无菌敷料覆盖小肠及伤口

93. 女,45 岁。甲状腺癌根治术后 1 天。感觉面部针
刺样麻木,间断手足抽搐。正确的处理措施是

- A. 口服葡萄糖酸钙
- B. 静脉注射钙剂
- C. 气管切开
- D. 口服维生素 D₃
- E. 伤口切开

94. 男,32 岁。多次于饮酒后关节红肿疼痛发作,累及
的关节包括第一跖趾关节、踝或膝关节。该患者
最可能出现的检查结果是

- A. 血 HLA - B27 (+)
- B. 血尿酸水平升高

- C. X线片示骺骨关节炎
D. 尿渗透压降低
E. 关节腔穿刺液呈脓性
95. 女, 55岁。上腹隐痛、皮肤巩膜黄染1个月, 呈进行性加重, 伴乏力、食欲不振。查体: T 36.5℃, P 80次/分, R 18次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率80次/分, 心律齐, 腹部膨隆, 腹软, 未触及包块, 肠鸣音减弱。血CA199和CEA增高。为明确诊断和设计手术方案, 最有意义的检查方法是
- A. 腹部B超
B. 腹部MRL
C. 上消化道钡剂造影
D. 腹部增强CT
E. ERCP
96. 男, 26岁。因肠系膜血管缺血性疾病行小肠近全切除术后2个月, 术后第2天开始接受全胃肠外营养支持治疗。现患者出现皮肤干燥、鳞状脱屑、脱发及伤口愈合延迟。其最可能的原因是营养液中缺乏
- A. 维生素A
B. 电解质
C. 微量元素
D. 必需脂肪酸
E. 氨基酸
97. 男, 12岁。持续发热1周。体温39℃左右, 伴畏寒, 无寒战, 伴有全身不适、乏力, 食欲差, 病情逐渐加重并出现红疹1天来诊。查体: 躯干部出现少许淡红色小斑丘疹, 压之褪色。初步考虑诊断为
- A. 水痘
B. 麻疹
C. 天花
D. 伤寒
E. 猩红热
98. 女, 35岁。右下腹痛、便秘1年。查体: T 36.5℃, P 80次/分, R 16次/分, BP 110/70mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。结肠镜检查: 回肠末端及升结肠起始部多发纵行溃疡, 溃疡间黏膜大致正常, 病变呈节段性。PPD试验阴性。最可能的诊断是
- A. 克罗恩病
B. 阿米巴肠病
C. 肠结核
D. 溃疡性结肠炎
E. 结肠癌
99. 男, 45岁。慢性腹泻6年。每日大便3~4次, 便中有少量黏液脓血, 抗生素治疗无效。查体: T 36.5℃, P 80次/分, R 18次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。结肠镜检查: 直肠、乙状结肠多发糜烂及浅溃疡。首选的药物是
- A. 口服巯唑嘌呤
B. 口服柳氮磺吡啶
C. 静脉应用环孢素
D. 口服泼尼松
E. 静脉应用甲泼尼龙
100. 男, 55岁。10年前诊断为肝炎肝硬化, 3年前行门腔静脉分流术, 2天前出现睡眠倒错、计算能力下降。该患者不宜进食的食物种类是
- A. 淀粉类食物
B. 低脂饮食
C. 高维生素食物
D. 高纤维素食物
E. 高蛋白饮食
101. 女, 72岁。腹痛6小时进食油腻食物后突发腹痛, 以中上腹部为著。查体: P 110次/分, BP 110/60mmHg。右上腹部可触及表面光滑包块, 有压痛。首选的检查是
- A. 逆行胰胆管造影
B. 腹部B超
C. 上消化道X线钡剂造影
D. 腹部X线平片
E. 胃镜
102. 男, 45岁。食欲减退6天。实验室检查: 血ALT 438U/L, TBiL 56μmol/L, PTA 88%, HBV DNA 4.5×10^6 copies/ml。其肝脏最可能的病理表现是
- A. 肝细胞大块坏死
B. 淋巴细胞浸润
C. 肝细胞点状、灶状坏死
D. 中性粒细胞聚集
E. 肝细胞水肿
103. 男, 32岁。发热、乏力、纳差、腹胀2个月。体温最高T 37.9℃。查体: T 37.5℃, P 80次/分, R 18次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹壁柔韧感, 移动性浊音阳性。实验室检查: 血沉60mm/h, 腹水: 比重1.025, 蛋白35g/L, 白细胞 $850 \times 10^6/L$, 单核0.80, 多核0.20。首先考虑的诊断是
- A. 结核性腹膜炎
B. Budd-Chiari综合征
C. 肝硬化并原发性腹膜炎
D. 系统性红斑狼疮
E. 腹膜转移癌
104. 男, 55岁。上腹胀痛伴恶心3天, 右下腹痛阵发加剧、腹胀半天。既往体健。查体: T 38.3℃, P

120 次/分, BP 150/90mmHg。全腹压痛(+), 右下腹明显有肌紧张, 肝浊音界存在, 未闻及肠鸣音。实验室检查: 血 WBC $13.0 \times 10^9/L$, N 0.88。右下腹穿刺抽出黄色混浊液体 2ml, 镜检脓细胞(++)。最可能的诊断是

- A. 阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎
- B. 伤寒肠穿孔并弥漫性腹膜炎
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 消化性溃疡穿孔并弥漫性腹膜炎
- E. 重症急性胰腺炎

105. 女, 55 岁。里急后重伴排便不尽感 5 个月, 大便

带血近 1 个月, 查体: T 36.5°C , P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心率 80 次/分, 心律齐, 腹软, 无压痛, 直肠指诊: 膝胸位, 进指 6cm, 于直肠右侧壁触及柔软光滑有包块。对于诊断最有意义的检查是

- A. 经阴道 B 超
- B. 盆腔 CT
- C. 结肠 X 线钡剂灌肠检查
- D. 经直肠 B 超
- E. 结肠镜

A3/A4 型选择题 (106—138 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(106—107 题共用题干)

男, 32 岁。后背及双上臂沸水烫伤 4 小时, 查体: T 37.4°C , P 100 次/分, R 20 次/分, BP 130/90mmHg, 意识清楚, 后背及双上臂背侧红肿明显, 大量水疱, 基底发红, 疼痛明显。

106. 该患者皮肤烧成的深度和分度

- A. 浅 II° 中度烧伤
- B. 深 II° 轻度烧伤
- C. 深 II° 重度烧伤
- D. 浅 II° 轻度烧伤
- E. 深 II° 中度烧伤

107. 对该患者创面的处理措施正确的是

- A. 干燥无菌纱布覆盖包扎
- B. 70% 酒精消毒创面
- C. 剪除水疱的皮
- D. 患肢包扎固定
- E. 穿刺抽出水疱液

(108—109 题共用题干)

男, 45 岁。1 个月前出现腹胀, 无呕吐, 伴发热, 体温最高 38°C , 夜间盗汗, 12 小时前突发腹部绞痛, 未排气排便, 查体: T 37.7°C , P 88 次/分, R 16 次/分, BP 110/80mmHg, 心肺查体未见异常, 腹部呈揉面感, 可见肠型及蠕动波, 肠鸣音亢进。

108. 该患者最可能的诊断是

- A. 淋巴瘤合并肠梗阻
- B. 家族性息肉病
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 结肠癌合并肠梗阻
- E. 结核性腹膜炎合并肠梗阻

109. 目前该患者首选的检查是

- A. 血沉
- B. 结肠镜
- C. 立位腹部 X 线平片
- D. 腹部 B 超
- E. 腹部 CT

(110—112 题共用题干)

女, 72 岁。胃癌根治术后第 6 天, 出现上腹剧烈疼痛, 逐渐加重, 伴恶心, 呕吐, 腹胀, 腹腔引流管引出咖啡色浑浊液体。查体: 腹膜刺激征(+). 腹部 B 超提示腹腔积液。

110. 最可能的诊断是

- A. 肠系膜血管缺血性疾病
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- E. 吻合口漏

111. 应采取的治疗措施中不包括

- A. 进食
- B. 应用生长抑素
- C. 肠外营养支持
- D. 吗啡止痛
- E. 胃肠减压

112. 针对该患者, 非手术中最重要的措施是

- A. 低压灌肠
- B. 止痛
- C. 胃肠减压
- D. 洗胃
- E. 抗生素治疗

(113—114 题共用题干)

男,45岁。因急性坏疽性阑尾炎行阑尾切除术后第10天,出现发热,体温39.2℃。伴腹胀、恶心,肛门有下坠感,里急后重,曾排便4次,为黏液样便。

113. 此时首先应选用的检查是

- A. 腹部X线平片
- B. 粪培养
- C. 血常规
- D. 腹部B超
- E. 直肠指检

114. 诊断明确后,除抗感染和支持疗法外,以下处理措施首选

- A. 腹部透热理疗
- B. 温盐水加甲硝唑保留灌肠
- C. 经直肠穿刺抽液定位后切开引流
- D. 经原麦氏切口进入腹腔引流
- E. 经下腹正中切口进入腹腔引流

(115—116题共用题干)

女,35岁。腹泻、纳差、乏力、发热5月余。大便为黄色糊状,无黏液及脓血,3~5次/日,体温37.5~38.0℃。发病以来体重减轻约8kg。

115. 下列辅助检查最有助于明确诊断的是

- A. 腹部CT
- B. 结肠镜及黏膜活组织病理检查
- C. 胶囊内镜
- D. 下消化道X线钡剂造影
- E. PPD试验

116. 最可能的诊断是

- A. 阿米巴肠病
- B. 结肠癌
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 肠结核
- E. 克罗恩病

(117—118题共用题干)

男,55岁。颈后肿痛5天。疼痛逐渐加重,伴畏寒、发热。既往糖尿病病史10年。查体:T 38.5℃,P 90次/分,R 18次/分,BP 120/80mmHg,颈后红肿,范围约5cm,边界不清,中央多个脓点。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐。

117. 该患者最可能的诊断是

- A. 皮脂腺囊肿感染
- B. 疖
- C. 疔
- D. 急性蜂窝织炎
- E. 丹毒

118. 若行切开引流术,下列处理措施错误的是

- A. 切口要深达筋膜
- B. 切口长度不要超过病变边缘
- C. 可行“++”形切口切开引流

D. 未化脓但失活的组织也要清除

E. 术后创面内填塞敷料压迫止血

(119—121题共用题干)

男,32岁。发热、头痛伴呕吐2天,意识障碍半天,于8月20日就诊。查体:T 39.6℃,P 130次/分,R 23次/分,BP 125/70mmHg,浅昏迷,皮肤未见瘀点,颈抵抗(+),Kernig征(+),Babinski征(+)。实验室检查:血WBC $16.0 \times 10^9/L$,N 0.73,L 0.27。

119. 最可能的诊断是

- A. 结核性脑膜炎
- B. 流行性乙型脑炎
- C. 新型隐球菌脑膜炎
- D. 病毒性脑炎
- E. 流行性脑脊髓膜炎

120. 对明确诊断最有价值的检查是

- A. 头颅CT
- B. 血清特异性IgM
- C. 脑脊液培养
- D. 隐球菌抗原
- E. 血培养

121. 目前迫切需要采取的措施是

- A. 静脉滴注抗生素
- B. 物理降温
- C. 快速静脉滴注甘露醇
- D. 静脉高营养
- E. 快速镇静

(122—124题共用题干)

男,72岁。1年来阵发性腹痛,自觉有“气块”在腹中窜动,大便次数增加,近3个月腹胀、便秘,近3天无肛门排气、排便,呕吐物有粪便臭味,伴乏力、低热。

122. 根据病史考虑肠梗阻类型为

- A. 低位不完全梗阻
- B. 高位完全梗阻
- C. 高位不完全梗阻
- D. 低位完全梗阻
- E. 血运性肠梗阻

123. 引起该患者梗阻的病因最可能的是

- A. 粪块
- B. 肿瘤
- C. 炎性狭窄
- D. 肠系膜血栓
- E. 粘连带

124. 禁忌使用的检查是

- A. 结肠镜
- B. 腹部CT
- C. 腹部B超

- D. 上消化道 X 线钡剂造影
- E. 腹部 X 线平片

(125—126 题共用题干)

男,45 岁。近 3 个月自觉轻度乏力。母亲 HBsAg (+)。实验室检查:血 ALT 420U/L, TBiL 64 μ mol/L, PTA 88%, HBsAg(+), HBeAg(+), 抗 HBc(+), HBV DNA 4.5 \times 10⁵copies/ml。

125. 首选的治疗药物是
- A. 恩替卡韦
 - B. 护肝片
 - C. 茵栀黄口服液
 - D. 甘草酸二胺
 - E. 干扰素
126. 化验结果正常后的随访问隔时间最好是
- A. 30 天
 - B. 15 天
 - C. 180 天
 - D. 60 天
 - E. 90 天

(127—128 题共用题干)

女,35 岁。间断腹痛、腹泻 5 年。发作时大便 3~5 次/日,带黏液,无脓血,便后腹痛缓解,受凉及紧张后症状加重,无发热,抗生素治疗无效,发病以来体重无明显变化。粪隐血试验阴性。

127. 为确定诊断,首选的检查是
- A. 小肠 X 线钡剂造影
 - B. 腹部 CT
 - C. 结肠镜
 - D. 粪细菌培养
 - E. 腹部 B 超
128. 最可能的诊断是
- A. 溃疡性结肠炎
 - B. 克罗恩病
 - C. 慢性细菌性痢疾
 - D. 肠结核
 - E. 肠易激综合征

(129—130 题共用题干)

女,55 岁。左乳房包块半年。乳房无不适,有时感左肩背部隐痛。查体:双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,腹软,无压痛。左乳房外上象限可触及 3cm \times 2cm 包块,质硬,不光滑,活动,无压痛。左腋窝触及 3 枚肿大淋巴结。乳腺钼靶摄片:左乳房 2.5cm \times 2.0cm 高密度影,周边有毛刺,中央有细沙样钙化点。

129. 拟行手术治疗,预防术后感染最重要的措施是
- A. 安置有效的术后引流
 - B. 术前、术中、术后应用广谱抗生素
 - C. 遵守无菌操作

- D. 缝合前彻底冲洗
- E. 术前纠正贫血和低蛋白血症

130. 【假设信息】患者术后 2 年出现腰背部疼痛,逐渐加重,为明确诊断首选的主要检查是

- A. 血 CEA
- B. 血 CA153
- C. 免疫指标检测
- D. 同位素骨扫描
- E. PET-CT

(131—133 题共用题干)

男,55 岁。上腹疼痛 8 小时,进食高脂餐并饮酒后出现上腹痛,呕吐 2 次后疼痛无缓解。查体:T 37.8 $^{\circ}$ C,巩膜轻度黄染,心肺未见异常,上腹偏左压痛、反跳痛阳性。

131. 最有诊断意义的辅助检查是
- A. 心电图
 - B. 血常规
 - C. 血清脂肪酶
 - D. 血清淀粉酶
 - E. 立位腹部 X 线平片

132. 最可能的诊断是

- A. 急性心肌梗死
- B. 急性胰腺炎
- C. 肠梗阻
- D. 急性胃炎
- E. 急性胆囊炎

133. 若血 WBC 17.5 \times 10⁹/L, N 0.85, 抗生素选择的最佳配伍是甲硝唑和

- A. 环丙沙星
- B. 青霉素
- C. 阿奇霉素
- D. 克林霉素
- E. 亚胺培南

(134—135 题共用题干)

女,45 岁。双手近端指间关节,双腕和双踝关节肿痛 5 个月。查体:双手近端指间关节压痛(+),实验室检查:ESR 45mm/h, RF 阳性,抗环瓜氨酸肽抗体阳性。

134. 最可能的诊断是

- A. 骨关节炎
- B. 类风湿性关节炎
- C. 痛风性关节炎
- D. 脊柱关节炎
- E. 系统性红斑狼疮

135. 控制病情进展首选的药物是

- A. 甲氨蝶呤
- B. 布洛芬

- C. 阿司匹林
- D. 环磷酰胺
- E. 泼尼松

(136—138 题共用题干)

男,32岁。反复皮肤紫癜1个月,加重并腹痛2天。查体:四肢皮肤散在紫癜,心肺未见异常,腹平软,脐周轻压痛,无反跳痛和肌紧张,肝脾肋下未触及,肠鸣音6次/分。临床诊断为过敏性紫癜。

136. 根据目前的临床资料,首选考虑最可能的临床类型是
- A. 单纯型
 - B. 肾型
 - C. 混合型
 - D. Schonlein 型

E. Henoch 型

137. 可证实上述诊断类型的检查结果是

- A. 大关节肿胀,有压痛
- B. 尿常规异常(血尿、蛋白尿、管型尿)
- C. 粪常规异常(有红细胞,隐血阳性)
- D. 粪隐血阳性、尿沉渣镜检红细胞6~8/HP
- E. 毛细血管脆性试验

138. 该患者目前不适合的治疗药物是

- A. 维生素C
- B. 泼尼松
- C. 芦丁片
- D. 山莨菪碱
- E. 低分子肝素

B1 型选择题(139—150 题)**答 题 说 明**

以下提供若干组试题,每组试题共用在试题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(139—140 题共用备选答案)

- A. 血间接胆红素升高,直接胆红素正常
- B. 尿胆原弱阳性,尿胆红素阴性
- C. 尿含铁血黄素阳性
- D. 血直接,间接胆红素均升高,尿胆原阳性
- E. 血直接胆红素升高,尿胆原阴性

139. 与肝细胞性黄疸检查结果符合的是
140. 与梗阻性黄疸检查结果符合的是

(141—142 题共用备选答案)

- A. 苍白密螺旋体
- B. 淋病奈瑟菌
- C. 人乳头瘤病毒
- D. 沙眼衣原体
- E. 单纯疱疹病毒

141. 导致生殖道尖锐湿疣并且与宫颈癌发病有关的病原体是
142. 引起生殖器水泡样病变的病原体是

(143—144 题共用备选答案)

- A. 羊
- B. 犬
- C. 啮齿动物
- D. 猪
- E. 病人

143. 肾综合征出血热的传染源是
144. 流行性乙型脑炎的传染源是

(145—146 题共用备选答案)

- A. 肝左下后间隙
- B. 肝左上间隙
- C. 肝右下间隙
- D. 肝左下前间隙
- E. 肝右上间隙

145. 网膜囊位置在
146. 位于肝胃韧带和胃前方的间隙为

(147—148 题共用备选答案)

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 单纯性肠梗阻
- C. 痉挛性肠梗阻
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 机械性肠梗阻

147. 急性小肠扭转一般应及时手术治疗,因为其易发生
148. 外伤性腹膜后巨大血肿易发生

(149—150 题共用备选答案)

- A. 假性粒细胞减少
- B. Felty 综合征
- C. 低增生性白细胞
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 骨髓增生异常综合征

149. 由免疫机制引起中性粒细胞减少的疾病是
150. 由分布异常引起中性粒细胞减少的疾病是

第四单元

A1 型选择题 (1—35 题)

答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 肾脏在胎儿期合成较多的激素是
 - 前列腺素
 - 肾素
 - $1,25-(OH)_2-D_3$
 - 促红细胞生成素
 - 利钠激素
- 下列属于对冲性脑挫裂伤的是
 - 额部着力出现额叶的损伤
 - 枕部着力出现枕叶的损伤
 - 左颞顶着力出现左顶叶的损伤
 - 着力点处大脑凸面的损伤
 - 左枕着力出现右额颞极的损伤
- 左侧小脑幕切迹疝最确切的解释是
 - 左侧基底节受压左移
 - 脑干受压左移
 - 左侧颞叶钩回通过小脑幕切迹被推挤至幕下
 - 左侧小脑幕的移位
 - 左侧小脑幕挤压脑干
- 临床少见而产妇病死率极高的分娩期并发症是
 - 子痫
 - 脐带脱垂
 - 子宫破裂
 - 产后出血
 - 羊水栓塞
- 符合希恩综合征诊断的是
 - $LH/FSH \geq 2$
 - PRL 正常, $FSH > 40U/L$
 - FSH, LH 均 $< 5U/L$
 - $PRL > 25 \mu g/L$
 - FSH, LH 均 $> 10U/L$
- 脑干胶质瘤最早出现的临床表现常为
 - 颅神经麻痹
 - 脑积水
 - 头痛
 - 癫痫
 - 视盘水肿
- 下列属于过期妊娠引产指征的是
 - 估计胎儿体重大于 4 500g
 - 高龄初产妇
 - 宫颈条件成熟,胎头已经衔接
 - 胎儿宫内窘迫
 - CST 和 OCT 评估为三类
- 下列关于羊水的叙述,正确的是
 - 妊娠中期主要来源于胎盘
 - 母体与羊水的交换主要通过脐带
 - 胎儿吞咽可以使羊水量趋于平衡
 - 早期羊水主要来自胎儿尿液
 - 妊娠晚期胎儿的肝脏参与羊水的生成
- 新生儿 Apgar 评分指标不包括
 - 体温
 - 肌张力
 - 皮肤颜色
 - 呼吸
 - 心率
- 对先天性巨结肠,既简单又具有诊断价值的检查是
 - 钡剂灌肠
 - 直肠黏膜活组织检查
 - 肌电图检查
 - 腹部立位 X 线平片
 - 直肠肛门测压
- 每克营养物质供能最高的是
 - 矿物质
 - 蛋白质
 - 膳食纤维

- D. 糖类
E. 脂类
12. 大型室间隔缺损后期出现青紫时,肺血管的主要改变是
A. 梗阻型肺动脉高压
B. 动力型肺动脉高压
C. 肺动脉痉挛
D. 肺血增多
E. 肺血减少
13. 关于子宫内膜癌的转移途径错误的是
A. 宫底部癌灶可经骨盆漏斗韧带淋巴管网向上至腹主动脉旁淋巴结
B. 子宫角部癌灶可沿圆韧带转移至腹股沟淋巴结
C. 盆、腹腔播散种植为最常见途径
D. 血行转移较少见,晚期可致肺、肝、骨髓
E. 下段及宫颈管癌灶可至宫旁、闭孔、髂内、髂外及髂总淋巴结
14. 不符合典型热性惊厥表现的是
A. 多数呈全身性强直-阵挛性发作
B. 初期体温骤升达 39℃
C. 惊厥复发总次数 ≤ 4 次
D. 发作后短暂嗜睡
E. 惊厥持续 > 10 分钟
15. 双胎妊娠的并发症不包括
A. 产程延长
B. 产后出血
C. 早产
D. 巨大胎儿
E. 妊娠期高血压疾病
16. 成分输血的优点不包括
A. 容易制备
B. 疗效好
C. 纯度高
D. 便于保存
E. 保护血液资源
17. 极低出生体重儿的标准是指婴儿出生后 1 小时内的体重低于
A. 2 000g
B. 800g
C. 1 500g
D. 1 000g
E. 2 500g
18. 关于子宫下段的说法错误的是
A. 临产后长达 7~10cm
B. 由非妊娠时的子宫峡部伸展形成
C. 位于宫颈内口与外口之间
D. 临产后是软产道的一部分
E. 至妊娠晚期形成
19. 下列不属于产前诊断方法的是
A. 绒毛穿刺取样
B. 血清学测甲胎蛋白
C. 羊水穿刺
D. 经皮脐血穿刺
E. 胚胎植入前诊断
20. 抢救脑型中毒型细菌性痢疾,首选的治疗措施是
A. 应用血管活性药物
B. 降颅压,利尿
C. 应用抗凝药物
D. 应用糖皮质激素
E. 应用抗生素
21. 属于盆底内层(即盆膈)肌肉的是
A. 球海绵体肌
B. 会阴深横肌
C. 肛提肌
D. 坐骨海绵体肌
E. 肛门外括约肌
22. 关于小儿维生素 D 缺乏性佝偻病的预防措施,不正确的是
A. 适当多晒太阳
B. 孕妇补充维生素 D 及钙剂
C. 早产儿 2 个月时开始补充维生素 D
D. 提倡母乳喂养
E. 及时添加辅食
23. 属于盆腔炎性疾病诊断特异性标准(2010 年美国 CDC 诊断标准)的是
A. 宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛
B. 实验室证实的宫颈淋病奈瑟菌或衣原体阳性
C. 宫颈或阴道异常黏液脓性分泌物
D. 阴道分泌物生理盐水涂片见大量白细胞
E. 经阴道超声或磁共振检查显示输卵管增粗,输卵管积液
24. 下列引起原发性闭经的疾病是
A. 空蝶鞍综合征
B. Turner 综合征
C. 神经性厌食
D. Asherman 综合征
E. 咽颅管瘤

25. 不属于延髓背外侧综合征临床表现的是
- A. 眩晕, 眼球震颤
 - B. 饮水呛咳, 吞咽困难
 - C. 交叉性感觉障碍
 - D. 锥体束征阳性
 - E. 同侧肢体共济失调
26. 不符合小儿先天性肥厚型幽门狭窄临床特点的是
- A. 呕吐物常含胆汁
 - B. 多于生后 2~4 周发病
 - C. 右季肋区下可触及橄榄样肿块
 - D. 少数病人有黄疸
 - E. 常见左向右的胃蠕动波
27. 躯体疾病所致精神障碍的处理原则不正确的是
- A. 对精神症状的控制应遵从大剂量, 足疗程的原则
 - B. 维持水电解质平衡, 充足的营养供应等支持治疗
 - C. 要考虑治疗药物对病人的副作用
 - D. 安静, 安全的环境和防止意外发生等护理措施
 - E. 首先必须治疗引起精神障碍的原发躯体疾病
28. 儿童重症肌无力的临床特点是
- A. 严重全身肌无力
 - B. 易发生延髓肌瘫痪
 - C. 局限于四肢肌无力
 - D. 多局限于眼外肌瘫痪
 - E. 易发生重症肌无力危象
29. 决定法洛四联症临床严重程度及预后的主要因素是
- A. 主动脉骑跨
 - B. 右心室肥大
 - C. 室间隔缺损
 - D. 肺动脉狭窄
 - E. 主动脉狭窄
30. 观察铁剂治疗缺铁性贫血是否有效的早期指标
- A. 血红蛋白上升
 - B. 红细胞数上升
 - C. 网织红细胞上升
 - D. 血清转铁蛋白饱和度增加
 - E. 血清铁蛋白增加
31. 左上睑下垂, 左眼内收及上下视受限, 左瞳孔散大, 直接、间接对光反射均消失, 病变部位是
- A. 视神经
 - B. 展神经
 - C. 动眼神经
 - D. 三叉神经
 - E. 滑车神经
32. 小儿抗风湿热治疗, 早期使用糖皮质激素的指征
- A. 舞蹈病
 - B. 多关节炎
 - C. 环形红斑
 - D. 皮下小结
 - E. 心肌炎
33. 子宫颈癌的始发部位通常是
- A. 子宫颈组织学内口区
 - B. 子宫颈管柱状上皮区
 - C. 子宫颈移行带区
 - D. 子宫颈解剖学内口区
 - E. 子宫颈鳞状上皮区
34. 关于精神病学中正确的是
- A. 5-羟色胺递质紊乱是躁狂发作的病因
 - B. 性格缺陷是焦虑障碍的主要病因
 - C. 精神障碍均主要由心理因素导致
 - D. 极具严重的精神刺激是急性应激障碍发病的直接原因
 - E. 生活事件是精神分裂症发病的主要因素
35. 下列属于酒精戒断综合征的是
- A. 震颤谵妄
 - B. 酒精性痴呆
 - C. 酒精所致幻觉症
 - D. 柯萨可夫综合征
 - E. Wernicke 脑病
36. 下列药物中可用于预防偏头痛发作的是
- A. 麦角氨咖啡因
 - B. 地西洋
 - C. 甲灭酸
 - D. 普萘洛尔
 - E. 舒马曲普坦
37. 左向右分流型先天性心脏病出现显著肺动脉高压时主要改变为
- A. 左心室增大
 - B. 右心室增大
 - C. 左心房增大
 - D. 右心房增大
 - E. 左心房, 左心室增大
38. 下列属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是
- A. 文拉法辛
 - B. 托莫西汀
 - C. 氟西汀

- D. 米氮平
E. 利培酮
39. 母乳与牛乳相比,对母乳特点的描述中错误的是
A. 含饱和脂肪酸较多
B. 乳糖含量高
C. 含白蛋白多,酪蛋白少
D. 钙磷比例适宜
E. 铁吸收率高
40. 产后出血最常见的病因是
A. 子宫收缩乏力
B. 胎盘滞留
C. 急性肝炎
D. 软产道损伤
E. 血液系统疾病
41. 颅内肿瘤若表现为精神症状,常考虑的肿瘤部位为
A. 小脑
B. 顶叶
C. 额叶
D. 枕叶
E. 岛叶
42. 关于正常产褥期临床表现的叙述正确的是
A. 体温在产后 24 小时内一般升高超过 38°C
B. 产后宫缩痛多见于初产妇
C. 产后 1 周以后出现褥汗
D. 产后第 1 日子宫底略上升达脐平
E. 产后 14 日子宫底位于脐下 2 横指
43. 有关足月新生儿病理性黄疸的特点错误的是
A. 血清总胆红素 $>221\mu\text{mol/L}$
B. 生后 24 小时内出现黄疸
C. 黄疸持续时间 >2 周
D. 黄疸退而复现
E. 血清结合胆红素 $<34\mu\text{mol/L}$
44. 维持阴道微生态平衡最重要的菌群是
A. 乳酸杆菌
B. 厌氧菌
C. 加德纳菌
D. 肠球菌
E. 念珠菌
45. 属于药物流产禁忌证的是
A. 妊娠剧吐
B. 瘢痕子宫
C. 宫颈发育不良
D. 严重骨盆畸形
E. 哺乳期妊娠
46. 小儿初次感染结核杆菌结核菌素,实验呈阳性反应的时间是
A. 12~16 周
B. 2~3 周
C. 4~8 周
D. 48~72 小时
E. 8~12 周
47. 无排卵性功能失调性子宫出血的特点是
A. 基础体温双相,月经周期长,经期正常
B. 基础体温双相,月经周期短,经期正常
C. 基础体温双相,月经周期正常,经期延长
D. 基础体温单相,月经周期紊乱,经期长短不一
E. 基础体温双相,月经周期正常,经期长短不一
48. 先兆早产的主要临床表现是
A. 规则宫缩 60 分钟内 ≥ 8 次伴有宫颈管的进行性改变
B. 规则宫缩 20 分钟内 ≥ 4 次伴有宫颈管的进行性改变
C. 宫颈扩张 1cm 以上
D. 不规则宫缩伴有宫颈管的进行性缩短
E. 宫颈展平 $\geq 80\%$

A2 型选择题 (49—100 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方格涂黑。

49. 女孩,1 岁,智力低下伴经常便秘来诊。查体:身高 65cm,头发干燥,面黄,塌鼻梁,舌体厚大,腹胀,脐部膨出。最可能的诊断是
A. 先天性甲状腺功能衰退
B. 黏多糖病
C. 先天性巨结肠

- D. 21 - 三体综合征
E. 苯丙酮尿症
50. 女孩, 2 岁。自幼体弱, 多次患肺炎。胸部 X 线片示左心房, 左心室增大, 肺野充血, 主动脉影增宽。最可能的诊断是
A. 艾森门格综合征
B. 法洛三联症
C. 动脉导管未闭
D. 房间隔缺损
E. 室间隔缺损
51. 男婴, 胎龄 38 周出生, 宫内窘迫。Apgar 评分 1 分钟 3 分。经抢救 10 分钟评分 9 分。生后 6 小时出现抽搐。首选的药物是
A. 吠塞米
B. 苯妥英钠
C. 地塞米松
D. 甘露醇
E. 苯巴比妥
52. 女孩, 5 岁。头痛, 呕吐, 步行不稳 3 个月。查体: 神志清楚, 精神差, 双侧视盘水肿。最可能的诊断是
A. 小脑髓母细胞瘤
B. 颞叶胶质母细胞瘤
C. 矢状窦旁脑膜瘤
D. 枕叶星形细胞瘤
E. 顶叶恶性淋巴瘤
53. 初产妇, 23 岁。妊娠 40 周, 临产 8 小时后出现烦躁不安, 呼吸加快, 下腹疼痛, 拒按, 胎心听不清, 查体见下腹部近肚下方一环状凹陷, 导尿为血尿。该患者最可能的诊断是
A. 急性阑尾炎
B. 重型胎盘早剥
C. 先兆子宫破裂
D. 子宫破裂
E. 羊水栓塞
54. 女, 28 岁。结婚 5 年未孕, 自月经初潮起即 35 ~ 60 天行经一次。毛发浓密, 面部痤疮明显, 身高 158cm, 体重 76kg。最可能的诊断是
A. Asherman 综合征
B. 闭经泌乳综合征
C. 多囊卵巢综合征
D. 对抗性卵巢综合征
E. 特纳综合征
55. 男孩, 14 岁。发热、腹泻 5 小时。9 小时前同学聚餐, 5 小时前开始发热、腹泻, 体温 39.2℃, 伴畏寒, 无明显寒战, 初为胃内容物。查体: T 39℃, P 100 次/分, R 20 次/分, 双肺呼吸音粗, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 下腹部有轻微压痛, 无肌紧张、反跳痛。粪镜检 WBC 20 ~ 30/HP, RBC 4 ~ 8/HP, 吞噬细胞 1 ~ 2/HP。最可能的诊断是
A. 消化功能紊乱
B. 急性肠胃炎
C. 急性细菌性痢疾
D. 轮状肠胃炎
E. 产毒性大肠埃希菌肠炎
56. 女 28 岁。妊娠 29 周。反复无痛性阴道流血 3 次。且每次出血量逐渐增多。超声诊断为前置胎盘。此患者最可能的类型是
A. 前置状态
B. 完全性
C. 部分性
D. 边缘性
E. 低置性
57. 女, 28 岁。40 分钟前自 2 楼阳台上跌下, 枕部着地, 伤后即昏迷, 入院时查体: P 50 次/分, BP 140/90mmHg。深度昏迷, 双侧瞳孔直径 5mm。对光反射迟钝, 四肢强直, 双侧 Babinski 征阳性。在急诊科静脉输入 20% 甘露醇 250ml 后。进一步有效检查是
A. 脑电图
B. 头颅 ECT
C. 头颅 X 线片
D. 头颅 MRI
E. 头颅 CT
58. 男, 57 岁。患原发性肝癌拟行肝切除术。术前血常规: Hb 70g/L, WBC $3.0 \times 10^9/L$, Plt $150 \times 10^9/L$ 。为纠正贫血, 术前给其输注红细胞。在输入约 50ml 时患者出现寒战、发热、腰痛, 头痛及心前区不适。面色潮红, 呼吸困难和焦虑不安。查体: BP 85/50mmHg。患者发生的输血不良反应最可能为
A. 急性溶血性输血反应
B. 输血相关移植物抗宿主病
C. 非溶血性发热反应
D. 肺微血管栓塞
E. 循环超负荷
59. 女婴, 10 个月。面色苍白 3 个月, 嗜睡 1 周。平时食欲差。生后羊乳喂养, 6 个月加米糊。查体: 头发稀黄, 面色苍白, 巩膜轻度黄染, 心尖部可闻及

- 2/6 级收缩期杂音,肝肋下 2cm,脾肋下未触及,最可能的诊断是
- 地中海贫血
 - 营养性巨幼细胞性贫血
 - 遗传性球形红细胞增多症
 - 缺铁性贫血
 - 再生障碍性贫血
60. 男婴,3 天。黄疸 2 天,加重伴嗜睡 1 天。无发热及惊厥。足月儿,出生体重 3 560g。查体:T 36.5℃。吸吮无力,反应差,全身皮肤及巩膜明显黄染。心肺未见明显异常,腹胀,肝肋下 2cm,实验室检查:Hb 90g/L,血清总胆红素 425 μ mol/L,最可能的诊断是
- 先天性胆道闭锁
 - 生理性黄疸
 - 新生儿溶血病
 - 母乳性黄疸
 - 新生儿肝炎
61. 男孩,2 岁。生后 6 个月发现智能发育落后,8 个月出现惊厥,尿有异味。查体:T 36.5℃,P 100 次/分,R 28 次/分。目光呆滞,毛发棕黄,心肺腹未见明显异常。膝腱反射亢进。其饮食治疗中需限制摄入量的氨基酸是
- 色氨酸
 - 精氨酸
 - 酪氨酸
 - 赖氨酸
 - 苯丙氨酸
62. 男,28 岁。1 个月来 3 次无明显诱因突发心悸,胸闷、窒息感,浑身冷汗,感觉自己快不行了,极度紧张害怕,持续 10 余分钟,每次去医院急诊,除心电图是窦性心动过速外,余无异常,事后总担心下次再发作。该患者最可能的诊断是
- 广泛性焦虑障碍
 - 恐惧性障碍
 - 分离(转换)性障碍
 - 惊恐障碍
 - 心脏病所致焦虑障碍
63. 女,45 岁。月经不规则 2 年余,阴道不规则流血 20 天。查体:中度贫血貌,子宫略大,稍软,无压痛,宫旁未触及异常。为确定诊断应首选的检查是
- 液基细胞检查
 - 阴道镜检查
 - 尿 hCG 测定
 - 盆腔 CT 检查
 - 分段刮诊
64. 女孩,1 岁。因智力发育落后来诊。查体:T 36.5℃,P 110 次/分,R 28 次/分。表情呆滞,眼距宽,眼外眦上斜,鼻梁塌,舌常伸出口外。心肺腹部未见明显异常。小指向内弯曲,通贯手。为明确诊断,首选的检查是
- 骨龄
 - 血 T₃、T₄
 - 血氨基酸分析
 - 血 TSH
 - 染色体核型分析
65. 女,23 岁。妊娠 22 周胎动消失 2 天。B 超检查:胎心消失无胎动,目前适宜处理方法是
- 观察
 - 剖宫产
 - 给予破膜后清宫
 - 利凡诺尔腔内引产
 - 等待自然流产
66. 男孩,9 岁。眼睑水肿伴少尿 3 天。茶色尿 1 天。病前 3 周曾患皮肤脓肿,疮疮。查体:P 110 次/分。BP 130/90mmHg。肝右肋下 1cm,压痛(+),双下肢明显非凹陷性水肿。目前最主要的治疗措施是
- 卡托普利
 - 青霉素
 - 限盐饮食
 - 呋塞米
 - 休息
67. 男孩,3 岁。眼睑及面部水肿 2 周。查体:全身高度水肿,凹陷性。实验室检查:血白蛋白 25g/L。总胆固醇 6.2mmol/L,尿常规蛋白(++++)。RBC 1~2 个/HP。为有利于该疾病的临床分型,首选的检查是
- 血沉
 - 补体 C3
 - ASO
 - 血电解质
 - 免疫球蛋白
68. 女,23 岁。停经 2 个月,大量阴道流血 1 天。心率 100 次/分。妇科检查见宫口有组织物排出,子宫如两个月妊娠大小。该患者的处理措施不包括
- 肌注黄体酮
 - 给予输液及止血药物
 - 查血常规

- D. 查血 β -hCG
E. 立即行清宫术
69. 女, 35 岁。初产妇, 妊娠 34 周, 心慌, 不能平卧一天。查体: P 120 次/分, R 30 次/分, BP 140/90mmHg。心界向左下扩大, 双肺满布湿啰音, 胎心率 145 次/分。正确的处理措施是
- A. 纠正心衰, 后期治疗
B. 纠正心衰同时剖宫产
C. 纠正心衰后引产
D. 纠正心衰后剖宫产
E. 纠正心衰同时破膜引产
70. 男婴, 3 个月。高热伴频繁呕吐 2 天, 嗜睡 1 天, 惊厥 2 次。查体: 精神差, 双眼凝视, 前囟隆起, 脑膜刺激征阴性。实验室检查: 血 WBC $15.0 \times 10^9/L$, N 0.88, L 0.12。最可能的诊断是
- A. 结核性脑膜炎
B. 化脓性脑膜炎
C. 热性惊厥
D. 病毒性脑炎
E. 中毒性脑病
71. 初产妇, 28 岁。妊娠 40 周临产, 规律宫缩 12 小时, 阴道流血 8 小时, 阴道检查: 宫口 7cm, 先露棘下 1cm, 下列诊断正确的是
- A. 潜伏期延长
B. 滞产
C. 第一产程延长
D. 正常活跃期
E. 胎膜早破
72. 男孩, 6 岁。高热伴剧烈咳嗽 6 天。既往体健, 规范接种疫苗。查体: 一般状况好, 无明显呼吸困难, 右中下肺呼吸音减低。胸部 X 线片示肺部薄云雾状浸润影, 右侧胸腔少许积液。实验室检查: 血 WBC $5.6 \times 10^9/L$, N 0.34, L 0.66, PPD 试验 (-)。其最可能感染的病原体是
- A. 肺炎支原体
B. 金黄色葡萄球菌
C. 结核分枝杆菌
D. 腺病毒
E. 肺炎链球菌
73. 女, 35 岁。停经 4 个月, 腹痛 1 天。有子宫肌瘤病史。妇科检查: 子宫左侧壁可触及结节状突起, 压痛明显。血 WBC $12.3 \times 10^9/L$, B 超提示: 中期妊娠, 子宫肌瘤。该患者肌瘤变性最可能是
- A. 玻璃样变
B. 红色样变
C. 钙化
D. 囊性变
E. 肉瘤样变
74. 男婴, 3 天。出生后不吃、不哭、不动, 少尿, 体温不升。胎龄 32 周早产。查体: T $34.0^{\circ}C$, 呼吸不规则, 反应低下, 皮肤黄染, 肺部呼吸音低, 心音低钝, 腹胀, 面颊、臀部、双下肢皮肤硬肿, 压之凹陷, 手足凉。最可能的诊断是
- A. 新生儿黄疸
B. 新生儿肺炎
C. 新生儿心肌炎
D. 新生儿水肿
E. 新生儿寒冷损伤综合征
75. 男, 21 岁。早晨起后全身无力 3 小时。发病前一天参加了学校 1500 米长跑, 较疲劳。去年有类似发作 2 次。均为发作 1~2 天后完全恢复。查体: 神志清, 脑神经检查无异常。双上肢肌力 4 级。双下肢肌力 2 级, 肌张力低, 腱反射对称。病理征未引出, 深浅感觉无异常。心电图示窦性心律, 出现 U 波, 最可能的诊断是
- A. 重症肌无力
B. 多发性肌炎
C. 周期性瘫痪
D. 吉兰-巴雷综合征
E. 癫痫
76. 女孩儿 3 岁。因发现双下肢畸形来诊。查体: T $36.5^{\circ}C$, P 100 次/分。轻度肋缘外翻, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。双下肢呈 O 形。可见手足镯, 骨骼 X 线检查示佝偻病活期表现。实验室检查: 血钙正常, 血磷低, 尿磷增加, 血碱性磷酸酶增高, 最可能的诊断是
- A. 维生素 D 缺乏性佝偻病
B. 维生素 D 依赖性佝偻病
C. 肾小管酸中毒
D. 肾性佝偻病
E. 低血磷抗维生素 D 佝偻病
77. 男, 35 岁。诊断为酒精所致精神障碍。入院后感到身体表面有许多虫子在皮肤上爬行, 瘙痒难忍, 焦躁不安, 此症状最可能是
- A. 幻触
B. 本体幻觉
C. 感觉过敏
D. 感觉倒错

- E. 错觉
78. 女, 28 岁。频繁发作右下颌区剧烈疼痛 3 个月, 呈闪电样, 刀割样痛, 洗脸刷牙讲话均可诱发。听力正常, 面部无麻刺感, 张口无困难, 查体: 颞颌关节无明显压痛。神经系统未见明显阳性体征。最可能的诊断是
- 牙周炎
 - 舌咽神经痛
 - 三叉神经痛
 - 腮腺炎
 - 颞颌关节紊乱
79. 女, 45 岁。急性白血病接受化疗的过程中诉食欲差、疲乏无力, 时有恶心。查体: T 37°C, P 90 次/分, R 18 次/分, BP 110/70mmHg。血常规: Hb 90g/L, RBC $3.1 \times 10^{12}/L$, WBC $5.6 \times 10^9/L$, Plt $65 \times 10^9/L$ 。患者要求输血。此时正确的处理措施是
- 输注机采血小板 1 个治疗量
 - 不予输血并向患者说明理由
 - 输注血浆 200ml
 - 输注全血 1 单位
 - 输注悬浮红细胞 1 单位
80. 女, 35 岁。近 3 年来持续表现入睡困难、精力疲乏, 常感头晕、头痛, 无愉快感, 悲观失落, 不愿意主动与人交往, 但日常生活和工作尚无困难。无兴奋话多和自我评价高, 无晨重夜轻节律变化, 无消极自杀观念和自杀行为。该患者最可能的诊断是
- 睡眠障碍
 - 社交焦虑障碍
 - 环性心境障碍
 - 单相抑郁障碍
 - 恶劣心境
81. 男婴, 10 个月。4 天前无明显诱因出现发热, 体温持续在 38~39.6°C, 应用退热药后可短暂下降, 1 天前体温恢复正常皮肤出现皮疹。查体: T 36.5°C, 颜面、颈部及躯干可见小红色斑丘疹、咽红。其最可能的诊断是
- 幼儿急疹
 - 风疹
 - 麻疹
 - 水痘
 - 猩红热
82. 男, 15 岁。四肢无力 3 天, 伴吞咽困难 1 天。大、小便正常。1 周前腹泻 2 次, 自服药物治疗好转。查体: 神志清楚, 构音障碍, 双侧闭目无力、鼻唇沟浅、鼓腮不能, 软腭上抬无力, 咽反射迟钝, 腱反射消失, 病理征未引出, 双侧手套袜子样感觉, 腓肠肌压痛(+). 诊断是
- 吉兰-巴雷综合征
 - 重症肌无力
 - 周期性瘫痪
 - 急性脊髓灰质炎
 - 多发性肌炎
83. 男, 15 岁。2 天前被社会青年欺负以后, 感紧张、恐惧, 不敢上学, 晚上常梦见类似情境。要求家人陪伴, 稍有响动就感紧张。最可能的诊断是
- 人格解体障碍
 - 惊恐障碍
 - 适应障碍
 - 急性应激障碍
 - 创伤后应激障碍
84. 女, 35 岁。人工流产后 6 年未孕。月经规律, 月经来潮 12 小时子宫内膜活检为分泌期子宫内膜, 子宫输卵管碘油造影(HSG)示双侧输卵管近端梗阻。丈夫精液正常。为生育, 最适宜的下一步治疗是
- 促排卵治疗
 - 配子输卵管内移植
 - 卵细胞质内单精子注射
 - 体外受精-胚胎移植
 - 宫腔内人工授精
85. 女, 23 岁。跟邻居吵架时突发剧烈头痛、呕吐、视物双影 2 小时。平时偶有一侧头痛, 严重时伴畏光、恶心、呕吐。查体: 右眼睑下垂, 右瞳孔散大, 对光反射消失, 右眼向上、下、内活动受限, 颈强直(+). 急诊首选的辅助检查是
- 头颅 MRI
 - DSA
 - 颈颅多普勒超声
 - 腰椎穿刺
 - 头颅 CT
86. 女, 28 岁。突发剧烈头痛、呕吐 5 小时。查体: 神志清楚, 躁动, 颈项强直, 深反射亢进, 克氏征阳性。头颅 CT 示侧裂池、环池内高密度影。首先考虑的诊断是
- 硬脑膜下血肿
 - 脑积水
 - 蛛网膜下腔出血

- D. 脑膜炎
E. 脑炎
87. 男, 72 岁。右手震颤伴动作缓慢 6 年, 翻身困难 1 年。诊断为帕金森病。有青光眼和轻度肾功能不全病史。无消化性溃疡史。服用复方左旋多巴时症状改善明显, 近 1 年来疗效减退, 单剂疗效仅 3 小时。为改善症状, 最适合增加的药物是
A. 溴隐亭
B. 金刚烷胺
C. 司来吉兰
D. 苯海索
E. 苯甲托品
88. 男婴, 4 天。体温不升伴拒奶 2 天。足月儿, 羊膜早破。查体: T 35°C, 皮肤巩膜黄染, 面色发绀。肺(-)、心(-), 肝肋下 3cm。脾肋下 1cm。实验室检查: 血清 O 型, 血 WBC $16.0 \times 10^9/L$, CRP 20mg/L, 总胆红素 205 $\mu\text{mol/L}$, 最可能的诊断是新生儿
A. 败血症
B. 肺炎
C. 溶血病
D. 低血糖
E. 颅内出血
89. 男, 28 岁。其看见或听到“和平”二字时, 马上想起“战争”; 看见或听到“安全”二字时, 便想到“危险”二字。此症状是
A. 强迫性穷思竭虑
B. 超价观念
C. 强迫性对立观念
D. 强迫意向
E. 牵连观念
90. 女, 68 岁。进行性记忆力下降 5 年。近半年多次因忘记关天然气而引起厨房失火, 想不起常用日用品的名称。整日在家找东西, 将家里弄得乱七八糟, 并怀疑儿媳偷东西。既往体健, 家族无类似疾病者, 查体无阳性体征。辅助检查头部 CT 示脑萎缩。Hachinski 缺血指数数量表 (HIS) 评分: 3 分。患者最可能的诊断是
A. 阿尔茨海默病
B. 假性痴呆
C. 妄想性障碍
D. 血管性痴呆
E. 精神分裂症
91. 女, 23 岁。妊娠 28 周, 尿糖阳性, OGTT 空腹血糖正常, 餐后 1 小时血糖升高。应该首先给予的治疗是
A. 加强营养
B. 控制饮食
C. 胰岛素治疗
D. 口服降糖药物
E. 观察
92. 男孩, 4 岁。咳嗽 3 个月, 痰不多, 常于夜间咳醒, 活动后加重, 无发热, 使用抗生素无明显好转。既往有湿疹史。查体: T 36.5°C, P 100 次/分, R 20 次/分, 双肺呼吸音粗, 未闻及干湿性啰音, 腹软, 无压痛。最可能的诊断是
A. 喘息性支气管炎
B. 吸气管肺炎
C. 咳嗽变异型哮喘
D. 支气管异物
E. 支气管炎
93. 女, 28 岁。妊娠 42 周, OCT 试验阳性, 羊水深度 3.0cm, 胎头双顶径 10cm。此时最恰当的处理是
A. 剖宫产终止妊娠
B. 前列腺素促宫颈成熟
C. 宫颈评分
D. 人工破膜引产
E. 缩宫素引产
94. 男, 35 岁。近 1 年来经常吸食“冰毒”。1 个月前因工作差错被老板训斥, 开始怀疑自己的一举一动被人监控, 单位同事含沙射影暗示他将被老板谋害, 曾数次报案请求公安局保护。该患者最可能的诊断是
A. 精神分裂症
B. 妄想性障碍
C. 分裂情感性精神障碍
D. 应激相关障碍
E. 苯丙胺类兴奋剂所致精神障碍
95. 男, 21 岁。患急性白血病半个月, 化疗期间出现皮肤瘀斑。血常规: Hb 70g/L, RBC $2.4 \times 10^{12}/L$, WBC $2.6 \times 10^9/L$, Plt $10 \times 10^9/L$, 给予输注机采血小板 1 个治疗量。输注完毕后, 患者出现严重吸气性呼吸困难伴喘鸣。查体: T 36.8°C, P 115 次/分, R 25 次, BP 85/50mmHg。该患者最可能发生的输血不良反应是
A. 严重过敏反应
B. 急性溶血性输血反应
C. 输血相关低血压
D. 输血相关移植物抗宿主病

- E. 输血相关循环超负荷
96. 女, 35 岁。外阴瘙痒伴烧灼感 2 天。妇科检查: 外阴局部充血, 阴道黏膜表面有白色凝乳状物覆盖, 阴道分泌物镜检找到假菌丝。该患者首选治疗药物是
- 糖皮质激素
 - 甲硝唑
 - 雌激素
 - 制霉菌素
 - 干扰素
97. 女, 45 岁。G₂P₂, 痛经 15 年, 加重 4 年, 应用止痛药物效果差。妇科检查: 子宫后位, 如孕 3 个月大小, 质硬, 压痛。双侧附件区未扪及明显异常。最可能的诊断是
- 子宫肥大症
 - 子宫肉瘤
 - 子宫腺肌病
 - 子宫肌瘤
 - 子宫内膜异位症
98. 女, 17 岁。因学习压力大, 成绩下降, 近 1 个月每天上学至校门口时感到紧张、害怕, 发生喷射性吐, 将早餐尽数呕吐出, 消化科检查未发现异常, 体重无明显下降, 请病假在家时从不呕吐, 进食亦

无异常。该患者最可能的诊断是

- 应激相关障碍
 - 神经性呕吐
 - 特定恐惧症
 - 社交恐惧症
 - 惊恐障碍
99. 女, 23 岁。新婚, 月经规律, 经量较多。尚无生育计划。最应该建议的避孕方法是
- 复方短效口服避孕药
 - 宫内节育器
 - 长效避孕针
 - 安全期避孕
 - 体外排精
100. 女, 35 岁, 初产妇。妊娠 34⁺1 周, 头痛 1 天。查体: BP 170/110mmHg, 胎心率 150 次/分, 胎儿大小相当于 32 周, 羊水深度 2.0cm。尿蛋白(+ + +)。该患者正确的处理原则是
- 解痉降压后羊膜腔内药物引产
 - 硫酸镁解痉后剖宫产
 - 降压治疗后继续妊娠
 - 对症处理继续妊娠
 - 降压的同时缩宫素引产

A3/A4 型选择题 (101—136 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(101—103 题共用题干)

女, 35 岁, 初产妇妊娠 36 周, 血压升高 1 个月, 持续腹痛伴阴道少量流血 3 小时。查体: T 36℃, P 120 次/分, R 28 次/分, BP 90/60mmHg, 神志清楚, 全身水肿。子宫硬如板状, 胎方位不清, 胎心未闻及, 宫口 2cm, 先露 -2。

101. 该患者最可能的诊断是

- 妊娠合并急性胰腺炎
- 胎盘早剥
- 子宫破裂
- 前置胎盘
- 临产

102. 最有效的处理措施是

- 硫酸镁抑制宫缩

B. 人工破膜引产

C. 缩宫素引产

D. 立即剖宫产

E. 镇静止痛

103. 该患者最可能发生的并发症是

- 心力衰竭
- 子痫
- HELLP 综合征
- DIC
- 产褥感染

(104—106 题共用题干)

男孩, 10 岁。因高度水肿及大量蛋白尿, 予泼尼松 60mg/d 治疗 10 周, 病情未缓解来诊。查体: T 36.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, 颜面明显水肿, 面

色苍白,肺部未闻及啰音,心(-),腹部较膨隆,肝脾触及不清,四肢明显水肿。实验室检查蛋白尿(+++),尿沉渣镜检 RBC 50/HP,补体 C3 正常,肾功能正常。

104. 最可能的诊断是

- A. 先天性肾病综合征
- B. 肾炎性肾病综合征
- C. 单纯型肾病综合征
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 慢性肾小球肾炎

105. 对其激素疗效判断正确的是

- A. 激素耐药
- B. 激素敏感
- C. 肾病复发
- D. 激素依赖
- E. 肾病频复发

106. 该患儿皮肤感染后出现发热,腹痛,四肢冰凉,尿少,查体, BP 60/40mmHg, 实验室检查: 血钠 121mmol/L, 血钾 5.8mmol/L, 此时患儿出现的并发症是

- A. 低血容量性休克
- B. 急性胃炎
- C. 肾小管功能障碍
- D. 肾静脉血栓形成
- E. 急性肾衰竭

(107—109 题共用题干)

女, 23 岁。2 个月前无明显诱因出现自言自语, 有时独自发笑, 有时对空谩骂, 感觉被人监视和跟踪, 思想和行为会被某种外力控制, 情绪低落, 觉得被逼的走投无路, 曾报警寻求保护, 睡眠差, 实验室检查未发现异常。

107. 该患者最可能的诊断是

- A. 抑郁发作
- B. 妄想性障碍
- C. 双相障碍
- D. 精神分裂症
- E. 分裂情感性精神障碍

108. 患者在药物治疗 2 个月后, 症状缓解, 但出现停经和泌乳现象, 治疗药物最可能是

- A. 利培酮
- B. 氯氮平
- C. 喹硫平
- D. 奥氮平
- E. 阿立哌唑

109. 最可能与该不良反应有关的多巴胺通路是

- A. 中脑皮质通路
- B. 中脑边缘系统通路
- C. 黑质纹状体通路
- D. 中脑被盖区通路
- E. 下丘脑结节漏斗通路

(110—112 题共用题干)

女, 45 岁。车祸致头部外伤伴昏迷 1 小时入院, 查体: P 55 次/分, R 12 次/分, BP 170/100mmHg, 右侧顶枕部头皮血肿, GCS 评分 7 分, 左侧瞳孔直径 4mm, 对光反应消失, 右侧瞳孔直径 2mm, 右侧肢体偏瘫, 头颅 CT, 左颞叶脑内高密度影, 体积约 60ml。左额, 颞底面广泛斑点状高密度影致同侧脑室受压, 中线向右移位 1.5cm。

110. 最可能的诊断是

- A. 外伤性脑积水
- B. 急性硬膜外血肿
- C. 急性硬脑膜下血肿
- D. 脑挫裂伤伴颅内血肿
- E. 脑震荡

111. 可能的损伤机制是

- A. 加速性损伤
- B. 挥鞭伤
- C. 挤压伤
- D. 切线性损伤
- E. 减速性损伤

112. 最适宜采取的治疗措施为

- A. 绝对卧床休息
- B. 腰椎穿刺排放脑脊液
- C. 大量应用激素
- D. 脑室外引流
- E. 急性开颅手术

(113—115 题共用题干)

女孩, 5 岁。精神欠佳半个月, 发热、头痛、呕吐 10 天。半个月前开始出现精神不佳, 10 天来每天发热, 最高体温 38.1℃, 进食减少, 伴头痛, 呕吐。2 个月前曾患“麻疹”。查体: 精神差, 消瘦, 右眼外展受限, 颈抵抗(+), Kernig 征(+), Brudzinski 征(+). PPD 试验(-)。

113. 最可能的诊断是

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 隐球菌性脑膜炎
- D. 病毒性脑炎
- E. 流行性脑脊髓膜炎



114. 为明确诊断首选的检查是

- A. 胸部 X 线片
- B. 脑脊液检查
- C. 血沉
- D. 头颅 CT
- E. 脑电图

115. 提示该疾病进入晚期的表现是

- A. 颅神经受损
- B. 肢体瘫痪
- C. 惊厥
- D. 昏迷
- E. 腹壁反射消失

(116—117 题共用题干)

女, 35 岁。痛经进行性加重 8 年, 婚后 4 年未孕。查体: 子宫后位, 大小正常, 子宫左后方可触及大小约 6cm 的囊性包块, 张力较大, 触痛, 子宫右后方触及类似包块, 大小约 5cm。血 CA125 65U/ml, 抗子宫内膜抗体 (+)。

116. 首先考虑的诊断是

- A. 盆腔结核
- B. 盆腔炎性包块
- C. 转移性卵巢肿瘤
- D. 子宫内膜异位症
- E. 卵巢上皮癌

117. 术后拟给予药物治疗, 最适合的药物是

- A. 抗结核药物
- B. 抗生素
- C. 免疫调节剂
- D. GnRH-a
- E. 化疗药物

(118—120 题共用题干)

女, 35 岁。停经 80 天, 阴道不规则流血 4 天, 下腹隐痛。呕吐反应剧烈。既往无孕产史。妇科检查: 宫底平脐, 质软, 未触及胎体, 未闻及胎心, 尿 hCG (+)。

118. 该患者首选的辅助检查是

- A. 血 β -hCG
- B. 胸部 X 线片检查
- C. 凝血功能检查
- D. 盆腔超声检查
- E. 颅脑 CT 检查

119. 该患者首先考虑的诊断是

- A. 稽留流产
- B. 葡萄胎

- C. 先兆流产
- D. 绒毛膜癌
- E. 侵蚀性葡萄胎

120. 初始治疗 8 周后血 β -hCG 降至正常, 后又出现升高。1 天前测血 hCG 10 000U/L, 超声检查: 宫腔内未见异常, 子宫后壁近右侧角部肌层内可探及不均质回声, 内有丰富的低阻力型血流信号。双侧附件区均探及直径约 4cm 的囊性包块。下一步首选的治疗是

- A. 双侧卵巢囊肿剥除术
- B. 子宫 + 双附件切除术
- C. 子宫病灶局部切除术
- D. 放射治疗
- E. 化学治疗

(121—124 题共用题干)

男婴, 8 个月。腹泻伴呕吐 3 天, 无尿 6 小时。大便 10~15 次/天, 呈蛋花汤样伴黏液, 有腥臭味。查体: T 37.8°C, 表情淡漠, 前囟、眼窝明显凹陷, 皮肤弹性差, 可见花纹, 四肢厥冷, 双肺呼吸音清, 心率 120 次/分, 腹软, 无明显压痛。实验室检查: 粪镜检偶见白细胞, 血钠 134mmol/L。

121. 病原学诊断最可能是

- A. 产毒性大肠埃希菌肠炎
- B. 空肠弯曲菌肠炎
- C. 金黄色葡萄球菌肠炎
- D. 轮状病毒肠炎
- E. 白色念珠菌肠炎

122. 患儿脱水的程度和性质是

- A. 重度等渗水性脱水
- B. 中度等渗水性脱水
- C. 重度低渗水性脱水
- D. 中度低渗水性脱水
- E. 重度高渗水性脱水

123. 首批快速扩容静脉输液应给予

- A. 1/3 张含钠液
- B. 2:1 等张含钠液
- C. 2/3 张含钠液
- D. 1/2 张含钠液
- E. 4/5 张含钠液

124. 患儿输液后出现腹胀, 肠鸣音减弱, 膝腱反射消失。首先考虑的诊断是

- A. 低钾血症
- B. 低钙血症
- C. 低磷血症

- D. 低镁血症
- E. 低钠血症

(125—127 题共用题干)

女, 23 岁。G₀P₀。右下腹隐痛半个月, 加重 5 小时。平素月经不规律。查体: T 37.0℃, P 96 次/分, R 23 次/分, BP 105/75mmHg。妇科检查: 子宫右旁可触及大小约 6cm 的实性包块, 触痛, 子宫及左侧附件未触及异常。血清 AFP 900μg/L。

125. 该患者最可能的诊断是

- A. 卵巢上皮性肿瘤
- B. 卵巢支持细胞-间质细胞瘤
- C. 卵巢颗粒细胞瘤
- D. 卵巢无性细胞瘤
- E. 卵巢卵黄囊瘤

126. 手术探查见, 右卵巢囊肿, 表面光滑, 未破裂, 子宫及左侧附件正常, 盆、腹腔未见病灶, 最适合的手术方式是

- A. 双侧附件切除术
- B. 子宫+双侧附件切除术
- C. 单纯右侧卵巢囊肿剥除术
- D. 子宫+右侧附件切除术
- E. 保留生育功能的分期手术

127. 术后首选的治疗方式是

- A. 化学治疗
- B. 放射治疗
- C. 生物治疗
- D. 内分泌治疗
- E. 随访观察

(128—130 题共用题干)

女, 23 岁。1 个月前分娩后出现失眠、心情烦躁。近 2 周加重, 认为自己很笨, 没能力带好小孩, 怕小孩夭折, 觉得丈夫不再喜欢自己了, 猜疑丈夫有外遇, 整日以泪洗面, 称不想活了, 甚至要带着孩子一起去死, 遂入院治疗。

128. 患者最可能的诊断是

- A. 分裂样障碍
- B. 抑郁发作
- C. 适应障碍
- D. 焦虑状态
- E. 妄想性障碍

129. 患者经治疗后, 情绪逐渐好转, 近 1 周显兴奋、容易激动, 好管闲事, 自我感觉良好, 称将来要成为中国女首富, 丈夫根本配不上自己。目前最可能的诊断是

- A. 产后抑郁症
- B. 妄想性障碍
- C. 环形心境障碍
- D. 双相障碍, 躁狂发作
- E. 精神分裂症

130. 目前可换用的治疗方案是

- A. 非典型抗精神病药+抗抑郁药物
- B. 抗抑郁药物+苯二氮革类药物
- C. 电抽搐治疗+抗抑郁药物
- D. 心境稳定剂+非典型抗精神病药
- E. 心境稳定剂+抗抑郁药物

(131—133 题共用题干)

女, 28 岁。既往月经规律, 现停经 45 天, 发现阴道流出少量咖啡色物 2 天, 无腹痛, 尿 hCG(+)。

131. 目前首先考虑的诊断可能为

- A. 难免流产
- B. 先兆流产
- C. 完全流产
- D. 不全流产
- E. 感染流产

132. 对确诊最有帮助的检查是

- A. 血 β-hCG
- B. 血常规
- C. B 超检查
- D. 妇科检查
- E. 测定基础体温

133. 最需要鉴别的疾病是

- A. 子宫内膜癌
- B. 异位妊娠
- C. 子宫颈癌
- D. 子宫肌瘤
- E. 功能失调性子宫出血

(134—136 题共用题干)

女婴, 5 个月。咳嗽伴发热 3 天, 喘憋 1 天。无明显咳痰, 体温波动在 38~39℃, 喘憋进行性加重。查体: T 38.5℃, P 150 次/分, R 60 次/分, 精神、反应可, 双肺哮鸣音, 双下肺可闻及细湿啰音, 腹软, 无明显压痛, 肝肋下 2cm。

134. 最可能的诊断是

- A. 肺炎支原体肺炎
- B. 呼吸道合胞病毒肺炎
- C. 衣原体肺炎
- D. 金黄色葡萄球菌肺炎
- E. 腺病毒肺炎



135. 该病胸部 X 线片典型表现是

- A. 均一片状阴影
- B. 双肺纹理粗
- C. 大小不等的片状阴影或融合成大病灶
- D. 小点片状、斑片状阴影伴肺气肿
- E. 肺浸润伴多发性肺脓肿、肺大疱

136. 入院后患儿出现惊厥、双眼凝视、对光反射迟钝。

正确的药物治疗不包括

- A. 毛花苷丙
- B. 甘露醇
- C. 地塞米松
- D. 酚妥拉明
- E. 地西洋

B1 型选择题 (137—150 题)

答 题 说 明

以下提供若干组试题,每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(137—139 题共用备选答案)

- A. 地西洋
- B. 扑米酮
- C. 丙戊酸钠
- D. 卡马西平
- E. 苯巴比妥

137. 癫痫复杂部分性发作的首选药物是

138. 癫痫持续状态的首选药物是

139. 癫痫失神发作的首选药物是

(140—141 题共用备选答案)

- A. 第 10~90 百分位
- B. 第 90 百分位以上
- C. 第 3 百分位以下
- D. 第 10 百分位以下
- E. 第 10~85 百分位

140. 小于胎龄儿 (SGA) 的标准是指出生体重在同胎龄儿平均出生体重的

141. 适于胎龄儿 (AGA) 的标准是指出生体重在同胎龄儿平均出生体重的

(142—143 题共用备选答案)

- A. 丘疹样荨麻疹
- B. 手足硬性水肿
- C. 皮下小结
- D. 湿疹样改变
- E. 蝶形红斑

142. 风湿热的皮肤特征是

143. 川崎病的皮肤特征是

(144—145 题共用备选答案)

- A. 3 个月,4 个月,5 个月
- B. 2 个月,3 个月,4 个月
- C. 1 个月,2 个月,3 个月
- D. 出生时,1 个月,2 个月
- E. 4 个月,5 个月,6 个月

144. 口服脊髓灰质炎糖丸适宜的时间是生后

145. 接种百白破三联疫苗适宜的时间是生后

(146—148 题共用备选答案)

- A. 月经来潮 6 小时内
- B. 月经期 2~3 日
- C. 月经期 5~6 日
- D. 月经干净 3~7 日
- E. 月经干净 10~14 日

146. IUD 取出通常应选在

147. 为了黄体功能进行诊刮的时间应选在

148. 疑为子宫内膜不规则脱落时诊刮的时间应选在

(149—150 题共用备选答案)

- A. 卵泡刺激素
- B. 雌激素
- C. 黄体生成素
- D. 孕激素
- E. 催乳激素

149. 卵泡早期分泌量少,排卵前达高峰,以后降低,排卵后期再度增高的激素是

150. 卵泡期分泌量少,排卵后分泌量明加,8~9 天后逐渐下降的激素是



山东金英杰医学
SHANDONG JINYINGJIE