

140-2

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中医执业医师资格考试

笔试冲刺密卷

(医学综合笔试部分)

报考类别:中医执业医师

第一单元

考试日期:2022年8月

考试时间:9:00—11:00

考生姓名:_____

准考证号:_____

考场号:_____

第一单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 1.因中气下陷所致的久痢、脱肛及子宫下垂,都可采用升提中气法治疗,此属于
A.因人制宜
B.同病异治
C.异病同治
D.审因论治
E.虚则补之
- 2.依据精气学说,精概念的起源是
A.水地说
B.云气说
C.阴阳说
D.五行说
E.天气说
- 3.关于辨证的描述正确的是
A.通过四诊收集症状、体征等资料
B.分析疾病的原因、性质、部位
C.分析邪正之间的关系
D.概括、判断为某种性质的证
E.以上都是
- 4.事物或现象阴阳属性的征兆是
A.寒热
B.上下
C.水火
D.晦明
E.动静
- 5.下列各项,可用阴阳消长来解释的是
A.阳虚则寒
B.阳长阴消
C.寒者热之
D.阴损及阳
E.阴盛则阳病
- 6.“重阴必阳,重阳必阴”,说明了阴阳之间的哪种关系
A.相互交感
B.对立制约
C.互根互用
D.消长平衡
E.相互转化
- 7.“阴中求阳”的理论依据是
A.阴阳交感
B.阴阳对立制约
C.阴阳转化
D.阴阳互根互用
E.阴阳消长
- 8.火的特性是
A.曲直
B.稼穡
C.从革
D.炎上
E.润下
- 9.按五行属性分类,五化中属土者是
A.生
B.长
C.化
D.收
E.藏
- 10.下列有关五脏生理功能及特点的表现错误的是

- A. 化生精气
 - B. 贮藏精气
 - C. 藏精气而不泻
 - D. 满而不能实
 - E. 藏而不泄
11. 肺主一身之气运行的生理基础是
- A. 贯注心脉
 - B. 宣发卫气
 - C. 吸精排浊
 - D. 生成宗气
 - E. 调节气机
12. 心的主要生理功能是
- A. 主藏血
 - B. 主神志
 - C. 主运化
 - D. 主统血
 - E. 主疏泄
13. 肝藏血的生理功能是指肝有
- A. 贮藏血液
 - B. 调节血量
 - C. 统摄血液
 - D. 贮藏血液和调节血量
 - E. 化生血液与统摄血液
14. 五脏中, 具有“刚脏”特性的是
- A. 心
 - B. 肺
 - C. 脾
 - D. 肝
 - E. 肾
15. 有主水和纳气功能的脏是
- A. 肝
 - B. 心
 - C. 脾
 - D. 肺
 - E. 肾
16. 被称为先天之本的脏是
- A. 肾
 - B. 脾
 - C. 心

- D. 肝
 - E. 肺
17. 肾中精气的主要生理功能是
- A. 促进机体的生长发育
 - B. 促进生殖机能的成熟
 - C. 主生长发育和生殖
 - D. 化生血液的物质基础
 - E. 人体生命活动的根本
18. 天癸的产生主要取决于
- A. 肾中精气的充盈
 - B. 脾气的健运
 - C. 肾阳的蒸化
 - D. 肝血的充足
 - E. 肾阴的滋养
19. 肾主纳气的主要生理作用是
- A. 使肺之呼吸保持一定的深度
 - B. 有助于元气的固摄
 - C. 有助于精液的固摄
 - D. 有助于元气的生成
 - E. 有助于肺气的宣发
20. “肾为气之根”主要指
- A. 肾为五脏阳气之根本
 - B. 肾主纳气, 以维持呼吸深沉
 - C. 肾主膀胱的气化开合
 - D. 肾主水液的蒸腾气化
 - E. 元气由肾精所化生
21. 下列各项, 其关系表现为“精神互用, 君相安位”特点的是
- A. 肝脾
 - B. 心肝
 - C. 肝肾
 - D. 心肾
 - E. 脾肾
22. 饮在胸胁, 咳逆引痛者称为
- A. 痰饮
 - B. 支饮
 - C. 悬饮
 - D. 溢饮
 - E. 留饮

- 23.瘀血所导致的出血特点是
- A.血色浅淡
 - B.血色暗红,或有血块
 - C.血色鲜红
 - D.伴有腹部胀痛
 - E.以上都不是
- 24.少阴经头痛的特征是
- A.前额连眉棱骨痛
 - B.两侧太阳穴处痛
 - C.后头部连项痛
 - D.头痛连齿
 - E.头痛晕沉
- 25.奇经八脉中既称“血海”又称“经脉之海”的是
- A.冲脉
 - B.任脉
 - C.督脉
 - D.带脉
 - E.维脉
- 26.具有“慄疾滑利”特点的是
- A.元气
 - B.宗气
 - C.营气
 - D.卫气
 - E.清气
- 27.脏腑关系中,“燥湿相济”指的是哪种关系
- A.心与小肠
 - B.肝与胆
 - C.脾与胃
 - D.肺与大肠
 - E.肾与膀胱
- 28.“水火既济”指的是哪两脏之间的关系
- A.心与肺
 - B.心与肾
 - C.脾与肾
 - D.肝与肾
 - E.肺与脾
- 29.“水之上源”指的是
- A.肝
 - B.心
 - C.肺
 - D.脾
 - E.肾
- 30.平性药物是指
- A.无毒的药物
 - B.寒热之性不显著,药性平和的药物
 - C.毒性不显著的药物
 - D.治疗作用广泛的药物
 - E.以上均不是
- 31.下列各项中,不属于温热药功效的是
- A.温里祛寒
 - B.滋阴除热
 - C.暖肝散结
 - D.引火归原
 - E.回阳救逆
- 32.下列哪项不属于苦味药的作用
- A.降泄
 - B.通泄
 - C.燥湿
 - D.收敛
 - E.清泄
- 33.脾虚湿盛之食少泄泻、水肿腹胀、脚气、浮肿,宜用
- A.猪苓
 - B.木通
 - C.车前子
 - D.石韦
 - E.薏苡仁
- 34.治疗肝经风热,目赤肿痛宜选用的药组是
- A.柴胡、浮萍
 - B.牛蒡子、葛根
 - C.蝉蜕、升麻
 - D.蔓荆子、木贼
 - E.菊花、白芷
- 35.下列不具有健脾祛湿作用的药物是

- A. 茯苓
B. 猪苓
C. 白术
D. 薏苡仁
E. 苍术
36. 治疗阴暑证宜选用的药物是
A. 荆芥
B. 桂枝
C. 细辛
D. 薄荷
E. 香薷
37. 既能行气安胎, 又能发表散寒, 解鱼蟹毒的药物是
A. 砂仁
B. 黄芩
C. 紫苏
D. 白术
E. 白豆蔻
38. 尤善治腰以上风寒湿痹的药物是
A. 羌活
B. 独活
C. 桑枝
D. 桂枝
E. 威灵仙
39. 姜汁炮制药物的目的是
A. 加强药物的止呕作用
B. 加强药物的化痰作用
C. 加强药物的止痛效果
D. 消除药物的刺激性
E. 消除药物的腥臭气味
40. 芒硝具有的功效是
A. 润燥软坚
B. 去积杀虫
C. 峻下冷积
D. 活血化痰
E. 泄水逐饮
41. 治疗胎热不安, 宜首选的药物是
A. 黄连
B. 栀子
C. 黄芩
D. 紫苏
E. 黄柏
42. 下列药物中, 宜煎煮入药的是
A. 牛黄
B. 石膏
C. 芒硝
D. 青黛
E. 甘遂
43. 既能治疗热毒疮疡, 又能治疗风热外感的药物是
A. 黄连
B. 蒲公英
C. 牛黄
D. 桑叶
E. 金银花
44. 欲用大黄攻下, 其用法是
A. 先煎
B. 酒制
C. 后下
D. 炒炭
E. 制熟
45. 醋制甘遂的目的是
A. 增强止痛功能
B. 引经入药
C. 便于储存
D. 矫味矫臭
E. 减低毒性
46. 既舒筋活络, 又化湿和胃的药物是
A. 独活
B. 秦艽
C. 木瓜
D. 威灵仙
E. 羌活
47. 治疗风湿痹痛, 兼有肝肾不足, 宜选用的药物是
A. 羌活
B. 独活
C. 桑寄生

- D.威灵仙
E.秦艽
- 48.下列除哪项外均是滑石的主治病证
- A.湿热、淋痛
B.暑温、湿温
C.湿疹、湿疮
D.暑热、痱毒
E.寒湿带下
- 49.滑石入煎剂其用法是
- A.冲服
B.包煎
C.另煎
D.先煎
E.久煎
- 50.用治暑湿泄泻,利小便以实大便,宜选用的药物是
- A.茯苓
B.猪苓
C.车前子
D.泽泻
E.木通
- 51.具有燥湿,健脾功效的药组是
- A.山药、厚朴
B.苍术、白术
C.藿香、佩兰
D.砂仁、草果
E.厚朴、茯苓
- 52.既能利水通淋,又能利湿退黄的药物是
- A.车前子
B.泽泻
C.金钱草
D.木通
E.茯苓
- 53.丁香的功效是
- A.散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻
B.温中止痛,补火助阳,降逆止呕
C.降逆止呕,补火助阳,纳气平喘
D.温中降逆,散寒止痛,温肾助阳
E.温胃降逆,温肾纳气,助阳止泻
- 54.为“血中气药”,能“下调经水,中开郁结”的药物是
- A.川芎
B.延胡索
C.牛膝
D.红花
E.丹参
- 55.可燥湿化痰,降逆止呕的药物是
- A.陈皮
B.半夏
C.莱菔子
D.芦根
E.全瓜蒌
- 56.治痰浊痹阻、胸阳不振之胸痹,常以全瓜蒌配伍的药物是
- A.丹参
B.桔梗
C.薤白
D.前胡
E.白前
- 57.羚羊角粉内服的每次剂量是
- A.1~3 g
B.0.3~0.6 g
C.0.1~0.3 g
D.0.03~0.06 g
E.3~5 g
- 58.牛黄入丸、散剂,每次剂量是
- A.0.15~0.35 g
B.1~3 g
C.0.1~0.6 g
D.0.3~0.6 g
E.1~1.5 g
- 59.龙骨与牡蛎的共同功效是
- A.平肝潜阳,清肝明目
B.平肝潜阳,纳气平喘
C.平肝潜阳,软坚散结
D.平肝潜阳,收敛固涩
E.平肝潜阳,清热利尿

60. 甘草的功效是
- 补脾, 健胃, 缓急, 和药
 - 补脾, 养心, 缓急, 和药
 - 和胃, 补肾, 缓急, 和药
 - 养心, 补肝, 缓急, 和药
 - 补脾, 润肺, 缓急, 和药
61. 能够滋补肝肾, 明目的药物是
- 石斛
 - 玉竹
 - 黄精
 - 百合
 - 枸杞子
62. 肺心病心力衰竭哪种情况下使用强心剂
- 心率大于 120 次/分
 - 两肺底湿啰音
 - 气急发绀明显
 - 肺动脉高压
 - 感染控制, 利尿剂无效
63. 判定支气管哮喘疗效最有意义的指标是
- 肺活量
 - 嗜酸性粒细胞数
 - 症状和体征
 - 血气分析
 - X 线肺野透亮度的变化
64. 肺结核的主要传播途径是
- 误食病人剩下的食物
 - 结核菌通过皮肤侵入
 - 通过泌尿生殖系统侵入
 - 注射或应用血液制品而引起
 - 健康人吸入带菌的尘埃
65. 对于肺心病诊断没有意义的是
- 有无冠心病病史
 - 有无肺气肿、肺纤维化体征
 - 肺动脉瓣第二心音亢进
 - X 线检查有无心室的增大
 - 肝肿大压痛, 肝-颈静脉反流征阳性
66. 成人继发性肺结核最常见的是
- 原发型肺结核
 - 浸润型肺结核
 - 血行播散型肺结核
 - 慢性纤维空洞型肺结核
 - 粟粒性肺结核
67. 下列哪项引起右心室后负荷增加
- 室间隔缺损
 - 二尖瓣狭窄
 - 大量快速输液
 - 主动脉瓣狭窄
 - 房间隔缺损
68. 原发性高血压的主要病理生理是
- 心排出量升高
 - 交感神经兴奋性增加
 - 周围血管阻力增加
 - 肾素分泌过多
 - 血管内皮细胞过多分泌内皮素
69. 慢性肺源性心脏病失代偿期心功能失代偿多表现为
- 以右心衰为主
 - 以左心衰为主
 - 多为全心衰
 - 多为肺水肿
 - 缺氧和二氧化碳潴留
70. 诊断原发性支气管肺癌最可靠的手段是
- 病史及体征
 - 胸部影像学检查
 - 癌标志物检测及基因诊断
 - 痰细胞学、组织病理学检查
 - 放射性核素扫描检查
71. 萎缩性胃炎胃黏膜的病理改变是
- 充血, 水肿
 - 糜烂, 出血
 - 肥厚, 粗糙
 - 灰暗, 变薄
 - 渗出
72. 下列各项不是胃溃疡并发症的是
- 梗阻

- B.穿孔
C.出血
D.癌变
E.慢性萎缩性胃炎
- 73.慢性肺源性心脏病急性期呼吸衰竭给氧原则是
- A.持续高浓度给氧
B.持续低浓度给氧
C.不需给氧
D.间断高浓度给氧
E.间断低浓度给氧
- 74.仅见于慢性萎缩性胃炎的黏膜变化为
- A.腺体无广泛破坏
B.假幽门腺化生
C.无中性粒细胞浸润
D.无淋巴细胞浸润
E.以上均不是
- 75.鉴别消化性溃疡和慢性胃炎的最好方法是
- A.粪便隐血试验检查
B.X线钡餐检查
C.纤维胃镜检查
D.五肽胃泌素胃液分析
E.胃黏膜脱落细胞检查
- 76.哪项表现对诊断尿路感染最有意义
- A.畏寒、发热、白细胞增高
B.尿频、尿急、尿痛
C.尿培养细菌计数 $>10^5$ /mL
D.清洁中段尿白细胞 >5 个/HP
E.尿亚硝酸盐还原试验阳性
- 77.特发性血小板减少性紫癜急性型发作期血小板计数常小于
- A. 20×10^9 /L
B. 50×10^9 /L
C. 60×10^9 /L
D. 80×10^9 /L
E. 100×10^9 /L
- 78.年轻女性月经增多,疑有缺铁性贫血,

- 哪项检查最有诊断意义
- A.血清铁降低
B.总铁结合力增高
C.血清铁蛋白降低
D.游离原卟啉降低
E.钴盐吸收降低
- 79.消化性溃疡的临床主要特征是
- A.返酸明显
B.恶心、呕吐
C.暖气不舒
D.节律性上腹痛
E.黑粪
- 80.甲状腺功能亢进症最常见于
- A.碘甲亢
B.毒性弥漫性甲状腺肿
C.甲状腺炎伴甲亢
D.多结节性甲状腺肿伴甲亢
E.自主性高功能甲状腺肿结节
- 81.既往有哮喘病的甲亢患者,不宜使用哪种药物
- A.丙基硫氧嘧啶
B.甲基硫氧嘧啶
C.卡比马唑
D.普萘洛尔
E.甲巯咪唑
- 82.甲状腺功能亢进症危象的主要临床表现是
- A.心率加快、血压高、头晕、头痛
B.心率 >160 次/分、体温 $>39^\circ\text{C}$ 、腹泻
C.心悸、气促、呕吐、腹泻
D.发绀、鼻翼扇动、心悸、出汗
E.面色苍白、四肢厥冷、呼吸困难
- 83.原发性醛固酮增多症最常见的病因是
- A.醛固酮癌
B.醛固酮瘤
C.异位的分泌醛固酮的肿瘤
D.特发性醛固酮增多症
E.糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症

84. 消化性溃疡最常见的并发症是
- 急性穿孔
 - 出血
 - 穿透
 - 癌变
 - 幽门梗阻
85. 下列哪项属于类风湿关节炎的基本病理表现
- 血管炎
 - 类风湿结节
 - 纤维蛋白沉积
 - 滑膜炎
 - 淋巴细胞浸润
86. 下列描述中哪项是系统性红斑狼疮最具特征的临床表现
- 多发性口腔溃疡
 - 蝶形红斑
 - 雷诺现象
 - 光过敏
 - 肾小管酸中毒
87. 关于消化性溃疡的治疗, 最重要的是
- 中枢镇静
 - 保护黏膜
 - 抑制胃酸和根除幽门螺杆菌
 - 早期手术
 - 少食多餐
88. 下列哪项不属于糖尿病的慢性并发症
- 糖尿病肾脏病变
 - 糖尿病视网膜病变
 - 糖尿病性心脏病变
 - 糖尿病酮症酸中毒
 - 糖尿病足
89. 患者, 男, 36 岁, 突起昏迷, 四肢瘫痪, 双侧瞳孔"针尖样"缩小。其最可能的疾病是
- 额叶出血
 - 脑桥出血
 - 小脑出血
 - 基底核出血
 - 蛛网膜下腔出血
90. 以下不是胃癌并发症的是
- 贲门梗阻
 - 糜烂
 - 幽门梗阻
 - 出血
 - 穿孔
91. 以不正当手段取得医师执业证书, 由发给证书的卫生行政部门给予的行政处罚是指
- 批评教育
 - 停业整顿
 - 吊销执业证书
 - 降级、降职
 - 警告、记过
92. 当事人对所追究的行政责任不服, 可以向追究行政责任的行政机关的上一级行政机关提出
- 行政复议
 - 行政处分
 - 行政处罚
 - 行政制裁
 - 行政责任
93. 下列哪个是国家特定行政主管机关依法惩戒违法失职的个人或组织的行政行为
- 行政处罚
 - 行政处分
 - 民事责任
 - 刑事责任
 - 道德谴责
94. 某市级医院在接诊患有非典型肺炎患者时, 违反传染病防治法的规定, 未采取任何隔离措施, 造成医院感染, 应当追究其
- 民事责任
 - 行政责任
 - 刑事责任
 - 社会责任
 - 以上均不对

95.某制盐企业为减少其生产成本采用工业用盐作原料,造成集体中毒事故,卫生行政部门应当对其做出何种处理

- A.追究其民事责任
- B.追究其刑事责任
- C.予以行政处分
- D.予以行政处罚
- E.要求其赔偿当事人损失

96.以下情形中,可以参加执业医师资格考试的是

- A.有中等专业学校医学专业学历,在医疗机构中工作满三年
- B.有中等专业学校医学专业学历,在医疗机构中试用期满五年
- C.有中等专业学校医学专业学历,在医疗机构中工作满五年
- D.取得执业助理医师执业证书后,具有中等专业学校医学专业学历,在医疗机构中工作满三年
- E.取得执业助理医师执业证书后,具有中等专业学校医学专业学历,在医疗机构中工作满五年

97.《医疗事故处理办法》所指医疗责任事故是指医务人员

- A.无过错输血感染造成不良后果的
- B.在诊疗中因患方原因延误诊疗导致不良后果的
- C.患者体质特殊而发生医疗以外的

D.违反规章制度、诊疗护理常规失职行为为所致的

E.行为人有过失,但因病员病情严重等偶然因素所致的

98.受理医师执业注册申请的卫生行政部门对不符合条件不予注册的,书面通知申请人并说明理由的期限是应当自收到申请之日起

- A.10日内
- B.15日内
- C.30日内
- D.60日内
- E.90日内

99.医师在执业活动中发生医疗事故不按规定报告的,应承担的法律责任是

- A.行政罚款处罚
- B.暂停1~6个月的执业活动
- C.暂停6~12个月的执业活动
- D.注销执业证书
- E.以上都不是

100.发现传染病病情应及时按照规定内容、程序、方式和时限报告,报告疫情应遵循的原则是

- A.系统控制原则
- B.系统通报原则
- C.属地管理原则
- D.隶属关系原则
- E.直接向上级领导报告

A2型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

101.患者脘腹隐痛,反复发作5年,饥不饮食,口燥咽干,时而干呕,大便干结,舌红少苔,脉细数。证属

- A.食滞胃脘证

- B.胃热证
- C.胃阴虚证
- D.肝胃不和证
- E.肝气犯脾证

102. 某男, 19 岁。近来腰酸梦遗, 虚烦不眠, 心悸健忘, 耳鸣, 潮热盗汗, 舌红少苔, 脉细数。可以诊为

- A. 肾阴不足
- B. 心血亏虚
- C. 肝肾阴虚
- D. 心肾不交
- E. 心阳浮越

103. 患者, 男, 61 岁。久咳不止, 咳声低微, 少气乏力, 痰少而干, 痰中夹有血丝, 用药首选

- A. 人参
- B. 西洋参
- C. 黄芪
- D. 甘草
- E. 山药

104. 患者, 女, 20 岁。外出时感受风寒, 现症: 头痛、头重、头项强痛, 腰背酸重, 治疗应首选哪味药物治疗

- A. 紫苏
- B. 桂枝
- C. 麻黄
- D. 羌活
- E. 生姜

105. 患者, 女, 30 岁。皮疹瘙痒 2 周余。皮疹为红色粟粒状, 每遇热或在阳光下即发, 舌边尖红, 苔薄白。治以祛风散热止痒, 宜以蝉衣、薄荷等配伍的药物是

- A. 苦参
- B. 白僵蚕
- C. 地肤子
- D. 龙胆草
- E. 黄连

106. 一女性患者见面色萎黄、经期后延、行经腹痛、痛处固定、遇温痛减, 治疗宜首选的药物是

- A. 当归
- B. 熟地黄
- C. 何首乌
- D. 白芍

E. 阿胶

107. 用治肺癆见咳嗽痰少, 时有咳血, 潮热, 自汗盗汗, 神疲乏力, 舌红少苔, 脉细数无力。最宜选用的药组是

- A. 川贝、百部、紫菀
- B. 陈皮、半夏、白芥子
- C. 苏子、莱菔子、白芥子
- D. 黄芩、瓜蒌、鱼腥草
- E. 麻黄、桑白皮、地龙

108. 患者, 男, 70 岁。慢性咳喘 20 年, 近来病情加重, 胸闷, 咳喘, 痰多色白, 痰浊易咯, 大便不畅, 舌暗体胖, 苔白厚腻, 脉滑。宜首选的药物是

- A. 白前、前胡
- B. 杏仁、瓜蒌仁
- C. 苏子、莱菔子
- D. 陈皮、半夏
- E. 紫菀、款冬花

109. 患者, 女, 30 岁。外感发热 10 天, 经治疗热势已退, 现夜热早凉, 热退无汗, 舌红少苔, 脉细数。用药首选

- A. 地骨皮
- B. 赤芍
- C. 牡丹皮
- D. 黄柏
- E. 生地

110. 患者, 男, 26 岁。喘咳 3 年, 每至春天春暖花开时哮喘发作, 每伴少量黄稠痰, 舌红苔黄, 脉弦滑。常以麻黄、杏仁、石膏配伍的药物是

- A. 地龙
- B. 全蝎
- C. 蜈蚣
- D. 白僵蚕
- E. 白花蛇

111. 患者, 女, 78 岁。于 1 天前发现口角右偏, 左手不能持物, 左下肢不能行走, 说话吐字不清。下午检查发现左侧鼻唇沟浅, 伸舌稍向左偏, 左侧上下肢肌力 4 级。今晨醒来说话正常, 鼻唇沟对称, 伸舌居中, 四肢

运动灵活有力。最可能的诊断是

- A. 右侧大脑中动脉血栓形成
- B. 椎-基底动脉血栓形成
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 脑出血
- E. 蛛网膜下腔出血

112. 患者,女,43岁。突然呼吸困难3小时。神志清楚,两肺广泛哮鸣音。血 pH7.47, PaCO₂ 4.2 kPa, PaO₂ 10 kPa。BE3 mmol/L。患者可能是

- A. 失代偿性呼吸性酸中毒
- B. 代偿性呼吸性酸中毒
- C. 代偿性呼吸性碱中毒
- D. 失代偿性呼吸性碱中毒
- E. 代谢性碱中毒

113. 患者,女性,22岁。持续3小时阵发呼气性呼吸困难、烦躁不安,静脉注射氨茶碱无效。有支气管哮喘史。查体:肺广泛哮鸣音及肺气肿征。应采取的治疗措施是

- A. 静脉注射地西洋
- B. 肌肉注射哌替啶
- C. 气管吸入沙丁胺醇
- D. 静脉滴注大剂量青霉素
- E. 静脉滴注糖皮质激素

114. 男性患者,30岁。患风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴关闭不全4年,半年前骤发心悸,心电图示快速房颤,经洋地黄治疗,心率减慢。目前心率75次/分,心律仍绝对不规则。血沉与抗“O”滴度正常。该患者最好的治疗是

- A. 继续用地高辛控制心室率
- B. 停用洋地黄
- C. 地高辛加用心得安治疗
- D. 药物或电击复律
- E. 地高辛加糖皮质激素

115. 患者,男性,57岁。冠心病,发生急性剧烈胸痛后,血 CPK 明显升高,颈静脉充盈,肝大,血压下降至 80/40 mmHg。应诊断为

- A. 冠心病心力衰竭型

- B. 急性右室心肌梗死
- C. 冠心病合并急性心脏压塞
- D. 急性前壁心肌梗死伴泵衰竭
- E. 急性心肌梗死伴室间隔破裂

116. 患者,男,26岁。低热、心悸、气促2天,突然呼吸困难加重,发绀。血压 80/70 mmHg,吸气时脉搏减弱,心界扩大,心音低钝,心率 115 次/分,颈静脉怒张。首选治疗措施

- A. 硝普钠
- B. 毛花苷 C
- C. 哌替啶
- D. 心包穿刺
- E. 硝酸甘油

117. 患者,女,52岁。反复上腹痛伴消瘦,X线钡餐检查发现胃窦呈持续性向心性狭窄伴充盈缺损。进一步处理首选

- A. 手术探查
- B. B超
- C. 治疗后复查
- D. 胃液分析
- E. 胃镜及活检

118. 患者男性,60岁。急性广泛前壁心肌梗死2天,晕厥2次,心室率40次/分,律齐,心电图示Ⅲ度房室传导阻滞。首选治疗是

- A. 麻黄素
- B. 阿托品
- C. 异丙肾上腺素
- D. 人工心脏起搏器
- E. 溴苯辛

119. 患者,男,58岁。肝硬化腹腔积液,24小时尿钠 110 mmol(正常值 130~261 mmol),24小时尿钾 117 mmol(正常值 51~102 mmol)。选用何种利尿剂较好

- A. 氢氯噻嗪(双氢克尿噻)
- B. 利尿酸钠
- C. 螺内酯(安体舒通)
- D. 氯噻酮
- E. 呋塞米(速尿)

120. 患者,女,56岁。二尖瓣狭窄,而出

现端坐呼吸、紫绀、咳粉红色泡沫、两肺满布水泡音时,说明病情已处于

- A.肺动脉高压期
- B.左心房衰竭期

- C.右心衰竭期
- D.代偿期
- E.疾病终末阶段

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(121~122 题共用备选答案)

- A.风湿侵袭
- B.寒凝气机
- C.湿阻气机
- D.火邪窜络
- E.肝阳上亢

121.肢体疼痛伴有沉重感,其临床意义是

122.肢体头目疼痛伴有胀满感,其临床意义是

(123~124 题共用备选答案)

- A.春季
- B.仲夏
- C.长夏
- D.秋季
- E.冬季

123.《素问·金匱真言论》说“善病胸胁”的季节是

124.《素问·金匱真言论》说“善病痹厥”的季节是

(125~126 题共用备选答案)

- A.风
- B.寒
- C.湿
- D.燥
- E.火

125.具有“凝滞”特点的是

126.具有“黏滞”特点的是

(127~128 题共用备选答案)

- A.恶寒发热,无汗头痛
- B.发热恶风,头痛汗出
- C.发热汗出,口渴乏力
- D.胸脘痞闷,口腻不渴
- E.干咳少痰,口渴饮水

127.燥淫证的特点是

128.湿淫证的特点是

(129~130 题共用备选答案)

- A.热者寒之
- B.寒者热之
- C.热因热用
- D.塞因塞用
- E.通因通用

129.用消导积滞的方法治疗食积腹泻属

130.用温热药治疗寒证的方法属

(131~132 题共用备选答案)

- A.散寒解表,利水消肿
- B.散寒解表,温经通阳
- C.散寒解表,消肿排脓
- D.散寒解表,解鱼蟹毒
- E.散寒解表,温中止呕

131.生姜具有的功效是

132.麻黄具有的功效是

(133~134 题共用备选答案)

- A.风寒湿痹,外感风寒,喘咳
- B.风寒湿痹,外感风寒,胸痹
- C.风寒湿痹,外感风寒,破伤风

- D. 风寒湿痹, 外感风寒, 鼻渊
E. 风寒湿痹, 外感风寒, 上半身疼痛
133. 防风应用于治疗的病证是
134. 羌活应用于治疗的病证是
(135~136 题共用备选答案)
- A. 桑寄生
B. 蕲蛇
C. 五加皮
D. 威灵仙
E. 木瓜
135. 具有祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 安胎作用的药物是
136. 具有祛风湿, 补肝肾, 强筋骨, 利水作用的药物是
(137~138 题共用备选答案)
- A. 川乌
B. 桑寄生
C. 木瓜
D. 威灵仙
E. 五加皮
137. 具有祛风湿, 温经止痛作用的药物是
138. 具有祛风湿, 通络止痛, 消骨鲠作用的药物是
(139~140 题共用备选答案)
- A. 丁香
B. 细辛
C. 花椒
D. 小茴香
E. 高良姜
139. 治疗睾丸偏坠胀痛, 应选用
140. 治疗肾阳不足之阳痿, 应选用
(141~142 题共用备选答案)
- A. 抑制细胞内磷酸二酯酶, 减慢 CAMP 的分解
B. β_2 受体激动剂
C. 减少 cGMP 浓度, 使生物活性物质释放减少
D. 提高腺苷环化酶和抑制磷酸二酯酶, 稳定细胞溶酶体
E. 保护肥大细胞或嗜碱性粒细胞膜作用, 减少生物活性物质的释放
141. 氨茶碱
142. 沙丁胺醇
(143~144 题共用备选答案)
- A. 心影随体位改变
B. 肺动脉圆锥显著突出
C. 心影呈梨形
D. 心影呈靴形
E. 主动脉根部扩张
143. 主动脉瓣关闭不全可见
144. 二尖瓣狭窄可见
(145~146 题共用备选答案)
- A. 呕吐物为隔夜食物, 带腐臭味
B. 呕吐物为黄绿色, 带粪臭味
C. 呕吐物为大量黏液及食物
D. 呕吐物为血液
E. 吐出胃内容物后仍干呕不止
145. 急性胃炎的临床表现是
146. 急性胆囊炎的表现是
(147~148 题共用备选答案)
- A. 硝苯地平
B. 可乐定
C. 普萘洛尔
D. 硝普钠
E. 氢氯噻嗪
147. 合并心功能不全的轻度高血压患者首选
148. 可用于伴肾功能不良高血压患者的抗高血压药是
(149~150 题共用备选答案)
- A. 空腹血糖
B. 糖基化血红蛋白
C. 尿糖
D. 胰岛素释放试验
E. 葡萄糖耐量试验
149. 判断糖尿病控制程度的指标是
150. 鉴别 1 型和 2 型糖尿病最好的指标是

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	E	C	B	E	D	D	C	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	D	D	E	A	C	A	A	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	C	B	D	A	D	C	B	C	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	D	E	D	B	E	C	A	A	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	B	E	C	E	C	C	E	B	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	C	D	A	B	C	B	A	D	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
E	E	C	E	A	B	B	C	A	D
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	E	B	B	C	C	A	C	D	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	B	B	B	D	B	C	D	B	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	A	A	C	B	E	D	C	C	C
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	D	B	D	B	A	A	C	C	A
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C	D	E	A	B	D	E	D	C	B
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
C	E	B	E	B	C	E	D	E	B
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
E	A	C	E	A	C	A	D	D	A
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A	B	D	C	C	B	E	A	B	D

140-2

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中医执业医师资格考试

VIP 全真模拟卷

(医学综合笔试部分)

报考类别:中医执业医师

第二单元

考试日期:2021年8月

考试时间:14:00—16:00

考生姓名:_____

准考证号:_____

考场号:_____

第二单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 1.失神的患者突然颧赤如妆、语言不休，此属
- A.神乱
B.无神
C.有神
D.假神
E.少神
- 2.望神最主要的是观察
- A.面部表情
B.精神状态
C.眼神变化
D.反应灵敏
E.语言气息
- 3.头发成斑片状脱落的临床意义是
- A.血热
B.肾精亏虚
C.气血两虚
D.血虚受风
E.久病体弱
- 4.阴寒内盛，血行凝滞的舌象是
- A.舌绛紫而干
B.舌红而干
C.舌红肿胀
D.舌淡紫湿润
E.舌红有裂纹
- 5.热盛津伤，气血壅滞的舌象是
- A.舌红衄纹
B.舌绛紫而干
C.舌红肿胀
D.舌绛紫而润
E.舌红而干
- 6.形盛气虚者的表现为
- A.肥而食少
B.胖而能食
C.形瘦食多
D.形瘦食少
E.骨瘦如柴
- 7.咽喉漫肿、色淡红者的原因多为
- A.肺胃积热
B.肾阴不足，虚火上炎
C.阳虚火浮
D.痰湿凝聚
E.气阴两虚，虚火上浮
- 8.解颅是指
- A.囟门下陷
B.囟门高突
C.囟门迟闭
D.头形过小
E.头面肿胀
- 9.牙龈红肿而痛者多属
- A.肝火上炎
B.脾经有热
C.胃火上攻
D.胃阴虚火旺
E.肾阴虚火旺
- 10.郑声的临床意义是
- A.神气不足
B.脏气衰微，心神散乱

- C.心气虚弱
D.宗气大虚
E.痰扰神明
- 11.小儿食指络脉色鲜红的主病为
A.内热
B.外感表证
C.痛证
D.虚证
E.血络闭郁
- 12.阳气暴脱病人的面色表现是
A.面色苍白
B.面色淡白
C.面色青黑
D.面色青紫
E.面白无华
- 13.下列各项,不属于口臭临床意义的是
A.内有宿食
B.胃中有热
C.胃有寒湿
D.口腔不洁
E.口腔溃腐
- 14.疮疡红肿高大,根盘紧束,焮热疼痛者为
A.疽
B.痈
C.疔
D.疖
E.热气疮
- 15.舌短缩色青紫而湿润者是
A.热盛津伤
B.脾虚不运
C.寒凝筋脉
D.痰湿内阻
E.热入心包
- 16.舌肿胀而青紫晦暗者,是由于
A.气血壅滞,将要发斑
B.心脾有热
C.湿热痰饮上溢
D.中毒
E.热毒炽盛,深入血分
- 17.外感秽浊与热毒之邪相合的舌象的表现是
A.黄腻苔
B.白腻苔
C.灰黑苔
D.积粉苔
E.腐苔
- 18.夹舌本的经脉是
A.手太阴肺经
B.足少阴肾经
C.手少阴心经
D.足太阴脾经
E.足厥阴肝经
- 19.胃热患者的口气多为
A.腥气
B.酸气
C.臭秽气
D.恶臭气
E.腐臭气
- 20.燥咳的特点为
A.咳声紧闷
B.咳声清脆
C.咳声重浊
D.咳声低微
E.咳声如犬吠
- 21.两侧头痛属于
A.厥阴经
B.太阳经
C.阳明经
D.少阳经
E.太阴经
- 22.手足心汗出,与之相关的脏是
A.肾
B.肝
C.心
D.脾
E.肺
- 23.情志郁结不舒所致胸痛的特点是

- A.胸背彻痛
B.胸痛喘促
C.胸痛咯血
D.胸痛走窜
E.胸部刺痛
- 24.阳黄的病机是
A.风湿内侵
B.湿热内阻
C.寒湿困脾
D.脾虚湿阻
E.肝胆火盛
- 25.下列各项,不会导致“但头汗出”的是
A.中焦湿热上蒸
B.上焦邪热郁蒸
C.病危虚阳上越
D.久病伴随阳泄
E.阳虚不能固表
- 26.肩背寒见于
A.手阳明大肠经病证
B.手少阳三焦经病证
C.手太阴肺经病证
D.手少阴心经病证
E.手太阳小肠经病证
- 27.以下项目中属于细脉的相似脉者为
A.微、弱、散脉
B.濡、弱、伏脉
C.微、濡、虚脉
D.虚、弱、微脉
E.微、弱、濡脉
- 28.气分热盛的脉象为
A.虚数脉
B.洪数脉
C.濡数脉
D.细数脉
E.浮数脉
- 29.失眠多梦,惊悸不宁,口苦欲呕的临床意义是
A.心脾气血虚
B.心肾不交
C.心阴虚
D.胆郁痰扰
E.肝胆湿热
- 30.热证转寒的临床意义是
A.邪气过盛,耗伤正气
B.阳气偏盛,阳热内郁
C.痰湿凝聚
D.实证入内
E.寒包火证
- 31.下列各项中,不属于“佐药”功用范畴的是
A.配合君、臣药加强治疗作用
B.消除或减弱君、臣药的毒性
C.针对某些次要症状发挥治疗作用
D.制约君、臣药的峻烈之性
E.针对主病起主要治疗作用
- 32.方剂组成原则,确定“君臣佐使”的依据是
A.药味用量
B.药物的药性
C.药力大小
D.主治证候
E.剂型
- 33.与汗法无关的方剂类别是
A.表里双解剂
B.治风剂
C.祛湿剂
D.治燥剂
E.消食剂
- 34.不属于温里剂的方剂是
A.温脾汤
B.四逆汤
C.温胆汤
D.通脉四逆汤
E.理中汤
- 35.不属妊娠绝对禁用的中药是
A.巴豆
B.大戟

- C.斑蝥
D.半夏
E.麝香
- 36.解表剂不适用于
A.外感风寒
B.疮疡初起
C.麻疹已透
D.风温初起
E.水肿而有表证
- 37.具有清泻三焦结热功用的方剂为
A.小承气汤
B.防风通圣散
C.石膏汤
D.葛根芩连汤
E.普济消毒饮
- 38.麻杏石甘汤的功用是
A.解表散寒,兼清里热
B.疏风解表,清肺泻热
C.辛凉宣泄,清肺平喘
D.辛凉透表,清热解毒
E.疏风泻热,宣肺止咳
- 39.炙甘草汤的功用是
A.滋阴补肾,益气复脉
B.滋阴清热,养血复脉
C.益气养血,敛阴复脉
D.益气温阳,滋阴复脉
E.益气温阳,健脾补肺
- 40.生化汤重用全当归为君,意在
A.化瘀生新
B.养血润燥
C.养血补肝
D.和血止痛
E.养血润肠
- 41.暖肝煎的功用是
A.温补肝肾,行气止痛
B.行气疏肝,散寒止痛
C.行气止痛,软坚散结
D.温补脾肾,散寒止痛
E.滋肾润燥,疏肝行气
- 42.具有宣畅气机,清利湿热功用的方剂是
A.平胃散
B.二妙散
C.三仁汤
D.八正散
E.五苓散
- 43.不具有解表散邪,止咳化痰功用的方剂是
A.桑杏汤
B.杏苏散
C.桑菊饮
D.止嗽散
E.香薷散
- 44.固冲汤的功效是
A.益气健脾,固冲摄血
B.调补心肾,涩精止遗
C.温肾祛寒,缩尿止遗
D.补肾清热,祛湿止泻
E.滋阴清热,固经止血
- 45.大陷胸汤的功用
A.泻热破瘀,散结消肿
B.泻热通便,补益气血
C.温里散寒,通便止痛
D.泻热逐水,破结通便
E.攻下冷积,温补脾阳
- 46.天台乌药散的组成中不含
A.巴豆、川楝子
B.青皮、槟榔
C.当归、肉桂
D.小茴香、木香
E.良姜、乌药
- 47.养阴清肺汤的组成中不含
A.丹皮、芍药
B.元参、生地
C.贝母、薄荷
D.麦冬、甘草
E.桔梗、杏仁
- 48.组成中不含人参、大枣、甘草的方

剂是

- A.小柴胡汤
- B.半夏泻心汤
- C.旋覆代赭汤
- D.保和丸
- E.橘皮竹茹汤

49.小青龙汤中主治外寒的主要配伍药

味是

- A.麻黄、桂枝、细辛
- B.桂枝、芍药、甘草
- C.芍药、细辛、五味子
- D.干姜、细辛、半夏
- E.干姜、细辛、麻黄

50.解表透疹方的结构一般不包括

- A.透疹药物
- B.解表散邪
- C.清热解毒
- D.养阴生津
- E.凉血止血

51.温里剂组方中,最常与温里药配伍

的是

- A.滋阴药
- B.解表药
- C.活血药
- D.补气药
- E.固涩药

52.一贯煎中的君药是

- A.枸杞子
- B.地黄
- C.麦冬
- D.沙参
- E.川楝子

53.大枣在十枣汤中是

- A.君药
- B.臣药
- C.君药和佐药
- D.佐药
- E.使药

54.镇肝息风汤中的君药是

- A.龟板、玄参
- B.天冬、麦冬
- C.牛膝、代赭石
- D.芍药、川楝子
- E.龙骨、牡蛎

55.可用于外科疮疡肿毒阳证的方剂有

A.仙方活命饮、阳和汤、荆防败毒散、四妙勇安汤、黄连解毒汤

B.阳和汤、荆防败毒散、四妙勇安汤、黄连解毒汤、防风通圣散

C.荆防败毒散、四妙勇安汤、黄连解毒汤、防风通圣散、凉膈散

D.四妙勇安汤、黄连解毒汤、防风通圣散、凉膈散、大黄牡丹汤

E.黄连解毒汤、防风通圣散、凉膈散、大黄牡丹汤、小金丹

56.苓桂术甘汤与真武汤主治的主要不同点为

- A.痰饮与水气
- B.胸胁支满与小便不利
- C.中阳不足与肾阳不足
- D.脉弦滑与脉沉
- E.心悸与肢冷

57.与温胆汤在主治和配伍用药上较为接近的方剂是

- A.蒿芩清胆汤
- B.橘皮竹茹汤
- C.左金丸
- D.小柴胡汤
- E.半夏泻心汤

58.制方涉及“益火之源,以消阴翳”原理的方剂是

- A.四逆汤
- B.理中汤
- C.肾气丸
- D.六味地黄丸
- E.大补阴丸

59.配伍中含有“寓补于泻”原理的方剂是

- A.小承气汤
B.葛根芩连汤
C.真人养脏汤
D.痛泻要方
E.十枣汤
- 60.符合大承气汤煎制方法的正确选项是
- A.先枳实、厚朴,继大黄,后芒硝
B.先枳实、厚朴,继芒硝,后大黄
C.先枳实、大黄,继厚朴,后芒硝
D.先厚朴、大黄,继芒硝,后枳实
E.先枳实、芒硝,继厚朴,后大黄
- 61.引起吸气性呼吸困难的疾病是
- A.气管肿瘤
B.慢性阻塞性肺气肿
C.支气管哮喘
D.气胸
E.大块肺不张
- 62.发生呕血时,常提示一次上消化道出血量达到
- A.50 mL 以上
B.100 mL 以上
C.500 mL 以上
D.250 mL 以上
E.1 000 mL 以上
- 63.肝性脑病患者呼气味为
- A.酸味
B.氨味
C.腥臭味
D.烂苹果味
E.刺激性蒜味
- 64.感染性发热可见于
- A.系统性红斑狼疮
B.血液病
C.急性心肌梗死
D.鼻窦炎
E.恶性肿瘤
- 65.支气管分叉处肿瘤,往往先出现
- A.刺激性干咳
B.犬吠样咳嗽
C.大量咯血
D.长期慢性咳嗽
E.夜间阵发性呼吸困难
- 66.梗阻性黄疸可见于
- A.急性肝炎
B.胆总管结石
C.不同血型间输血
D.亚急性细菌性心内膜炎
E.肺梗死
- 67.以下不会出现黑便的疾病是
- A.白血病
B.再生障碍性贫血
C.胆道感染
D.胃炎
E.胃癌
- 68.呼吸性酸中毒时患者会出现何种典型呼吸改变
- A.Cheyne-Stokes 呼吸
B.Biots 呼吸
C.Kussmaul 呼吸
D.叹气样呼吸
E.抑制性呼吸
- 69.潮式呼吸可见于
- A.严重缺氧
B.颅内压增高
C.呼吸中枢受损
D.尿毒症
E.以上均可
- 70.伤寒者的面容是
- A.水肿面容
B.无欲貌
C.慢性病容
D.面具面容
E.急性病容
- 71.体检发现患者有“三偏”征,病变部位为
- A.皮质
B.内囊

- C.脑干
D.脊髓
E.基底核
- 72.气管向左移位,左侧胸廓凹陷,左侧触觉语颤减弱,左侧叩诊第4肋下浊音,听诊左侧呼吸音消失,应考虑为
- A.左侧气胸
B.左侧胸腔积液
C.左肺肺炎
D.左肺肺不张
E.肺气肿
- 73.面具面容,慌张步态,肌张力呈齿轮样强直,并伴震颤,考虑为
- A.小脑病变
B.脑血管病
C.震颤麻痹
D.脑萎缩
E.脑炎
- 74.胸膜摩擦音与心包摩擦音的鉴别要点是
- A.声音粗糙的程度
B.声音发出的部位
C.声音持续的长短
D.屏住呼吸是否存在
E.伴有心音还是杂音
- 75.风湿性心瓣膜病二尖瓣关闭不全时,心脏听诊不可能发现的体征为
- A.心尖区全收缩期杂音向左腋下传导
B.心尖区第一心音亢进
C.肺动脉瓣区第二心音分裂
D.心尖区第三心音
E.心尖区短促舒张早期杂音
- 76.属感染性发热的疾病是
- A.风湿热
B.斑疹伤寒
C.肝癌
D.广泛性皮炎
E.白血病
- 77.肠蠕动感呈金属音见于
- A.麻痹性肠梗阻
B.机械性肠梗阻
C.严重脓毒血症
D.血钾低
E.急性肠炎
- 78.风湿性心瓣膜病二尖瓣狭窄不可能有的心电图改变为
- A.左房肥大,P波增宽超过0.11秒,有切迹
B.心房颤动
C.右室肥大的心电图图形
D.左室肥大的心电图图形
E.右束支传导阻滞
- 79.粪便中查到巨噬细胞,多见于
- A.阿米巴痢疾
B.细菌性痢疾
C.急性胃肠炎
D.血吸虫病
E.霍乱
- 80.缺铁性贫血的红细胞形态学为
- A.单纯小细胞性贫血
B.小细胞低色素性贫血
C.正常细胞性贫血
D.大细胞性贫血
E.大细胞低色素性贫血
- 81.匙状甲多见于
- A.缺铁性贫血
B.紫癜型先天性心脏病
C.支气管扩张
D.风湿热
E.呼吸不良综合征
- 82.昏睡的主要临床表现是
- A.腱反射消失
B.能正确回答问题
C.呼唤和推动身体不能使其清醒
D.对强烈疼痛刺激可唤醒
E.角膜、对光反射消失
- 83.嗜酸性粒细胞减少见于
- A.伤寒极期

- B.猩红热急性期
C.慢性粒细胞性白血病
D.传染病恢复期
E.支气管哮喘
- 84.血中白细胞总数增多,可见于
A.伤寒杆菌感染
B.再生障碍性贫血
C.急性失血
D.使用氯霉素的影响
E.脾功能亢进
- 85.右心室增大的 X 线表现哪项是错误的
A.右前斜位、心前位间隙狭窄或消失
B.正位心尖圆钝上翘
C.左前斜位心前下缘隆凸
D.左前斜位心后上缘向后上隆突,左主支气管抬高
E.右心室增大主要向左、向前、向后扩大
- 86.胃溃疡的好发部位是
A.胃体小弯侧、胃窦部
B.胃体后壁
C.胃底部
D.胃体大弯侧
E.胃体前壁
- 87.下列哪项检查结果表示乙型肝炎的传染力最强
A.抗-HBs(+)、抗-HBc(+)、抗-HBe(+)
B.HBsAg(+)
C.抗-HBc(+)、HBeAg(+)、抗-HBe(-)
D.抗-HBs(+)
E.抗-HBs(+)、抗-HBe(+)
- 88.常用于诊断胰腺疾病的酶是
A.淀粉酶
B.脂肪酶
C.胰蛋白酶
D.碱性磷酸酶
E.乳酸脱氢酶
- 89.可见中性粒细胞核左移的疾病是
A.恶性贫血
B.再生障碍性贫血
C.急性化脓性感染
D.维生素 B₁₂ 缺乏
E.缺铁性贫血
- 90.下列哪种最能反映肾功能损害程度
A.尿蛋白量
B.尿中红细胞数
C.尿中白细胞数
D.尿中管型数
E.尿比重低且固定于 1.010
- 91.医学伦理学的学科性质是指它属于
A.医德学
B.元伦理学
C.应用伦理学
D.道德哲学
E.生命伦理学
- 92.现代医学模式是指
A.生物-心理-社会医学模式
B.生物医学模式
C.高新技术医学模式
D.整体医学模式
E.分子医学模式
- 93.高科技在医学中应用所产生的伦理正效应集中体现在
A.使临床诊断质量不断提高
B.使医学目的及其道德本质得到越来越充分的实现
C.使临床治疗质量不断提高
D.使医务人员必须面对许多医德问题
E.对医务人员的医德素质提出了许多新的要求
- 94.市场机制引入医学实践时最易带来医务人员拜金主义问题的是市场经济具有的
A.竞争性
B.逐利性
C.自主性
D.平等性

- E.自发性
- 95.被西方人称为“西医之父”的古希腊名医是
- A.盖伦
B.哈维
C.希波克拉底
D.胡佛兰德
E.伦琴
- 96.我国古代最杰出的医德经典是
- A.张仲景的《伤寒杂病论》
B.孙思邈的《大医精诚》
C.陈实功的《五戒十要》
D.肖纲的《劝医论》
E.李挺的《医学入门》
- 97.生命价值论是下列哪一项统一的理论
- A.生命神圣与人道论
B.生命神圣与生命质量
C.美德论与义务论
D.生命质量与生命价值论
E.义务论与公益论

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

- 98.不属于我国社会主义医德基本原则内容的一项是
- A.中西医并重
B.防病治病
C.救死扶伤
D.实行社会主义人道主义
E.全心全意为人民身心健康服务
- 99.对尊重患者自主权的正确理解是
- A.必须听从有地位的患者的决定
B.此准则适用于所有患者
C.此准则适用于患者的所有自我决定
D.医生的任何干预都是不道德的
E.承认患者有权根据自身状况做出理性决定
- 100.治疗要获得患者的知情同意,其道德价值应除外
- A.维持社会公正
B.保护患者自主权
C.解脱医生责任
D.协调医患关系
E.保证医疗质量
- 101.患者,男,35岁。2日来发热微恶寒,口苦,胁痛,尿短黄,大便黏臭,舌红苔薄白,脉数。其证候是
- A.表里俱热
B.表寒里热
C.真寒假热
D.真热假寒
E.表热里寒
- 102.某女,58岁。近半个月因工作劳累过度,时感气短乏力,与别人争执后心前区胀痛,且放射到左肩背部,伴心悸失眠,舌淡红苔薄白,脉沉弦。临床诊断最可能是
- A.心气虚证
B.肝气郁结证
C.气滞血瘀证
D.气滞心脉证
E.气虚血瘀证
- 103.某男,65岁。患慢性支气管炎已20年。3天前受凉,恶寒微发热,无汗,咳喘,痰稀色白,舌苔薄白腻,脉浮弦。临床诊断最可能是
- A.寒邪客肺证
B.风寒犯肺证
C.外感风寒证
D.痰湿阻肺证
E.饮停于肺证

104. 患儿,男,3岁。发热5天,T 38.5℃,恶风咳嗽,喉中痰鸣,呼吸气粗,鼻塞流浊涕,大便干,舌红苔薄黄,脉浮数。其最可能的诊断是

- A. 外感风热证
- B. 风热犯肺证
- C. 热邪壅肺证
- D. 痰热壅肺证
- E. 痰湿阻肺证

105. 某男,68岁。眩晕欲仆,语言謇涩,肢体麻木,舌绛苔少,脉弦数。临床诊断最可能是

- A. 肝阳上亢证
- B. 肝阳化风证
- C. 阴虚动风证
- D. 风痰阻络证
- E. 肝阴虚证

106. 某男,36岁。患胃病多年,今晚突然大量吐血,面唇俱白,冷汗淋漓,呼吸微弱,神志欠清,舌淡,脉浮大而散。临床诊断最可能是

- A. 气不摄血证
- B. 气血两虚证
- C. 气随血脱证
- D. 亡阳证
- E. 亡阴证

107. 某女,36岁。饥不欲食,面如漆柴,咳唾有血,善恐,心惕惕如人将捕之。临床诊断最可能是

- A. 手少阴心经病证
- B. 手太阴肺经病证
- C. 手厥阴心包经病证
- D. 足少阴肾经病证
- E. 足阳明胃经病证

108. 某男,35岁。长期胃脘隐痛、喜温喜按,面白,神疲乏力,近日伴见鼻流清涕,微热,恶风。临床诊断最可能是

- A. 实中夹虚证
- B. 虚中夹实证
- C. 虚实并重证

D. 里虚证

E. 里实证

109. 某男,38岁。身热,面红,口渴,但饮水不多,下利清谷,舌淡苔白,脉浮大无力。临床诊断最可能是

- A. 实热证
- B. 真热假寒证
- C. 亡阳证
- D. 真寒假热证
- E. 虚热证

110. 某女,32岁。近日头胀痛,身重酸楚,发热,舌苔白滑,脉濡。临床诊断最可能是

- A. 湿淫证
- B. 暑淫证
- C. 风寒证
- D. 风湿证
- E. 暑温证

111. 便秘腹痛,胁下偏痛,发热,手足不温,舌淡苔白腻,脉弦紧。治宜选用

- A. 三物备急丸
- B. 大承气汤
- C. 温脾汤
- D. 大黄附子汤
- E. 理中汤

112. 患者,男,38岁。见高热烦躁,痉厥,神昏谵语,最佳选方是

- A. 至宝丹
- B. 紫雪
- C. 大承气汤
- D. 羚角钩藤汤
- E. 苏合香丸

113. 伤暑,发热头痛,恶寒无汗,口渴面赤,胸闷不舒,舌苔白腻,脉浮数者。治宜选用

- A. 白虎汤
- B. 藿香正气散
- C. 新加香薷饮
- D. 柴葛解肌汤
- E. 清暑益气汤

114. 风邪初中经络, 舌强不能语言, 手足不能运动者。治宜选用

- A. 大秦芫汤
- B. 牵正散
- C. 天麻钩藤饮
- D. 地黄饮子
- E. 小活络丹

115. 患者, 男, 67 岁。小便白浊, 频数无度, 白如米泔, 凝如膏糊。治宜用

- A. 导赤散
- B. 萆薢分清饮
- C. 八正散
- D. 猪苓汤
- E. 小蓟饮子

116. 主治脾肾虚寒五更泻的方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 附子理中汤
- C. 四神丸
- D. 真人养脏汤
- E. 补中益气汤

117. 患者恶寒卧, 四肢厥冷, 吐泻腹痛, 口不渴, 神衰欲寐, 脉沉微。治疗应首选

- A. 理中丸
- B. 肾气丸
- C. 四逆散
- D. 当归四逆汤
- E. 回阳救急汤

118. 患者久病尿血, 体倦乏力, 气短声低, 面色不华, 舌质淡, 脉弱。治疗应首选

- A. 知柏地黄丸
- B. 无比山药丸
- C. 小蓟饮子
- D. 归脾汤
- E. 十灰散

119. 患者胁肋胀痛, 脘腹疼痛, 手足不温, 脉弦者。治疗应首选

- A. 一贯煎
- B. 柴胡疏肝散
- C. 逍遥散
- D. 四逆散

E. 痛泻药方

120. 暑季, 身热汗多, 咽干口渴, 体倦气短, 舌红少津, 脉虚细。治宜选用

- A. 生脉散
- B. 白虎汤
- C. 白虎加人参汤
- D. 清暑益气汤
- E. 六一散

121. 患者, 女性, 40 岁, 反复发作呼气性呼吸困难 3 年, 引起呼气性呼吸困难最可能的病因是

- A. 大气道肿瘤
- B. 小气道痉挛
- C. 大量胸腔积液
- D. 大片肺组织实变
- E. 气管异物

122. 患者, 女, 45 岁。消化性溃疡反复发作 10 年, 剧烈腹痛突然发作 3 小时, 全腹压痛、反跳痛、肌紧张, X 线检查可见膈下游离气体, 应诊断为

- A. 急性腹膜炎
- B. 急性肠梗阻
- C. 胃、十二指肠溃疡急性穿孔
- D. 急性胆囊炎
- E. 急性胰腺炎

123. 患者, 男, 45 岁。因突然呕血入院。10 年前患乙肝, 因肝功能损害曾多次住院治疗。近感腹胀, 乏力。查体: 脾大, 腹水。应首先考虑的是

- A. 急性支气管炎出血
- B. 胃溃疡出血
- C. 肝硬化, 胃底食管静脉曲张破裂出血
- D. 十二指肠溃疡出血
- E. 肺结核慢性空洞咯血

124. 男性, 50 岁。十多年来上腹部胀闷不适, 乏力, 近半年来加重, 且发现下肢水肿, 牙龈易于出血。查体: 面色灰褐色, 巩膜轻度黄染, 前胸有蜘蛛痣, 心肺(-), 腹部膨隆可见静脉曲张, 静脉曲张血流方向脐以上向上, 脐以下向下。肝未触及, 脾肋下 2 横

指,腹部移动性浊音(+),液波震颤(+),下肢凹陷性水肿(+)。临床诊断最可能是

- A. 下腔静脉阻塞
- B. 上腔静脉阻塞
- C. 慢性肝炎
- D. 门脉性肝硬化
- E. 肝脓肿

125.患者,男,40岁。晨起恶心、呕吐,呕吐物为鲜红血液含血块,应判断为

- A. 陈旧性出血
- B. 幽门梗阻
- C. 胃溃疡合并出血
- D. 胆汁反流
- E. 急性上消化道大出血

126.患者,男,45岁。心悸10天,心电图示多个导联提前出现宽大畸形QRS波群,其前无相关P波。其后T波与QRS波群主波方向相反,代偿间歇完全。其诊断是

- A. 房性早搏
- B. 室性早搏
- C. 房室交界性早搏
- D. 房室传导阻滞
- E. 室内传导阻滞

127.患者,男性,68岁。间断咳嗽、咳痰20年,痰量较多,呈脓性,有时带血。近半年来心悸,双下肢水肿。心电图检查:Ⅱ、Ⅲ、aVF导联P波高尖,≥2.5mm,QRSV₁、V₂呈QS形,电轴右偏。诊断可能是

- A. 慢性支气管炎并发肺心病、心功能不全
- B. 慢性支气管炎、陈旧性心肌梗死、心

功能不全

- C. 支气管扩张并发肺心病、心功能不全
- D. 支气管扩张、陈旧性心肌梗死、心功

能不全

- E. 肺结核并发肺心病、陈旧性心肌梗死

128.患者,女,30岁。反复上腹痛6年,饥饿时加重,进食后减轻。近1周来进食后上腹部胀痛加重,但大量呕吐后减轻。查体:轻度脱水,上腹部膨隆,有震水音。应首先考虑的是

- A. 多发性溃疡病
- B. 复合性溃疡病
- C. 胃溃疡恶变
- D. 十二指肠溃疡伴幽门梗阻
- E. 胃窦部溃疡伴急性穿孔

129.女性,40岁。既往有风湿性心脏病史,近一周出现咳嗽、咯痰,双下肢浮肿,不能平卧。该患者还可能出现下列哪项体征

- A. 深大呼吸
- B. 呼吸过速
- C. 叹息样呼吸
- D. 潮式呼吸
- E. 呼吸过缓

130.男性,18岁。右侧呼吸运动减弱,语颤消失,右下肺叩诊实音,实音区上方闻及支气管呼吸音。首先应考虑为

- A. 支气管扩张
- B. 支气管哮喘
- C. 大叶性肺炎
- D. 胸腔积液
- E. 支气管肺癌

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(131~132题共用备选答案)

- A. 动则汗出

B. 汗出蒸蒸

- C. 冷汗淋漓

- D.半身汗出
E.睡时汗出
- 131.实热证可见
132.阴虚证可见
(133~134 题共用备选答案)
A.阳气不足
B.营血亏损
C.阳气暴脱
D.中寒腹痛
E.虚阳上越
- 133.面色白而虚浮者主
134.面色淡白而瘦弱者主
(135~136 题共用备选答案)
A.脓血便
B.灰白色便
C.稀糊状便
D.柏油样便
E.鲜血便
- 135.阻塞性黄疸为
136.上消化道出血为
(137~138 题共用备选答案)
A.胸闷隐痛,时作时止
B.胸部剧痛,入夜尤甚
C.胸痛彻背,感寒痛甚
D.胸闷气短,畏寒肢冷
E.胸闷如窒,气短喘促
- 137.胸痹气阴两虚证,其临床特点是
138.胸痹阴寒凝滞证,其临床特点是
(139~142 题共用备选答案)
A.益气利水
B.温阳利水
C.滋阴利水
D.行气利水
E.清热利水
- 139.五皮饮的功用是
140.猪苓汤的功用是
141.真武汤的功用是

- 142.防己黄芪汤的功用是
(143~144 题共用备选答案)
A.血府逐瘀汤
B.复元活血汤
C.桃核承气汤
D.七厘散
E.生化汤
- 143.具有祛瘀定痛,活血止血功用的方剂是
144.具有养血活血,祛瘀生新功用的方剂是
(145~146 题共用备选答案)
A.闭目难立征阳性
B.巴宾斯基征阳性
C.拉赛格征阳性
D.克尼格征阳性
E.手足抽搐
- 145.坐骨神经痛时
146.脑膜炎时
(147~148 题共用备选答案)
A.喷射性呕吐
B.呕吐伴眩晕,眼球震颤
C.呕吐伴剧烈上腹部疼痛
D.呕吐隔餐或隔日食物
E.呕吐伴贫血、水肿、食欲缺乏及尿化验异常改变
- 147.急性胰腺炎时会出现
148.梅尼埃病时会出现
(149~150 题共用备选答案)
A.指纹未超风关
B.指纹显于风关
C.指纹达于气关
D.指纹透关射甲
E.指纹达于命关
- 149.邪入脏腑,病情严重可表现出
150.病情凶险,重危可表现出

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	D	D	B	A	D	C	C	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	C	B	C	D	D	B	C	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	D	B	E	C	F	B	D	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	D	E	C	D	C	B	C	D	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	C	E	A	D	C	E	D	A	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	B	D	C	D	C	A	C	E	A
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
A	D	C	D	A	B	C	C	B	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
B	D	C	D	B	B	B	D	B	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	D	A	C	D	A	C	A	C	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	A	B	B	C	B	B	A	E	C
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A	D	B	B	B	C	D	B	D	A
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	B	C	A	B	C	E	D	D	D
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
B	C	C	D	E	B	C	D	B	D
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
B	E	A	B	B	D	A	C	D	C
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
B	A	D	E	C	D	C	B	E	D

140-2

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中医执业医师资格考试
VIP 全真模拟卷
(医学综合笔试部分)

报考类别:中医执业医师

第三单元

考试日期:2021年8月

考试时间:9:00—11:00

考生姓名:_____

准考证号:_____

考场号:_____

第三单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列关于实体感冒的各项叙述中,错误的是
A. 一般以风寒、风热、暑湿症状为主
B. 无反复感邪,反复发病之势
C. 无气、血、阴、阳虚损症状
D. 治疗上当扶正解表
E. 病程短,痊愈快
2. 下列各项,对于鉴别普通感冒与时行感冒无意义的是
A. 病情轻重
B. 有无流行性
C. 有无传变
D. 有无发热
E. 病程长短及预后
3. 治疗咳嗽,除以治肺为主外,还应注意治
A. 肝、脾、肾
B. 心、肝、肾
C. 心、脾、肾
D. 心、肝、脾
E. 肝、胃、肾
4. 治疗常人感冒之风寒束表证,首选的方剂是
A. 参苏饮
B. 新加香薷饮
C. 加减葶苈汤
D. 银翘散
E. 荆防败毒散
5. 下列哪项对哮与喘鉴别诊断无意义
A. 有无宿根
B. 喉中有无水鸣声
C. 哮必兼喘
D. 喘未必兼哮
E. 呼吸急促
6. 下列各项,不属咳嗽病因的是
A. 外感六淫
B. 禀赋不足
C. 痰湿痰热
D. 肝郁化火
E. 肺阴亏虚
7. 喘证的发病机制主要在
A. 肺气虚
B. 肺脾气虚
C. 肺肾出纳失常
D. 脾肾亏虚
E. 肾不纳气
8. 治疗咳嗽之肺阴亏耗证,应首选的方剂是
A. 桑菊饮
B. 沙参麦冬汤
C. 生脉散合补肺汤
D. 桑杏汤
E. 生脉地黄汤
9. 肺痿的病理性性质基本以下列哪项为主
A. 阴虚
B. 气阴两虚
C. 肺肾两虚
D. 阴阳两虚

- E. 阴虚肺燥
10. 肺胀的病理性质为
- A. 虚证
B. 实证
C. 虚实夹杂
D. 寒热错杂
E. 标实本虚
11. 关于惊悸和怔忡叙述不正确的是
- A. 怔忡每由内因引起, 惊悸常由外因而成
B. 惊悸日久可发展为怔忡
C. 怔忡常自觉心中惕惕, 病来虽渐, 但全身情况较差
D. 怔忡患者, 又易受外惊所扰, 使动悸加重
E. 惊悸以虚证为多, 发则悸跃不能自控
12. 治疗肺痈恢复期, 应首选的方剂是
- A. 银翘散
B. 千金苇茎汤
C. 桔梗杏仁煎
D. 加味桔梗汤
E. 沙参清肺汤
13. 胸痹, 猝然心痛如绞, 心痛彻背, 喘不得卧, 伴形寒肢冷, 冷汗自出, 面色苍白, 苔薄白, 脉沉细。首选方剂为
- A. 乌头赤石脂丸
B. 瓜蒌薤白白酒汤
C. 瓜蒌薤白半夏汤
D. 枳实薤白桂枝汤
E. 人参养荣汤
14. 下列各项, 不属于肺胀实证治疗原则的是
- A. 祛邪宣肺
B. 益肾健脾
C. 降气化痰
D. 温阳利水
E. 开窍息风
15. 下列除哪项外均为不寐的病因
- A. 情志所伤
B. 饮食不节
C. 外邪侵袭
D. 素体虚弱
E. 心虚胆怯
16. 内伤头痛的主要病位在
- A. 肝、脾、胃
B. 肝、心、脾
C. 肝、脾、肾
D. 心、肝、肾
E. 胆、肝、脾
17. 痰浊头痛的特征是
- A. 头痛如裹
B. 头痛如裂
C. 头痛且空
D. 头痛且晕
E. 头痛昏蒙
18. 眩晕证与哪些脏腑有关
- A. 肺、脾、肾
B. 心、肝、肾
C. 肝、脾、肾
D. 肺、胃、肾
E. 肺、肝、肾
19. 中风病位在脑, 与哪些脏腑密切相关
- A. 心肺脾肝
B. 心脾肾肺
C. 肝脾肺肾
D. 心肺肾肝
E. 心肝脾肾
20. 下列各项, 哪一项不是癫狂病发病的主要因素
- A. 阴阳失调
B. 情志抑郁
C. 痰气上扰
D. 气血凝滞
E. 醇酒厚味
21. 痫病痰火扰神证主方是
- A. 龙胆泻肝汤合涤痰汤
B. 大补元煎合六君子汤
C. 朱砂安神丸

- D.龙胆泻肝汤
E.导痰汤
- 22.痴呆与健忘的鉴别关键是痴呆无
- A.善忘前事
B.沉默寡言
C.善忘后事
D.神志障碍
E.表情呆滞
- 23.胃痛的治疗,以下何者为主
- A.疏肝和胃止痛
B.调和脾胃止痛
C.理气和胃止痛
D.理气活血止痛
E.益气健脾止痛
- 24.痞满的基本病机是
- A.食滞肠胃,痞塞不通
B.中焦气机不利,脾胃升降失职
C.外邪内陷,阻塞气机
D.湿盛脾虚,气机阻滞
E.肝气郁滞,横逆犯脾
- 25.治疗肝气犯胃呕吐的主方是
- A.四七汤
B.柴胡疏肝散
C.越鞠丸
D.启膈散
E.温胆汤
- 26.治疗痰气交阻噎膈的主方是
- A.半夏厚朴汤
B.柴胡疏肝散
C.越鞠丸
D.启膈散
E.温胆汤
- 27.以呃逆的声音辨证,下列何者为胃火上逆型呃逆
- A.呃声沉缓
B.呃逆连声
C.呃逆低沉,气不得续
D.呃逆洪亮,冲逆而出
E.呃逆急促而不连续
- 28.下列哪项不是腹痛的病因
- A.外感时邪
B.饮食不节
C.情志失调
D.阳气素虚
E.痰热素盛
- 29.治疗泄泻湿热伤中证的主方是
- A.藿香正气散
B.胃苓汤
C.葛根芩连汤
D.参苓白术散
E.保和丸
- 30.下列哪项不是湿热痢的主症
- A.腹痛
B.里急后重
C.下痢赤白相杂
D.肛门灼热
E.神昏痉厥
- 31.以下哪项不是便秘的主要病因病机
- A.阳虚体弱,阴寒内生
B.素体阳盛,肠胃积热
C.情志失和,气机郁滞
D.肺气不宣,气化不行
E.气血不足,下元亏损
- 32.下列选项中,胁痛的病机哪一项是错误的
- A.肝气郁结
B.肝气上逆
C.瘀血停着
D.肝胆湿热
E.肝阴不足
- 33.阴黄的治法是
- A.健脾和胃,温化寒湿
B.清热利湿,和胃醒神
C.清热解毒,利湿化浊
D.清热解毒,凉血安神
E.清热解毒,凉营开窍
- 34.下列哪一项对积与聚无鉴别意义
- A.积属血,聚属气

- B. 积属脏病,聚属腑病
 C. 积的病程长,聚的病程短
 D. 积为固定不移,聚为聚散无常
 E. 积的病位在大腹,聚的病位在小腹
35. 鼓胀的病机是
 A. 气滞血瘀
 B. 气滞血瘀水停
 C. 气滞湿阻血瘀
 D. 气滞痰凝血瘀
 E. 气虚饮停血瘀
36. 疟疾的病机为
 A. 疟邪伏于少阳、募原,内搏五脏
 B. 风温外袭,邪在卫分
 C. 风寒外邪,侵犯腠理,营卫失和
 D. 湿热内蕴,正邪相搏
 E. 疟邪伏于里,因外之诱因引发所致
37. 下列哪项不是水肿发病的常见原因
 A. 风邪外袭
 B. 湿毒浸淫
 C. 饮食劳倦
 D. 房劳过度
 E. 情志内伤
38. 下列哪项不是淋证的主症
 A. 小便频数短涩
 B. 小便淋漓刺痛
 C. 小便欲出未尽
 D. 小便量少或无尿
 E. 少腹拘急痛引腰腹
39. 治疗癃闭浊瘀阻塞证,应首选
 A. 桃红四物汤
 B. 失笑散
 C. 丹参饮
 D. 代抵挡丸
 E. 血府逐瘀汤
40. 关格的发生,与下列哪些脏器有关
 A. 脾、肾
 B. 脾、肾、心
 C. 心、肾
 D. 脾、肾、心、肝

- E. 脾、肾、膀胱
41. 郁证总的治法是
 A. 疏肝解郁
 B. 化痰散结
 C. 养心安神
 D. 养血柔肝
 E. 疏通气机
42. 外邪侵袭,损伤脉络而引起出血,最为多见的邪气是
 A. 风
 B. 寒
 C. 暑
 D. 热
 E. 燥
43. 以下哪项不是痰饮病的常见病因
 A. 外感寒湿
 B. 饮食所伤
 C. 情志失调
 D. 劳欲所伤
 E. 久病体虚,年高气弱
44. 消渴的病理变化主要是
 A. 肾阴亏损
 B. 胃热炽盛
 C. 肺热津伤
 D. 阴虚燥热
 E. 阴阳两虚
45. 治疗肺胀肾气虚证,应首选的方剂是
 A. 苏子降气汤合三子养亲汤
 B. 越婢加半夏汤
 C. 桑白皮汤
 D. 真武汤合五苓散
 E. 平喘固本汤合补肺汤
46. 下列哪项不是内伤发热的病因
 A. 恼怒抑郁
 B. 跌打损伤
 C. 劳累过度
 D. 饮食不调
 E. 外邪袭表,入里发热
47. 《理虚元鉴·治虚有三本》中指出下

列何为治虚之道毕矣

- A. 治心、治脾、治肾
- B. 治肺、治脾、治肾
- C. 治肺、治肝、治肾
- D. 治心、治肝、治肾
- E. 治心、治脾、治肝

48. 治疗脑瘤痰瘀阻窍证的代表方是

- A. 通窍活血汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 大定风珠
- D. 血府逐瘀汤
- E. 天麻钩藤饮合黄连解毒汤

49. 中风、昏迷、痫病、厥证共用的主要症状为

- A. 语言不利
- B. 口眼歪斜
- C. 突然昏仆
- D. 四肢抽搐
- E. 昏不知人

50. 痹证所以有风寒湿痹与热痹, 大多数医家认为取决于

- A. 感邪性质的不同
- B. 病变部位的不同
- C. 感邪季节的不同
- D. 地理、气候、环境的不同
- E. 人体素质的阳气盛衰不同

51. 治疗行痹的首选方是

- A. 桂枝芍药知母汤
- B. 桂枝汤
- C. 防风汤
- D. 麻黄汤
- E. 越婢汤

52. 痿证辨证首当辨

- A. 脏腑病位
- B. 标本虚实
- C. 阴阳
- D. 表里
- E. 气血

53. 颤证的基本病机是因何种原因导致

筋脉失养

- A. 阳气虚衰
- B. 肝风内动
- C. 髓海不足
- D. 热极生风
- E. 虚风内动

54. 下列哪项不是腰痛的主要病因

- A. 感受寒湿
- B. 感受湿热
- C. 劳倦过度
- D. 情志内伤
- E. 跌打损伤

55. 奇经八脉中既称“血海”, 又称“经脉之海”的是

- A. 冲脉
- B. 任脉
- C. 督脉
- D. 带脉
- E. 维脉

56. 下列哪种疾病首选刺血拔罐法

- A. 咽喉肿痛
- B. 泄泻
- C. 咳嗽
- D. 丹毒
- E. 牙痛

57. 下列腧穴中, 哪一个是脾经络穴

- A. 偏历
- B. 大陵
- C. 太白
- D. 太冲
- E. 公孙

58. 治疗急性胃病, 应首选

- A. 足三里
- B. 中脘
- C. 梁丘
- D. 合谷
- E. 胃俞

59. 心的募穴是

- A. 膻中

- B.巨阙
C.鸠尾
D.中庭
E.中府
- 60.下列穴位中,可治疗痔疮的是
A.合谷
B.温溜
C.承山
D.委中
E.丰隆
- 61.下列既是络穴又是八脉交会穴的是
A.后溪
B.申脉
C.内关
D.照海
E.足临泣
- 62.治疗腰脊强痛的穴位是
A.兑端
B.素髻
C.水沟
D.承浆
E.印堂
- 63.治疗急性泄泻,宜取
A.脾俞、中脘、章门、足三里
B.水分、天枢、上巨虚、阴陵泉
C.足三里、天枢、命门、关元
D.脾俞、章门、上巨虚、下巨虚
E.太溪、肾俞、足三里、天枢
- 64.除哪个穴之外,均与肚脐在同一水平
A.神阙
B.梁门
C.盲俞
D.大横
E.天枢
- 65.下列特定穴中,主要治疗腑病的是
A.原穴
B.络穴
C.下合穴
D.俞穴
E.八脉交会穴

- 66.属于提插补泻之补法操作的是
A.先深后浅,轻插重提,提插幅度大
B.先深后浅,轻插重提,提插幅度小
C.先浅后深,重插轻提,提插幅度大
D.先浅后深,重插轻提,提插幅度小
E.先浅后深,重插重提,提插幅度大
- 67.治疗风寒感冒,除主穴外,还应的配穴是
A.曲池、尺泽
B.风门、肺俞
C.阴陵泉、委中
D.足三里、脾俞
E.少商、商阳
- 68.治疗月经后期的刺灸方法是
A.关元加隔姜灸
B.三阴交毫针泻法
C.血海毫针泻法
D.三阴交加拔罐
E.血海加拔罐
- 69.从任脉开始,由内向外的经脉排列是
A.胃经、脾经、肾经
B.胃经、肾经、脾经
C.肾经、脾经、胃经
D.肾经、胃经、脾经
E.脾经、肾经、胃经
- 70.胃的募穴所属的经脉是
A.肺经
B.任脉
C.胃经
D.脾经
E.肾经
- 71.“起于大指之端,夹咽,连舌本,散舌下”的经脉是
A.手少阴心经
B.足厥阴肝经
C.足太阴脾经
D.足少阴肾经
E.手厥阴心包经
- 72.足少阳经、手少阳经的交接部位在
A.目内眦旁

- B.目外眦旁
C.鼻翼旁
D.口角旁
E.颧骨旁
- 73.太阳经头痛一般表现在
A.顶部
B.颞部
C.顶颞部
D.前额部
E.后枕部
- 74.下面的骨度分寸错误的是
A.前发际至后发际 12 寸
B.歧骨至脐中 9 寸
C.两乳头之间 8 寸
D.两肩胛骨脊柱缘之间 6 寸
E.耳后乳突之间 9 寸
- 75.下疾徐补泻手法中的补法是
A.疾速刺入,多捻转,徐徐出针
B.疾速刺入,多捻转,快出针
C.疾速刺入,少捻转,快出针
D.徐徐刺入,少捻转,疾速出针
E.疾速刺入,少捻转,徐徐出针
- 76.起于下极之输,并于脊里,上至风府,入属于脑的经脉是
A.冲脉
B.任脉
C.带脉
D.脾之大络
E.督脉
- 77.大肠的募穴是
A.足三里
B.中脘
C.梁丘
D.合谷
E.天枢
- 78.四关穴是指
A.曲池、足三里
B.支沟、阳陵泉
C.合谷、太冲
D.外关、足临泣
E.内关、公孙
- 79.下列穴位属手少阳三焦经的是
A.耳门
B.听宫
C.听会
D.合谷
E.列缺
- 80.位于两眉间的穴位是
A.兑端
B.素髻
C.水沟
D.承浆
E.印堂
- 81.下列既是八会穴又是合穴的是
A.阴谷
B.委中
C.委阳
D.阳陵泉
E.阴陵泉
- 82.善于治疗无脉症的穴是
A.扶突
B.支正
C.攒竹
D.太渊
E.血海
- 83.治疗寐而易醒,头晕耳鸣,腰膝酸软,五心烦热,遗精盗汗,舌红,脉细数。除主穴外,还应选取
A.丰隆、内庭、曲池
B.丘墟、心俞、内关
C.心俞、脾俞、足三里
D.太溪、水泉、心俞
E.公孙、内关、足三里
- 84.治疗瘾疹的主穴是
A.曲池、合谷、血海、膈俞、委中
B.大椎、曲池、太冲、风池、中脘
C.大椎、太冲、三阴交、血海、内庭
D.血海、内庭、足三里、气海、天枢
E.外关、风池、三阴交、大椎、膈俞
- 85.有关针灸治疗蛇串疮,叙述不正确

的是

- A. 治以泻火解毒,清热利湿
- B. 以局部阿是穴、夹脊为主穴
- C. 疱疹局部阿是穴用围刺法
- D. 对出现的疱疹不能用三棱针点刺
- E. 后遗神经痛者可在局部用皮肤针

叩刺

86. 产后乳少,或见乳房胀满疼痛,或见乳房柔软无胀感,针灸治疗应选用的腧穴是

- A. 乳根、太冲、期门
- B. 乳根、膻中、少泽
- C. 肝俞、太冲、期门
- D. 乳根、脾俞、足三里
- E. 中脘、天枢、期门

87. 十二经别是指

- A. 十二正经离、入、出、合的别行部分
- B. 十二正经离、合、出、入的别行部分
- C. 十二正经离、出、入、合的别行部分
- D. 十二正经离、出、合、入的别行部分
- E. 十二正经离、入、合、出的别行部分

88. 冲脉被称之为

- A. 髓海
- B. 气海
- C. 水谷之海
- D. 血海
- E. 以上均是

89. 关于奇经八脉的描述,下面哪项是正确的

- A. 不直属脏腑
- B. 无表里配合关系
- C. 无十二正经那样的循环流经关系
- D. 除任、督二脉外,无专属腧穴

E. 以上都对

90. 根据骨度分寸法,印堂到后发际正中是几寸

- A. 12 寸
- B. 15 寸
- C. 18 寸
- D. 19 寸
- E. 20 寸

91. 捻转补泻中的泻法是

- A. 捻转角度大,用力重,频率快
- B. 捻转角度大,用力重,频率慢
- C. 捻转角度小,用力轻,频率慢
- D. 捻转角度小,用力重,频率快
- E. 捻转角度大,用力轻,频率快

92. 治疗命门火衰证,宜选用

- A. 艾炷灸
- B. 隔盐灸
- C. 温和灸
- D. 隔蒜灸
- E. 隔附子饼灸

93. 下合穴的主治是

- A. 体重节痛
- B. 逆气而泄
- C. 五脏病症
- D. 六腑病症
- E. 喘咳寒热

94. 下列哪一对穴位不属于八会穴

- A. 章门、中脘
- B. 大杼、膈俞
- C. 太冲、合谷
- D. 绝骨、阳陵泉
- E. 膻中、太渊

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

95. 患者,男,27 岁。恶寒重,发热轻,头痛,鼻塞流清涕,周身酸楚疼痛,舌苔薄白而

润,脉浮紧。治疗应首选

- A.三拗汤
- B.藿香正气散
- C.小青龙汤
- D.荆防败毒散
- E.新加香薷饮

96.患者,女性,25岁。咳嗽少痰,鼻干咽燥,喉痒时连声作呛,头痛微寒,身热,舌苔薄黄。其治法宜

- A.养阴清肺,化痰止咳
- B.清润肺燥,化痰止咳
- C.散寒宣肺,润燥止咳
- D.疏风清肺,润燥止咳
- E.清肺泻肝,化痰止咳

97.患者,女,42岁。心痛憋闷,心悸盗汗,虚烦不寐,腰膝酸软,头晕耳鸣,口干便秘,舌红少津,苔薄,脉细数。治疗应首选

- A.酸枣仁汤
- B.参附汤合右归饮
- C.生脉散合人参养荣汤
- D.天王补心丹合炙甘草汤
- E.至宝丹

98.年轻男性。咳嗽气急,咯吐脓痰腥臭,壮热烦躁,胸闷疼痛,苔黄腻,脉滑数。此为肺痈哪一期

- A.初期
- B.成痈期
- C.溃脓期
- D.恢复期
- E.慢性期

99.患者,男,27岁。干咳少痰,咳声短促,痰中带血,五心烦热,时有盗汗,形体消瘦,胸部闷痛隐隐,舌红少苔,脉细数。其诊断是

- A.内伤咳嗽,肺阴亏耗
- B.肺痿,肺阴亏损
- C.哮证,肺虚
- D.喘证,肺虚
- E.虚劳,肺阴虚

100.患者,女性,50岁。有风湿性关节

炎史,现心悸不安,胸闷不舒,心痛时作,舌质紫暗,脉涩。其治疗应选用

- A.朱砂安神丸
- B.桃红四物汤
- C.通窍活血汤
- D.桃仁红花煎
- E.酸枣仁汤

101.患者,男性,55岁。胸痛反复发作两月,现胸部刺痛,夜间尤甚,持续10分钟左右,病处固定,多因生气及受寒后加重,时有心悸,舌质紫暗,脉象沉涩。首选方为

- A.瓜蒌薤白半夏汤
- B.参附汤合右归饮
- C.血府逐瘀汤
- D.乌头赤石脂丸
- E.瓜蒌薤白白酒汤

102.患者既往有“冠心病”病史,正值正月发病,症见心痛如绞,手足不温,冷汗出,心悸气短,舌薄白,脉沉紧。其治法应为

- A.温振心阳,补益心气
- B.疏调气机,和血舒脉
- C.辛温散寒,宣通心阳
- D.活血化瘀,通脉止痛
- E.通阳泄浊,豁痰开窍

103.患者,男,36岁。平日性情急躁易怒,近日因工作不顺致失眠,不思饮食,口渴喜饮,口苦目赤,小便黄,大便秘结,舌红苔黄,脉弦数。其最佳治疗方剂为

- A.龙胆泻肝汤
- B.丹栀逍遥散
- C.滋水清肝饮
- D.柴胡疏肝散
- E.黄连温胆汤

104.刘某,男,18岁。近日天气炎热,调摄不慎,而出现头痛而胀,甚则头痛如裂,发热恶风,面红目赤,口渴欲饮,便秘溲黄,舌质红,苔黄,脉浮数。选方宜

- A.川芎茶调散
- B.芎芷石膏汤
- C.羌活胜湿汤

D.天麻钩藤饮

E.银翘散

105. 吴某,女,51岁。平素头晕头痛,耳鸣目眩,少寐多梦,突然发生口眼歪斜,舌强语謇,半身不遂,舌质红,脉弦细数。治疗方剂宜选

A.大秦芫汤

B.镇肝息风汤

C.安宫牛黄丸

D.至宝丹

E.涤痰汤

106. 患者胃痛,脘腹胀满,噎腐吞酸,吐不消化食物,舌苔厚腻,脉滑。治疗应首选

A.保和丸

B.柴胡疏肝散

C.调胃承气汤

D.小承气汤

E.越鞠丸

107. 下列哪一项不是胃阴亏耗型胃痛的主症特点

A.胃痛隐隐

B.口燥咽干

C.口不渴

D.舌红少苔

E.脉弦细

108. 患者田某,呃声沉缓有力,得热减得寒甚,脘膈不舒,纳少,口不渴,舌苔白润。应诊断为

A.胃中寒冷型呃逆

B.胃火上逆型呃逆

C.气机郁滞型呃逆

D.脾胃阳虚型呃逆

E.胃阴不足型呃逆

109. 患者,男,16岁。昨日饱食后出现腹痛肠鸣,泻下粪便臭如败卵,泻后痛减,伴有不消化食物,脘腹痞满,噎腐酸臭,不思饮食,舌苔垢浊,脉滑。诊断属于

A.饮食停滞型呕吐

B.饮食停滞型胃痛

C.食滞肠胃型泄泻

D.饮食停滞型腹痛

E.湿热泄泻

110. 方某,男,40岁。患痢疾10年余。痢下赤白脓血,腹痛隐隐,心中烦热,咽干口燥,午后潮热,体虚乏力,舌红苔少,脉细数。辨证属于

A.湿热痢

B.休息痢

C.虚寒痢

D.寒湿痢

E.阴虚痢

111. 患者男,18岁。4天前突然出现目黄身黄,黄色鲜明,发热口渴,心中烦躁,恶心想吐,小便短少而黄,大便秘结,舌苔黄腻,脉弦数。属于何种病型

A.湿热并重型黄疸

B.寒湿阻遏型黄疸

C.湿热蕴蒸,湿重于热型的黄疸

D.湿热蕴蒸,热重于湿型的黄疸

E.脾虚型黄疸

112. 患者男性,27岁。2天前因汗出受风诱发头身痠痛、恶寒、发热、咽痛,旋即出现颜面及双下肢浮肿,自服“解热镇痛药”热退肿不消。症见:颜面及双下肢浮肿,尿少色黄赤,腰痛,周身不舒,咽喉红肿疼痛,舌暗红,苔薄黄,脉滑数而见浮象。应诊断为

A.感冒

B.水肿-阳水

C.腰痛

D.肺胀

E.水肿-阴水

113. 患者小便热涩疼痛,尿色深红,或夹有血块。应首先考虑的是

A.热淋

B.石淋

C.气淋

D.血淋

E.尿血

114. 刘某,男,70岁。5日前因饮食不慎而呕吐,随之食欲减退,小便淋漓,大便溏

薄,曾以抗生素对症治疗,小便不通,食不知味,面色晦暗,形寒肢冷,神疲乏力,浮肿,腰以下为甚,舌淡体胖,苔白腻,脉沉细。下列处方最佳选用

- A.八正散
- B.清肺饮
- C.沉香散
- D.代抵当汤
- E.温脾汤

115.患者,男,40岁。腰痛1年,近1个月来腰部隐隐作痛,两腿软乏力,每因劳累后症状加重。治疗应首选主穴是

- A.肾俞、阳陵泉、关元、悬钟
- B.肾俞、委中、腰阳关、大肠俞
- C.肾俞、关元、足三里、太溪
- D.委中、腰阳关、太冲、太溪
- E.委中、太溪、阳陵泉、悬钟

116.吴某,女,23岁。2年前经期淋雨后出现痛经。经期腹痛拒按,经色紫红有块,得暖痛减,舌淡苔白,脉沉。针灸取穴为

- A.肾俞、大赫、命门、关元
- B.肾俞、肝俞、太溪、太冲
- C.中极、地机、次髎、三阴交
- D.中极、地机、太冲、侠溪
- E.以上都不是

117.患者,女,20岁。2天前受风后出现左侧面部麻木,额纹消失,眼裂变大,鼻唇沟变浅,口角下垂歪向左侧,舌淡,苔薄白。针刺面部腧穴应采用

- A.直刺深刺
- B.多穴重刺
- C.轻刺浅刺
- D.提插泻法
- E.电针强刺激

118.患者,男,36岁。因工作压力,思虑过度,经常寐而易醒,伴心悸健忘,面色无华,易汗出,纳差倦怠,舌淡,脉细弱。针灸治疗除照海、申脉、神门、印堂、四神聪、安眠外,应加取

- A.行间、侠溪、肝俞

- B.心俞、脾俞、足三里
- C.丘墟、心俞、内关
- D.太溪、心俞、肾俞
- E.公孙、太白、足三里

119.患者,男,40岁。阑尾手术后,出现小便闭塞不通,努挣无效,小腹满痛,舌紫暗,脉涩。除秩边、阴陵泉、三阴交、中极、膀胱俞外,应加取的腧穴是

- A.委阳、曲骨
- B.太冲、大敦
- C.次髎、血海
- D.曲骨、太冲
- E.侠溪、太冲

120.徐某,男。高血压病史5年,长期服药,血压在(150~160)/(90~100)mmHg。平素急躁易怒。舌红脉弦。针灸取穴应为

- A.风池、内关、脾俞、足三里
- B.风池、内关、合谷、列缺
- C.风池、内关、肝俞、行间
- D.风池、内关、神门、通里
- E.风池、内关、中脘、丰隆

121.范某,女,23岁。右侧口眼歪斜1天,诊断为周围性面神经麻痹。针灸治疗应为

- A.局部取穴,轻浅刺激
- B.局部取穴,强刺激
- C.循经远取,用补法
- D.局部取穴,轻浅刺激,配合循经远取
- E.局部取穴,强刺激,配合循经远取

122.患者,男,55岁。咳嗽月余,近日加重,痰多黏稠,脘痞胸闷,纳差,舌苔白腻,脉濡滑。治疗除主穴外,应选

- A.列缺、合谷
- B.合谷、外关
- C.丰隆、阴陵泉
- D.章门、足三里
- E.阳陵泉、太冲

123.王某,女,18岁。经医院诊断为崩漏实证。针灸取穴为

- A.三阴交、隐白、关元

- B.三阴交、隐白、血海
- C.三阴交、隐白、足三里
- D.三阴交、隐白、百会
- E.三阴交、隐白、内庭

124.王某,女,26岁。经医院诊断为瘾疹之血虚风燥证。除主穴外,应该配穴是

- A.肺俞、尺泽
- B.天枢、足三里
- C.脾俞、足三里
- D.血海、膈俞
- E.以上都不是

125.温某,女,50岁。经医院诊断为绝经前后诸证。现在主诉烦躁失眠比较明显。除主穴外,应该配穴是

- A.肺俞、合谷
- B.水分、三焦俞、气海、脾俞、阴陵泉
- C.脾俞、胃俞、足三里、太白
- D.脾俞、足三里
- E.心俞、神门

126.女童,8岁,高度近视。欲求针灸纠正。除眼周近部取穴外,还可配合

- A.太冲

- B.光明
- C.合谷
- D.足三里
- E.太溪

127.患者,男,50岁。右额面部束带状刺痛5天,局部皮肤潮红,皮疹呈簇状水疱,排列如带状,伴有口苦、烦躁易怒,小便黄,大便干,舌红苔黄,脉弦数。治疗除主穴外,还应加

- A.曲池、大椎
- B.行间、侠溪
- C.尺泽、合谷
- D.风池、膈俞
- E.曲池、支沟

128.何某,女,37岁。乳房肿块随喜怒消长,兼急躁易怒,行经不畅,舌红,苔薄黄,脉弦滑。除主穴外还应配合哪些穴位

- A.丰隆、中渚
- B.肾俞、关元
- C.肝俞、内关
- D.肝俞、肾俞
- E.内关、神门

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(129~132 题共用备选答案)

- A.桃红四物汤
- B.血府逐瘀汤
- C.复元活血汤
- D.身痛逐瘀汤
- E.补阳还五汤

129.血瘀腰痛可选用

130.外伤血瘀胁痛可选用

131.胸痹血瘀证可选用

132.中风气虚血瘀证可选用

(133~134 题共用备选答案)

- A.祛风通络,散寒除湿
- B.温经散寒,祛风除湿
- C.除湿通络,祛风散寒
- D.清热通络,祛风除湿
- E.化痰祛瘀,搜风通络

133.风湿热痹的主要治法

134.行痹的主要治法

(135~136 题共用备选答案)

- A.病起发热,或热后突然出现肢体软弱无力
- B.四肢痿软,身体困重

- C. 肢体痿软无力, 逐渐加重, 神疲乏力
D. 起病缓慢, 下肢痿软无力, 腰脊痠软
E. 突然昏仆, 半身活动不利
135. 痿证脾胃亏虚, 精微不运型见症为
136. 痿证肺热津伤, 筋失濡润型见症为
(137~138 题共用备选答案)
- A. 丹栀逍遥散
B. 归脾汤
C. 补中益气汤
D. 八珍汤
E. 升阳益胃汤
137. 血虚发热可选用
138. 肺脾同病, 气虚喘证可选用
(139~140 题共用备选答案)
- A. 桃仁承气汤
B. 天麻钩藤饮
C. 镇肝息风汤
D. 羚角钩藤汤
E. 涤痰汤
139. 中风, 痰热腑实证主方
140. 中风, 痰火郁闭证主方
(141~142 题共用备选答案)
- A. 补血荣筋丸
B. 双合汤
C. 犀黄丸
D. 蠲痹汤
E. 宣痹汤
141. 痹证痰瘀痹阻证的代表方剂宜选用
142. 风湿热痹的代表方剂宜选用
(143~146 题共用备选答案)
- A. 精神抑郁, 情绪不宁, 善太息, 胸胁胀

- 痛, 痛无定处, 脘闷暖气, 腹胀纳呆
B. 性情急躁易怒, 胸闷胁胀、嘈杂吞酸, 口干而苦, 大便秘结
C. 咽中不适, 如有物梗阻, 咯之不出, 咽之不下, 胸中窒闷
D. 精神恍惚, 心神不宁, 悲忧善哭, 时时欠伸
E. 多思善虑, 心悸胆怯, 少寐健忘, 面色不华, 头晕神疲, 食欲不振
143. 半夏厚朴汤适用于哪一组症状
144. 丹栀逍遥散合左金丸适用于哪一组症状
145. 柴胡疏肝散适用于哪一组症状
146. 甘麦大枣汤适用于哪一组症状
(147~148 题共用备选答案)
- A. 目内眦
B. 目外眦
C. 心中
D. 胸中
E. 肺中
147. 足厥阴肝经与手太阴肺经交接于
148. 足少阴肾经与手厥阴心包经交接于
(149~150 题共用备选答案)
- A. 指切进针法
B. 夹持进针法
C. 舒张进针法
D. 提捏进针法
E. 单手进针法
149. 针刺印堂穴时宜选用
150. 针刺环跳穴时宜选用

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	A	D	E	B	C	B	A	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	B	C	C	E	C	E	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	A	C	B	A	D	D	E	C	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	B	A	E	B	A	E	D	D	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
E	D	C	D	E	E	B	A	E	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	A	B	D	A	D	E	C	B	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	C	B	B	C	D	B	A	D	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	B	E	B	D	E	E	C	A	E
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	D	D	A	D	B	A	D	E	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	E	D	C	D	D	D	B	B	D
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	C	A	B	B	A	C	A	C	E
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	B	D	E	B	C	C	B	C	C
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
D	C	A	C	E	B	B	C	D	C
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
B	E	D	A	C	A	B	C	A	D
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
B	E	C	B	A	D	E	D	D	B

140-2

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中医执业医师资格考试
VIP 全真模拟卷
(医学综合笔试部分)

报考类别:中医执业医师

第四单元

考试日期:2021年8月

考试时间:14:00—16:00

考生姓名:_____

准考证号:_____

考场号:_____

第四单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 外科疾病的发生,最常见的是
 - A. 风、湿
 - B. 热、火
 - C. 寒、湿
 - D. 暑、火
 - E. 风、热
2. 疮疡三陷证中,火陷证的治法是
 - A. 凉血清热解毒,养阴清心开窍
 - B. 补益气血,清心安神开窍
 - C. 温补脾肾,清心开窍
 - D. 托毒透邪,养阴清心开窍
 - E. 生津养胃,清心解毒
3. 痰肿的临床特点是
 - A. 肿势高突,根盘紧收
 - B. 坚硬如石,皮色不变
 - C. 肿势软如棉,或硬如馒
 - D. 皮紧内软,喜怒有变
 - E. 皮肤漫肿,其色青紫
4. 下列哪项不是清热法的适应证
 - A. 热毒内传之走黄内陷
 - B. 药物性皮炎皮损色红灼热
 - C. 流痰初起,骨骼隐痛,漫肿不显者
 - D. 流痰后期,阴虚火旺,虚热不退者
 - E. 局部红、肿、热、痛
5. 外科疾病,消托补三大内治法则的建立,其依据是
 - A. 外科病的病因
 - B. 外科病的病情变化
 - C. 外科病的临床分期
 - D. 外科病的治疗经验
 - E. 以消为贵的学术思想
6. 内陷之证,症见口干少津而不喜饮,胃纳不香或伴口糜,舌光红,脉细数者,宜选用
 - A. 异功散
 - B. 二陈汤
 - C. 六味地黄汤
 - D. 益胃汤
 - E. 四君子汤
7. 治疗疔疮的代表方剂是
 - A. 五味消毒饮
 - B. 仙方活命饮
 - C. 托里消毒散
 - D. 普济消毒饮
 - E. 银翘解毒丸
8. 丹毒的治疗原则是
 - A. 疏风清热、凉血活血
 - B. 疏肝理气、泻火解毒
 - C. 清利湿热、消肿止痛
 - D. 凉血清热、解毒化瘀
 - E. 化痰消肿、清热解毒
9. 火陷形成的主要原因是
 - A. 火毒炽盛
 - B. 阴液不足
 - C. 气血亏虚
 - D. 脾肾阳虚
 - E. 肺卫不固
10. 颜面疔疮的早期临床特征是
 - A. 疮形如粟,肿势局限,顶高根软

B.疮形如粟,痒痒相兼,肿势弥漫
C.疮顶凹陷,红热灼痛,肿势弥漫
D.疮形如粟,根深坚硬,如钉丁之状
E.疮形粟粒状脓头,或麻或痒,肿势弥漫

11.锁喉痈初起宜选用

- A.仙方活命饮
- B.普济消毒饮
- C.银翘解毒丸
- D.五味消毒饮
- E.黄连解毒汤

12.相当于西医的恶性肿瘤颈部淋巴结转移的疾病是

- A.肉瘤
- B.肉瘰
- C.失荣
- D.颈痈
- E.石瘰

13.乳痈初起,证属肝气不舒,胃热壅滞治应首选

- A.逍遥散
- B.透脓散
- C.四妙汤
- D.瓜蒌牛蒡汤
- E.牛蒡解肌汤

14.无头疽的临床特征是

- A.红肿热痛
- B.易消易溃易敛
- C.局部光软无头
- D.肿势局限
- E.难消难溃难敛

15.海藻玉壶汤主要用于治疗何种证型的瘰疬

- A.气滞血瘀
- B.痰火郁结
- C.痰凝
- D.冲任失调
- E.肝郁气滞

16.中医所说的瘤相当于西医的

- A.体表肿物
- B.恶性肿瘤
- C.体表良性肿瘤
- D.体内肿瘤
- E.内脏肿瘤

17.皮损为红色丘疹或斑片,上覆层层白皮,抓去白皮可见点状出血,是

- A.白屑风的皮损特征
- B.白疔的皮损特征
- C.牛皮癣的皮损特征
- D.风热疮的皮损特征
- E.紫白癜风风的皮损特征

18.慢性荨麻疹的特点是

- A.伴恶寒、发热,咽喉肿痛,遇热加重
- B.风团持久不退
- C.有家族史
- D.皮损消退后可见毛细血管扩张
- E.风团反复发作,数月或数年

19.手术时切断后会导致肛门失禁的组织是

- A.外括约肌皮下部
- B.外括约肌浅部
- C.外括约肌深部
- D.内括约肌
- E.肛管直肠环

20.硬化注射疗法的主要作用机制是

- A.使痔核湿性坏死
- B.使痔核纤维化萎缩
- C.使痔核坏死脱落
- D.全部阻断痔血流
- E.畅通痔血流

21.前列腺炎的主要临床表现是

- A.无痛性血尿
- B.精液中有血
- C.尿中有血,并有腰部剧痛
- D.尿频,进行性排尿困难
- E.尿频急而痛,尿末常有白色分泌物

22.脱疽初起,患者足背动脉、胫后动脉的脉象多表现为

- A.弦数
B.洪大
C.结代
D.微弱
E.滑数
- 23.以下哪种疾病易引起肺梗塞
A.臃疮
B.脱疽
C.股肿
D.浅静脉炎
E.褥疮
- 24.血栓性浅静脉炎的发病原因是
A.外感风寒之邪
B.湿热之邪外侵
C.外感风热之邪
D.肝肾不足,气虚血亏
E.肺胃积热下迫
- 25.成人头、面、颈部全部烧伤,其面积约
为全身面积的
A.3%
B.6%
C.18%
D.9%
E.20%
- 26.毒蛇咬伤的神经毒表现为中医的
A.风毒症状
B.火毒症状
C.风火毒症状
D.热毒症状
E.湿毒症状
- 27.破伤风最早出现的症状是
A.苦笑面容
B.颈项强直
C.张口困难
D.角弓反张
E.手足抽搐
- 28.诊断肠痈,最具有诊断价值的体征是
A.脐周压痛
B.右下腹反跳痛
C.肌紧张
D.右下腹固定压痛
E.板状腹
- 29.太乙膏的功效是
A.消肿清火,解毒生肌
B.活血祛腐,解毒止痛
C.消肿止痛,提脓祛腐
D.清热消肿,散瘀化痰
E.温经和阳,祛风散寒
- 30.“属心而络于胞中”的经脉是
A.冲脉
B.胞脉
C.任脉
D.督脉
E.带脉
- 31.下列哪项不是直接导致冲任损伤的因素
A.邪毒感染
B.郁怒悲伤
C.房劳多产
D.跌扑闪挫
E.寒湿之邪
- 32.治疗痛经气滞血瘀证,应首选
A.血府逐瘀汤
B.膈下逐瘀汤
C.少腹逐瘀汤
D.身痛逐瘀汤
E.通窍活血汤
- 33.围产期是指
A.孕期 28 周到产后 1 周
B.孕期 29 周到产后 4 周
C.孕期 38 周到产后 2 周
D.孕期 38 周到产后 4 周
E.孕期 40 周到产后 4 周
- 34.崩漏的治疗原则是
A.塞流与澄源结合
B.澄源与复旧结合
C.复旧与塞流结合
D.固本与澄源结合

- E.急则治标,缓则治本
- 35.治疗月经先期阴虚血热证应首选的方剂是
- A.清热固经汤
B.清经散
C.失笑散
D.两地汤
E.丹栀逍遥散
- 36.闭经虚证的发病机理是
- A.多产房劳或久病伤肾
B.血海空虚,无血可下
C.脾胃虚弱,化源不足
D.思虑过度,损伤心脾
E.素体阴虚或久病伤血
- 37.月经过多与月经先期共有的证候是
- A.气虚证、血瘀证
B.血虚证、气滞证
C.气虚证、血热证
D.血虚证、血瘀证
E.肝郁证、血热证
- 38.崩漏的主要病机是
- A.肾虚封藏失职
B.脾虚气不统血
C.血热迫血妄行
D.瘀血阻滞冲任
E.冲任不固,不能制约经血
- 39.受孕初期仍按月有少量月经而无损于胎儿的称
- A.季经
B.居经
C.漏胎
D.垢胎
E.避年
- 40.温经散寒法不常用于哪项疾病
- A.月经后期
B.痛经
C.月经先期
D.闭经
E.不孕症
- 41.下列除哪项外,均属肾虚月经先后无定期的主要证候
- A.经行或先或后
B.月经量少色淡
C.小腹冷痛拒按
D.舌质淡脉沉弱
E.头晕腰酸如折
- 42.下列各项不属于崩漏常见证候的是
- A.肾虚证
B.肝郁证
C.脾虚证
D.血热证
E.血瘀证
- 43.气血虚弱型闭经的临床表现下列哪项是错误的
- A.月经 2 月未潮
B.头晕面白
C.心悸气短
D.倦怠无力
E.舌淡脉弱
- 44.下述哪项与带下病的产生无密切关系
- A.感染湿毒
B.脾虚湿注
C.肝经湿热
D.肾气亏虚
E.肺肾阴虚
- 45.患者,女,25 岁。带下过少,阴中干涩,头晕,心悸失眠,神疲乏力,经行腹痛,舌质暗淡,边有瘀斑,脉细涩。治疗应首选的方剂是
- A.血府逐瘀汤
B.左归丸加知母、肉苁蓉、紫河车、麦冬
C.少府逐瘀汤
D.左归饮加三棱、莪术
E.小营煎加丹参、桃仁、牛膝
- 46.产后发热的治疗应以哪项为主
- A.调气血,和营卫
B.清热解毒退热

- C.活血化瘀清热
D.养血清热
E.疏风清热
- 47.产后恶露不绝的发病机制,下列哪项是错误的
- A.阴虚内热,下扰冲任,迫血妄行
B.肝郁化热,热扰冲任,迫血妄行
C.脾虚气陷,冲任不固,不能摄血
D.瘀血内阻,冲任失畅,血不归经
E.以上都不是
- 48.月经病的治疗原则主要是
- A.分先病后病
B.重在调经
C.调理气血
D.调理冲任
E.补肾养肝
- 49.闭经阴虚血燥证的临床表现是
- A.月经停闭,五心烦热,乳房胀痛
B.月经停闭,颧红,唇干,舌红苔少
C.月经停闭,面部烘热汗出
D.月经停闭,晨起恶心呕吐
E.月经停闭,骨蒸劳热,苔腻,脉弦滑
- 50.痛经气血虚弱证的治法是
- A.益气养血,化瘀止痛
B.养血益精,调经止痛
C.健脾益气,养血调经
D.益气养血,调经止痛
E.滋肾益精,养血止痛
- 51.预产期的计算是从
- A.末次月经结束那天算起
B.受孕前月排卵期算起
C.末次性生活算起
D.末次月经第14天算起
E.末次月经来潮第一天算起
- 52.癥瘕辨证重在辨其
- A.大小
B.部位
C.在气在血
D.体质强弱
E.虚实
- 53.产后感染邪毒发热的临床表现哪项是错误的
- A.高热恶寒
B.腹痛绵绵
C.恶露量多或少
D.恶露色紫黑如败酱
E.恶露有臭味
- 54.新生儿期是指从出生至
- A.26天
B.28天
C.30天
D.32天
E.1岁
- 55.指纹从虎口到食指端,可分为三关,下列哪项顺序正确
- A.命关、气关、风关
B.气关、命关、风关
C.气关、风关、命关
D.风关、气关、命关
E.风关、命关、气关
- 56.正常小儿的脉象较成人
- A.浮而数
B.沉而缓
C.软而稍数
D.浮而稍缓
E.浮而且弦
- 57.小儿肺炎喘嗽病机是
- A.肺气失宣
B.肺失清肃
C.肺气上逆
D.痰热壅盛
E.肺气闭塞
- 58.引发口疮的主要原因是
- A.脾胃积热或心火上炎
B.心肺积热或虚火上浮
C.肝胃不和或虚火上浮
D.脾胃积热或心火上炎或虚火上浮
E.心肝积热或虚火上浮

- 59.治疗伤食泻的首选的方剂是
- 木香顺气丸
 - 枳实导滞丸
 - 保和丸
 - 木香槟榔丸
 - 以上都不是
- 60.下列哪一症状不属惊风八候
- 颤
 - 掣
 - 窜
 - 抖
 - 视
- 61.治疗肠虫证的首选的方剂是
- 追虫丸
 - 化虫丸
 - 使君子散
 - 乌梅丸
 - 驱虫粉
- 62.脓疱疮与水痘的鉴别点,下列哪项是错误的
- 疱疹躯干部位多
 - 疱疹较大
 - 多发于夏季炎热时节
 - 疱疹含脓液
 - 疱疹易破,蔓延附近皮肤
- 63.下列各项有关汗证的描述,不正确的是
- 小儿汗证多属虚证
 - 自汗以气虚、阳虚为主
 - 盗汗以阴虚、血虚为主
 - 小儿汗证多为虚实夹杂证
 - 实证多为湿热迫蒸
- 64.麻疹的好发季节是
- 盛夏
 - 冬春
 - 秋冬
 - 春夏
 - 夏秋
- 65.治疗风痧邪犯肺卫证,应首选的方剂是
- 解肌透痧汤
 - 银翘散
 - 桑菊饮
 - 宣毒发表汤
 - 普济消毒饮
- 66.水痘的好发季节是
- 冬春
 - 春夏
 - 夏秋
 - 秋冬
 - 春秋
- 67.小儿感冒可出现的兼证是
- 夹火、夹痰、夹湿
 - 夹火、夹痰、夹食
 - 夹风、夹痰、夹食
 - 夹惊、夹痰、夹食
 - 夹湿、夹惊、夹食
- 68.麻疹主要受病的脏腑是
- 心肺
 - 肺脾
 - 心脾
 - 肺肾
 - 心肝
- 69.望动态中,小儿喜俯卧者,多为
- 乳食内积
 - 腹痛
 - 久病体虚
 - 痰饮内伏
 - 胸胁疼痛
- 70.小儿指纹若色紫,其证属
- 血瘀
 - 阴虚
 - 热证
 - 肝风内动
 - 寒证
- 71.流行性腮腺炎的好发年龄是
- 6个月以内
 - 7个月~1岁

- C.2~3 岁
D.3 岁以上儿童
E.青春期
- 72.肺炎喘嗽的治疗应首先是
A.止咳
B.平喘
C.开肺
D.祛痰
E.清热
- 73.哮喘病程较长,反复发作,其主要原因因为
A.热痰壅肺
B.肺阴不足
C.正虚痰伏
D.脾虚湿困
E.肾虚水泛
- 74.小儿泄泻的发生虽有多种不同因素,但未有不源于
A.热
B.湿
C.寒
D.食积
E.虚
- 75.治疗小儿乳食内积型积滞的首选的方剂是
A.保和丸
B.木香大安丸
C.枳实导滞丸
D.枳术丸
E.肥儿丸
- 76.蛲虫病的临床表现,哪项是其特征
A.食欲不振
B.精神烦躁
C.睡眠不安
D.肛门、会阴部奇痒
E.面黄肌瘦,腹痛恶心
- 77.小儿水肿脾肾阳虚证的治疗首选方是
A.越婢加术汤
B.真武汤
C.麻黄连翘赤小豆汤
D.己椒苈黄丸合参附汤
E.五味消毒饮
- 78.在风痧发病中,下列哪种描述欠妥
A.是一种较轻的出疹性传染病
B.多发于冬春二季
C.多发于哺乳的婴儿,不易流行
D.淡红色斑丘疹
E.耳后及枕骨下基核肿大
- 79.小儿夏季热的临床特征除长期发热外,还见
A.口渴多饮、多尿、汗闭
B.口渴多饮、多尿、多汗
C.口渴多饮、少尿、多汗
D.口不渴、多尿、多汗
E.口不渴、少尿、汗闭
- 80.下列除哪项外,都是疔腮腮肿的特点
A.以耳垂为中心的漫肿
B.皮肤略红
C.触之有弹性感
D.边缘不清楚
E.不破不溃
- 81.毛细血管瘤最显著的特点是
A.边界不清
B.瘤体巨大
C.质地坚硬
D.压缩性大
E.皮色鲜红
- 82.HAV 的主要传播途径是
A.血液及血制品
B.垂直传播
C.媒介生物
D.粪-口途径
E.呼吸道
- 83.流行性出血热常见的休克是
A.原发性休克
B.继发性休克
C.出血性休克

- D.感染性休克
E.过敏性休克
- 84.艾滋病最重要的传染源是
- A.艾滋病患者
B.隐性感染者
C.潜伏期感染者
D.无症状病毒携带者
E.发病期患者
- 85.传染性非典型肺炎患者临床主要表现是
- A.起病急,常以发热为首发症状
B.腹痛、腹泻
C.常有鼻塞、流涕等症状
D.容易发生呼吸道继发感染
E.多见儿童患者且病情较成人重
- 86.流脑的主要传播途径是
- A.空气、飞沫
B.玩具及用品
C.动物传播
D.通过饮用水传播
E.通过食物传播
- 87.目前我国流行性脑脊髓膜炎流行的主要菌群是
- A.a 群

- B.b 群
C.c 群
D.d 群
E.e 群
- 88.确诊细菌性痢疾最可靠的依据是
- A.典型脓血便
B.明显里急后重
C.便培养阳性
D.免疫检查阳性
E.粪便镜检发现大量脓细胞、吞噬细胞
- 89.典型霍乱发病最先出现的症状是
- A.腹泻
B.腹痛
C.呕吐
D.畏寒、发热
E.肌肉痉挛
- 90.人感染高致病性禽流感主要的症状是
- A.咳嗽
B.发热
C.流涕
D.球结膜炎
E.咽痛

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

- 91.某男,36 岁。颈旁结块 1 周,红肿热痛,恶寒发热,头痛,口干,咽痛,舌红苔薄黄,脉浮数。诊断颈痈,应选用的方剂是
- A.托里消毒散
B.牛蒡解肌汤
C.仙方活命饮
D.黄金膏
E.五味消毒饮

- 92.患者,男,68 岁。因感冒伴发口唇成群小水疱,破碎后呈糜烂与结痂,自觉瘙痒,灼热。其治法是
- A.内服黄连解毒汤
B.内服龙胆泻肝汤
C.内服五味消毒饮
D.外搽青吹口散油膏
E.外搽白玉膏

93.患者,男,30岁。便干,便后出血并疼痛1周。检查:肛门外可见截石位6点有一梭形裂口通向肛内,创面不深,边缘整齐。其分类应是

- A.内痔
- B.外痔
- C.肛窦炎
- D.早期肛裂
- E.陈旧性肛裂

94.一老年男性患者,右侧阴囊红肿胀痛2天,拒按,伴右腹股沟淋巴结肿大,伴发热,口干喜冷饮,小便赤热,舌红苔黄,脉弦数。诊为囊痈,治宜

- A.泻热汤
- B.八正散
- C.滋阴除湿汤
- D.导赤散
- E.五味消毒饮

95.患者因淋雨后畏寒头痛,发热不适,服用感冒通2片后症状有所减轻。数小时后全身发痒,继而出现红斑、斑丘疹,伴肿胀,烦躁不安,胸闷,舌红、苔薄黄。需进一步了解病情并及时治疗,以下哪一项处理不妥当

- A.查体温、测血压
- B.化验白细胞及嗜酸细胞计数
- C.嘱患者多喝水
- D.中药治疗以清热凉血解毒利湿为法
- E.服用抗组胺药以抗过敏,并给予扑热息痛以退热

96.患者,女,34岁,已婚。带下量多两月有余,色白,质稀薄,无异味,伴周身倦怠乏力,食少便溏,舌淡胖,苔白腻,脉细缓。其治法是

- A.健脾养血,升阳除湿
- B.健脾和胃,利湿止带
- C.健脾补肾,升阳止带
- D.健脾益气,升阳除湿
- E.温肾培元,固涩止带

97.患者,女,26岁,已婚。停经2个月,尿妊娠试验阳性。恶心呕吐10天,加重3天,食入即吐,口淡无味,时时呕吐清涎,脘痞腹胀,倦怠嗜卧,舌淡,苔白润,脉缓滑无力。其证是

- A.脾胃虚弱证
- B.痰湿中阻证
- C.肝胃不和证
- D.肝脾不和证
- E.气阴两伤证

98.患者,女,31岁。孕5月余,近3日小便频数而急,尿黄赤,小腹坠胀,胸闷食少,舌红,苔黄腻,脉滑数。其治法是

- A.滋阴清热,润燥通淋
- B.清热养阴,利尿通淋
- C.清热利湿,润燥通淋
- D.滋阴润肺,利尿通淋
- E.交通心肾,清热利尿

99.患者,女。停经42天,阴道有少许出血3天,色淡红,腰酸腹痛,神疲肢倦,面色白。舌淡苔白,脉细滑。尿妊娠试验阳性。宜首选

- A.胎元饮
- B.寿胎丸
- C.圣愈汤
- D.肾气丸
- E.泰山磐石散

100.患者,女。孕8个月,面目四肢浮肿,肤色淡黄,皮薄而光亮,胸闷懒言,纳差便溏。舌淡胖苔薄白,脉缓滑无力。治疗应首选

- A.鲤鱼汤
- B.白术散
- C.真武汤
- D.健固汤
- E.肾气丸

101.患者,女,25岁,已婚。产后恶露量少,少腹阵痛拒按,气粗喘促,不省人事,两手握拳,牙关紧闭,唇舌色紫,脉涩。其证

候是

- A. 气滞血瘀
- B. 肝郁气闭
- C. 血热瘀闭
- D. 血瘀气闭
- E. 肝风内动

102. 患者,女,38岁。结婚3年,夫妇同居未孕,月经先后不定期,经行乳房胀痛,善太息,舌淡红苔薄白,脉弦细。其证候是

- A. 肝肾阴虚
- B. 肝郁脾虚
- C. 肝阳上亢
- D. 肝郁
- E. 气滞血瘀

103. 患者,女,56岁。阴部奇痒干涩7天,五心烦热,腰酸腿软,舌红少苔,脉细数。治疗应首选

- A. 知柏地黄汤
- B. 保阴煎
- C. 两地汤
- D. 六味地黄丸
- E. 左归丸

104. 患者,女,34岁,已婚。4年前因患子宫肌瘤自然流产一次,现妊娠43天,阴道不时少量下血,腰酸,胎动下坠,口干不欲饮,舌暗红,脉沉弦。治疗应首选

- A. 下瘀血汤
- B. 固下益气汤
- C. 补肾安胎饮
- D. 加味圣愈汤
- E. 桂枝茯苓丸

105. 患者,女,30岁,已婚。3年不孕,月经2~3月一行,头晕耳鸣,腰酸腿软,畏寒肢冷,性欲淡漠,舌淡苔白,脉沉细而迟。治疗应首选

- A. 大补元煎
- B. 固阴煎
- C. 补肾固冲丸
- D. 毓麟珠

E. 温胞饮

106. 患儿,女,1岁。发热10小时,伴轻咳流涕,烦躁。3分钟前突然抽搐。查体:体温39.8℃,四肢抽搐,目睛上吊,舌尖红,舌苔薄黄,脉象浮数。该患儿应诊为

- A. 急惊风(感受暑邪)
- B. 急惊风(感受风邪)
- C. 急惊风(气营两燔)
- D. 急惊风(湿热疫毒)
- E. 急惊风(痰食惊风)

107. 患儿,女,4岁半。因浮肿7天入院,查体:全身明显浮肿,尿少。入院前已10小时无尿,头晕,头痛,恶心呕吐,嗜睡,舌苔腻,脉沉弦。治疗首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 真武汤合小半夏汤
- C. 泻心汤
- D. 温胆汤合附子泻心汤
- E. 己椒苈黄丸合玉枢丹

108. 患儿,男,5岁。每晚尿床1次以上,小便清长,面白少华,神疲乏力,智力较同龄儿稍差,肢冷畏寒,舌质淡,苔白滑,脉沉无力。治疗应首选的方剂是

- A. 桑螵蛸散
- B. 右归丸
- C. 补肾地黄丸
- D. 菟丝子散
- E. 桂枝加龙骨牡蛎汤

109. 水痘患儿,男,7岁。壮热烦躁,面红目赤,口渴欲饮,痘疹分布稠密,根盘红晕较著,疹色紫暗,疱浆混浊,大便干结,小便黄赤。舌质红或红绛,舌苔黄糙而干,脉洪数。治疗首选方为

- A. 清瘟败毒饮
- B. 黄连解毒汤
- C. 普济消毒饮
- D. 清解透表汤
- E. 清胃解毒汤

110. 患儿,男,6个月。因腹泻反复发作

两个半月入院,患儿近两个半月来,反复腹泻,日行3~8次,大便稀溏,多见食后作泻,便色淡而臭,时轻时重,面色萎黄,肌肉消瘦,神疲倦怠,舌淡苔白。治疗首选的方剂是

- A.参苓白术散
- B.补中益气汤
- C.四君子汤
- D.七味白术散
- E.健脾丸

111.患儿,男,3岁。浮肿5天,查体:肢体浮肿,咳嗽,气急,心悸,胸闷,烦躁不能平卧,口唇青紫,指甲发绀,舌苔白,脉沉细无力。治疗首选的方剂是

- A.真武汤合小半夏汤
- B.温胆汤合附子泻心汤
- C.己椒苈黄丸加人参
- D.己椒苈黄丸合参附汤
- E.以上都不是

112.男孩,7岁。睡中时有遗尿,尿量不多,其味腥臊,尿色较黄,平时性情急躁,唇红,苔黄,脉数有力。治疗首选的方剂是

- A.龙胆泻肝汤

- B.知柏地黄丸
- C.导赤散
- D.泻黄散
- E.当归龙荟丸

113.患儿,5岁。证见发热,恶寒,无汗,鼻塞流涕,微咳,兼见脘腹胀满,呕吐酸腐,口气秽浊,大便酸臭,小便短黄,舌质红,苔厚腻,脉滑。其病证是

- A.呕吐
- B.腹痛
- C.积滞
- D.伤食泻
- E.感冒夹滞

114.患儿,5岁。证见发热烦躁,咳嗽喘促,气急鼻扇,呼吸困难,喉间痰鸣,面赤口渴,大便干燥,小便黄少,舌红,苔黄,脉滑数。其证候是

- A.风寒闭肺
- B.风热闭肺
- C.痰热闭肺
- D.毒热闭肺
- E.阴虚肺热

B1型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(115~116题共用备选答案)

- A.局部肿胀,皮肤有细小红丝或青筋暴露,触之骨骼增粗
- B.肿势漫无边际,扪之绵软,或有捻发感

C.疮顶忽然陷黑无脓,肿势迅速扩散

D.初起结核如豆,不痛不红,增大缓慢,融合成串

E.初起漫肿,皮色如常,此愈彼起,反复不愈

115.走黄的表现是

116.透膜的表现是

(117~118题共用备选答案)

A.乳汁郁积,肝郁胃热

B.肝郁痰凝,冲任不调

C.肝肾亏损,冲任失调

- D.肺肾阴虚,痰火循经结于乳房
E.肝郁化火,迫血妄行
- 117.乳癖的病机是
118.乳痛的病机是
(119~120 题共用备选答案)
- A.直肠息肉
B.血栓外痔
C.肛瘘
D.肛裂
E.肛管直肠脱垂
- 119.大便时肛门剧痛,便血者为
120.肛旁突然剧痛,并出现肿物,触痛明显者为
(121~122 题共用备选答案)
- A.邪气阻隔,脉道不通
B.冲任失养,拘急而痛
C.瘀血内阻,新血不守
D.胞宫寒冷,血瘀冲任
E.冲任瘀阻,气血运行不畅
- 121.实证闭经的主要病机是
122.实证痛经的主要病机是
(123~124 题共用备选答案)
- A.膈下逐瘀汤
B.少腹逐瘀汤
C.血府逐瘀汤
D.通瘀汤
E.失笑散
- 123.治疗月经过多血瘀证,应首选的方剂是
124.治疗月经过少血瘀证,应首选的方剂是
(125~126 题共用备选答案)
- A.肠宁汤
B.生化汤
C.加味四物汤
D.身痛逐瘀汤
E.黄芪桂枝五物汤
- 125.产后腹痛气血两虚证,应首选的方剂是

- 126.产后腹痛瘀滞子宫证,应首选的方剂是
(127~128 题共用备选答案)
- A.脾胃
B.心肝
C.肝肾
D.大肠
E.小肠
- 127.感冒夹滞的病位在肺和
128.感冒夹惊的病位在肺和
(129~130 题共用备选答案)
- A.发热 3~4 天出疹,热退疹出
B.发热 1~2 天出疹,疹出热退
C.发热 3~4 天出疹,疹出热高
D.发热半天~1 天出疹,疹点细小如沙,颜色鲜红
E.三期皮疹同见
- 129.麻疹是
130.奶麻是
(131~132 题共用备选答案)
- A.脑膜脑炎
B.睾丸炎
C.胰腺炎
D.心肌炎
E.关节炎
- 131.流行性腮腺炎患者出现发热,头痛,呕吐,嗜睡或谵语等症时,应考虑并发症是
132.流行性腮腺炎患者出现发热,头痛,睾丸肿胀、变硬、疼痛等症时,应考虑并发症是
(133~134 题共用备选答案)
- A.调脾健运
B.消积理脾
C.补益气血
D.清心泻火,滋阴生津
E.温阳健脾,利水消肿
- 133.疝积的主要治法是
134.口疳的主要治法是

(135~136 题共用备选答案)

- A.自汗为主,头部、肩背部明显
- B.自汗为主,汗出遍身而不温
- C.盗汗为主,手足心热
- D.自汗或盗汗,头部、四肢为多
- E.盗汗为主,遍身汗出

135.汗证,肺卫不固的主症是

136.汗证,营卫失调的主症是

(137~138 题共用备选答案)

- A.疏风清热,利湿解毒
- B.辛凉透表,清宣肺卫
- C.清凉解毒,透疹达邪
- D.清气凉营,解毒化湿
- E.清气凉营,通腑泻火

137.治疗水痘邪伤肺卫证的治法是

138.治疗水痘毒炽气营证的治法是

(139~140 题共用备选答案)

- A.1~2 日
- B.2~5 日
- C.3~8 日
- D.4~10 日
- E.7~10 日

139.乙脑患者出现惊厥多在病程的

140.乙脑患者出现意识障碍最早可见于病程的

(141~142 题共用备选答案)

A.血管内皮损害、炎症、坏死、血栓形成
B.软脑膜充血,浆液性、纤维蛋白性渗出

- C.颅底脑膜的化脓性炎症和粘连
- D.大脑皮质神经细胞变性和坏死
- E.脊髓前角运动细胞变性坏死

141.流脑并发脑神经损伤的原因

142.流脑败血症期的主要病变

(143~144 题共用备选答案)

- A.再燃
- B.复发
- C.混合感染
- D.再感染
- E.重复感染

143.血培养为伤寒杆菌和副伤寒杆菌,应为

144.伤寒患者经正规治疗,体温正常,2周后又发热,血培养阳性可能为

(145~146 题共用备选答案)

- A.症状轻,非典型病例多
- B.排菌时间较长,易呈慢性
- C.果酱样便
- D.便秘与腹泻交替
- E.可有皮疹、便秘或腹泻

145.福氏细菌性痢疾

146.宋氏细菌性痢疾

(147~148 题共用备选答案)

- A.黄水样便、清水样便
- B.米泔水样便
- C.洗肉水样便
- D.黏液样便
- E.柏油样便

147.霍乱具有特征性的粪便性状

148.霍乱患者肠道有出血者粪便性状

(149~150 题共用备选答案)

- A.24 小时尿量<100 mL
- B.24 小时尿量<400 mL
- C.24 小时尿量<50 mL
- D.24 小时尿量>3 000 mL
- E.24 小时尿量>5 000 mL

149.流行性出血热少尿期指的是

150.无尿指的是

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	C	C	D	A	D	B	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	E	C	C	B	E	E	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	D	C	B	D	A	C	D	A	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	B	A	E	D	B	C	E	D	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	B	A	E	E	A	E	B	B	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	C	B	B	D	C	E	D	C	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	A	D	B	B	A	D	B	A	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	C	C	B	A	D	B	C	A	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	D	A	D	A	A	A	C	A	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	D	D	A	E	D	A	C	A	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
D	D	A	E	E	B	D	D	E	A
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	A	E	C	C	B	B	A	D	B
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	E	E	D	A	B	A	B	C	A
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
A	B	B	D	A	B	A	D	B	A
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	A	C	B	B	A	B	C	B	C