

D. 清热养阴，益气补肺

E. 清肺润燥止咳

(101~103题共用题干)

患者，女73岁，智能减退，记忆力、计算力、定向力、判断力明显减退，神情呆钝，词不达意，头晕耳鸣，怠惰思卧，齿枯发焦，腰酸骨软，步履艰难，舌瘦色淡，苔薄白，脉沉细弱。

101. 该病的基本病机为

- A. 心气虚衰，心血不足
- B. 以虚为本，虚实夹杂
- C. 气机不畅，血行瘀滞
- D. 肾精亏损，痰蒙清窍
- E. 髓减脑消，神机失用

102. 该患者在临床治疗宜选用

- A. 还少丹
- B. 益气聪明汤
- C. 七福饮
- D. 左归丸合天王补心丹
- E. 六君子汤合归脾汤

103. 该患者的治法为

- A. 补益气血，健脾宁心
- B. 补肾健脾，益气生精
- C. 补肾益髓，填精养神
- D. 活血化瘀，开窍醒脑
- E. 滋养肝肾，益精填髓

(104~106题共用题干)

患者，男，76岁。中风偏瘫3年，现患肢僵硬，拘挛变形，舌强不语，肢体肌肉萎缩，舌红脉细，脉沉细。

104. 根据患者症状，其辨证为

- A. 风痰阻络证
- B. 肝肾亏虚证
- C. 痰火瘀闭证
- D. 气虚络瘀证
- E. 阴虚风动证

105. 该患者进行辨证论治时，其治法为

- A. 益气养血，化瘀通络
- B. 滋阴潜阳，息风通络
- C. 滋养肝肾
- D. 祛风化痰通络
- E. 平肝潜阳，活血通络

106. 该患者治疗时，宜首选

- A. 天麻钩藤饮
- B. 补阳还五汤
- C. 解语丹

D. 参附汤合生脉散

E. 左归丸合地黄饮子

(107~109题共用题干)

患者，男，33岁，平素工作压力大，情绪抑郁，泄泻2天，伴腹痛，泻后痛减，腹中雷鸣，攻窜作痛，矢气频作，胸胁胀闷，嗳气食少，舌淡红，脉弦。

107. 该患者治疗宜选用

- A. 参苓白术散
- B. 四神丸
- C. 葛根芩连汤
- D. 痛泻要方
- E. 大承气汤

108. 该患者的治法为

- A. 抑肝扶脾
- B. 芳香化湿，解表散寒
- C. 温肾健脾，固涩止泻
- D. 清热利湿止泻
- E. 健脾益气止泻

109. 该病的预防调护不包括

- A. 饮食有节，宜清淡、富营养、易消化食物为主
- B. 可食用一些对消化吸收有帮助的食物
- C. 避免进食能生冷不洁食物
- D. 避免进食难消化或清肠润滑食物
- E. 尽可能多的食用营养含量高的食物

(110~112题共用题干)

患者，男，45岁，身目俱黄1月余，黄色晦暗如烟熏院腹痞胀，纳谷减少，大便不实，神疲畏寒，口淡不渴，舌淡苔腻，脉濡缓。

110. 该患者的诊断为

- A. 阳黄 胆腑郁热
- B. 阴黄 脾虚湿滞
- C. 阴黄 寒湿阻遏
- D. 黄疸 湿热留恋
- E. 黄疸 肝脾不调

111. 该患者的治法为

- A. 疏肝泄热，利胆退黄
- B. 健脾养血，利湿退黄
- C. 温中化湿，健脾和胃
- D. 调和肝脾，理气助运
- E. 清热利湿

112. 该患者宜选用

- A. 茵陈蒿汤
- B. 茵桂术甘汤
- C. 黄芪建中汤

D.茵陈四苓散

E.茵陈术附汤

(113~115题共用题干)

患者，男，39岁，3天前出现眼睑浮肿，延及全身，皮肤光亮，尿少色赤，身发疮痍；甚则溃烂；恶风发热，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

113.该患者的诊断为

A.阳水 风水相博

B.阳水 水湿浸渍

C.鼓胀 湿热壅盛

D.阳水 湿毒浸淫

E.鼓胀 水热蕴结

114.该患者治宜

A.越婢加术汤

B.五皮饮合胃苓汤

C.中满分消丸合茵陈蒿汤

D.麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮

E.疏凿饮子

115.症见尿痛、尿血，酌加

A.大蓟、石韦

B.苦参、土茯苓

C.丹皮、赤芍

D.泽泻、车前子

E.竹叶、木通

(116~118题共用题干)

患者，女，63岁，口渴、多食与便溏5半年余，伴精神不振，四肢乏力，体瘦，舌质淡红，苔白而干，脉弱。

116.该患者的诊断为

A.虚劳 脾气虚

B.虚劳 肺阴虚

C.上消 肺热津伤

D.中消 气阴亏虚

E.下消 阴阳两虚

117.该患者采用的治法为

A.养阴增液

B.阴阳并补

C.滋阴固肾

D.益气健脾，生津止渴

E.养阴润肺

118.患者治疗宜选用

A.消渴方

B.炙甘草汤

C.生脉散

D.六味地黄丸

E.七味白术散

(119~121题共用题干)

患者，男，70岁，平素怕冷，腰痛5天，冷痛，缠绵不愈，局部发凉，喜温喜按，遇劳更甚，卧则减轻，少腹拘急，面色㿠白，肢冷畏寒，舌质脉沉细无力。

119.该患者治宜

A.滋补肾阴，濡养筋脉

B.阴阳双补，活血止痛

C.补肾壮阳，温煦经脉

D.填精补髓，育阴息风

E.补益肝肾，滋阴清热

120.该患者治疗宜采用

A.左归丸

B.金匮肾气丸

C.右归丸

D.身痛逐瘀汤

E.虎潜丸

121.腰痛如无明显阴阳偏盛者，可服用

A.河车大造丸

B.青娥丸

C.补髓丹

D.人参养营汤

E.地黄饮子

(122~124题共用题干)

患者，女，38岁。月经淋漓难尽，经血色淡质稀，兼见腰酸肢冷，舌淡，苔薄，脉沉细。

122.该病的治疗原则是

A.补益肝肾，补血止血

B.清热利湿，固经止血

C.健脾补肾，固冲止血

D.行气活血，祛瘀通经

E.调补气血，温养冲任

123.该病的针灸治疗，主要选取

A.任脉、手厥阴经穴

B.任脉、手少阴经穴

C.任脉、足厥阴经穴

D.足太阴、任脉、足阳明经穴

E.手厥阴、足太阳经穴

124.该病的针灸治疗主穴为

A.关元、足三里、三阴交

B.关元、足三里、血海

C.关元、隐白、三阴交

D.气海、肾俞、足三里、三阴交

E. 足三里、气海、关元、血海

## B型题

### 答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑，每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

(125~126题共用备选答案)

- A. 人参养营汤
- B. 二仙汤合开郁散
- C. 托里消毒散
- D. 逍遥蒌贝散
- E. 二仙汤合四物汤

125. 乳岩冲任失调证宜选用

126. 乳癖冲任失调证宜选用

(127~128题共用备选答案)

- A. 鼠乳
- B. 足癣
- C. 白癣
- D. 黄癣
- E. 扁疾

127. 肥疮是指

128. 发于颜面、手背、前臂的疣，称为

(129~130题共用备选答案)

- A. 复方大柴胡汤
- B. 大黄牡丹汤合红藤煎剂
- C. 仙方活命饮
- D. 大黄牡丹汤合透脓散
- E. 四妙勇安汤

129. 肠痈瘀滞证选用

130. 肠痈热毒证选用

(131~132题共用备选答案)

- A. 感染邪毒
- B. 血热
- C. 气虚
- D. 血瘀
- E. 血寒

131. 恶露色黯若败酱的辨证为

132. 恶露色红、质稠的辨证为

(133~134题共用备选答案)

- A. 阴血不足，肝阳上亢
- B. 冲气上逆，胃失和降

C. 冲任不固，带脉失约

D. 冲任损伤，胎元不固

E. 阴液不足，不能滋润阴道

133. 带下过多的病机为

134. 带下过少的病机为

(135~136题共用备选答案)

A. 马牙

B. 鹅口疮

C. 白喉

D. 顿咳

E. 夜啼

135. 咳声嘶哑如犬吠者，常见于

136. 连声咳嗽，夜咳为主，咳而呕吐，伴鸡鸣样回声者，常见于

(137~138题共用备选答案)

- A. 清热凉血利咽
- B. 清热解毒，清利咽喉
- C. 清热祛湿解毒
- D. 清热解毒，软坚散结
- E. 麻不厌透，麻喜清凉

137. 丹痧的治疗原则为

138. 水痘的治疗原则为

(139~140题共用备选答案)

- A. 丹栀逍遥散
- B. 补中益气汤
- C. 黄连温胆汤合中和汤
- D. 清骨散
- E. 桑白皮饮

139. 气郁发热选用

140. 痰湿郁热选用

(141~142题共用备选答案)

- A. 血府逐瘀汤
- B. 小建中汤
- C. 枳实导滞丸
- D. 少腹逐瘀汤

E. 保和丸

141. 腹胀满疼痛，拒按，嗳腐吞酸，治宜  
142. 腹痛较剧，痛如针刺，舌质紫暗，脉弦涩，治宜  
(143~144题共用备选答案)

- A. 小青龙汤  
B. 柴枳半夏汤  
C. 香附旋覆花汤  
D. 甘遂半夏汤  
E. 己椒苈黄丸

143. 痰饮病，胸胁刺痛，寒热往来，身热起伏，呼吸、转侧疼痛加重，选用  
144. 痰饮病，胸胁疼痛，如灼如刺，病侧胸廓变形，舌质暗，选用

(145~146题共用备选答案)

145. 足三阴经均可治疗的疾病是  
146. 足少阳经和足太阳经均可治疗的疾病是  
A. 眼病  
B. 妇科病  
C. 胸部病  
D. 耳病  
E. 神志病

(147~148题共用备选答案)

- A. 后溪  
B. 内关  
C. 中渚  
D. 大陵  
E. 太溪

147. 手少阳三焦经的输穴是  
148. 手厥阴心包经的原穴是

(149~150题共用备选答案)

- A. 目内眦  
B. 目中  
C. 目外眦  
D. 鼻旁  
E. 口角旁
149. 手太阳小肠经与足太阳膀胱经的交接部位是  
150. 手阳明大肠经与足阳明胃经的交接部位是

# 2022年中医医师资格助理押题

## 第二单元

### A1型题

#### 答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 中医外科学疾病的发病机理不包括  
A. 邪正盛衰  
B. 气血凝滞  
C. 情志内伤  
D. 经络阻塞  
E. 脏腑失和
2. 以下不含升丹的提脓去腐药为  
A. 黑虎丹  
B. 九一丹  
C. 九黄丹  
D. 五五丹  
E. 七三丹
3. 下列不属于痰肿的是  
A. 肿势软如棉  
B. 硬如馒  
C. 不红不热  
D. 如烂棉不起  
E. 皮色不变
4. 不属浅一度烧伤的临床表现的是  
A. 剧痛  
B. 感觉迟钝  
C. 有大水疱  
D. 基底均匀潮红  
E. 创面潮湿
5. 下列关于乳核的说法，错误的是  
A. 相当于西医的乳腺纤维腺瘤  
B. 好发于40-60岁的女性  
C. 一般无疼痛  
D. 常单个发生  
E. 边界清楚，表面光滑
6. 下列不属于正常的月经现象的是  
A. 15岁月经初潮  
B. 28-30天行经一次
- C. 经期3-7天  
D. 经量约15ml  
E. 经质不稀不稠，无血块，无臭气
7. 下列各项，易导致妇产科疾病发生的是  
A. 风、湿、热  
B. 寒、热、湿  
C. 风、寒、湿  
D. 寒、暑、热  
E. 寒、湿、燥
8. 经期见大便溏泄，经行量多，色淡质薄，脘腹胀满，神疲肢软；舌淡红，苔白，脉濡缓。其治法为  
A. 温阳健脾，渗湿止泻  
B. 健脾渗湿，理气调经  
C. 温阳补肾，健脾止泻  
D. 健脾化湿，温阳固肠  
E. 补益脾肾，渗湿止泻
9. 妊娠期用药不需要慎用或禁用的是  
A. 耗气散气  
B. 竭下逐水  
C. 祛瘀破血  
D. 健脾和胃  
E. 辛热有毒之品
10. 阴挺患者，宫颈脱出阴道口，宫体仍在阴道内属于  
A. I度轻型  
B. I度重型  
C. II度轻型  
D. II度重型  
E. III度
11. 产后“三审”不包括  
A. 小腹痛与不痛  
B. 大便通与不通  
C. 乳汁行与不行  
D. 恶露有无异常

## **中医医师资格笔试各单元考试科目及分值**

### **中医执业医师资格考试内容(仅供参考)**

- |             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>第一单元</b> | 中基35、中诊35、中药35、方剂35、法规10   |
| <b>第二单元</b> | 西内50、西诊40、传染30、伦理10、中医经典20 |
| <b>第三单元</b> | 中内90、针灸60                  |
| <b>第四单元</b> | 中外50、中妇50、中儿50             |

### **中医助理医师资格考试内容(仅供参考)**

- |             |  |
|-------------|--|
| <b>第一单元</b> | 中基20、中诊20、中药20、方剂20、<br>西内25、西诊20、传染15、伦理5、法规5 |
| <b>第二单元</b> | 中内45、针灸30、中外25、中妇25、中儿25                       |

- E. 饮食之多少
12. 产后腹痛因瘀血引起者,称为
- A. 产后溺淋
  - B. 产后风
  - C. 子痛
  - D. 子满
  - E. 儿枕痛
13. 小儿感冒夹惊体现的小儿生理特点是
- A. 脾常不足
  - B. 乳食积滞
  - C. 肝火易亢
  - D. 脾胃湿困
  - E. 肾气不足
14. 5周岁小儿按公式计算,体重应为
- A. 15kg
  - B. 16kg
  - C. 17kg
  - D. 18kg
  - E. 20kg
15. 下列关于螳螂子的表述,错误的是
- A. 出现在两侧颊部,各有一个脂肪垫隆起
  - B. 有助吮乳
  - C. 不能挑割
  - D. 多发生于新生儿
  - E. 属于一种特殊的病理现象
16. 舌质绛红,有红刺多见于
- A. 温热病热入营血
  - B. 府积
  - C. 猩红热
  - D. 吃橄榄、乌梅、铁剂等
  - E. 心脾积热
17. 缩泉丸适用于尿频
- A. 湿热下注证
  - B. 阴虚内热证
  - C. 脾肾气虚证
  - D. 肾气不足证
  - E. 肝经湿热证
18. 下列不属于奶麻的皮疹特征的是
- A. 发疹有一定顺序
  - B. 疹退后无色素沉着
  - C. 疹退后无脱屑
  - D. 多为玫瑰色斑疹或斑丘疹
- E. 较麻疹细小
19. 厌食的临床表现与积滞的相比,不包括
- A. 长期食欲不振
  - B. 厌恶进食
  - C. 一般无脘腹胀满
  - D. 一般无大便酸臭
  - E. 吞酸嗳腐
20. 喘证的辨证,首先应审其
- A. 表里
  - B. 寒热
  - C. 虚实
  - D. 阴阳
  - E. 标本
21. 胸痹的主要病机是
- A. 气血阴阳不足
  - B. 痰火扰心
  - C. 心脉痹阻
  - D. 痰气郁结
  - E. 外邪内扰于心
22. 不寐肝火扰心证,若头晕目眩,头痛欲裂,不寐躁怒,大便秘结者,可用
- A. 当归龙荟丸
  - B. 大承气汤
  - C. 龙胆泻肝汤
  - D. 柴胡疏肝散
  - E. 大柴胡汤
23. 半夏白术天麻汤可治疗的眩晕证型为
- A. 风阳上扰证
  - B. 痰气郁结证
  - C. 痰热瘀结证
  - D. 痰火扰神证
  - E. 痰浊上蒙证
24. 下列呕吐的证型与治疗选方对应错误的是
- A. 胃阴不足—麦门冬汤
  - B. 脾胃气虚—香砂六君子汤
  - C. 肝气犯胃—柴胡疏肝散
  - D. 痰饮中阻一小半夏汤合苓桂术甘汤
  - E. 脾胃阳虚—理中汤
25. 治疗急性上消化道出血(可表现为吐血及便血) 的首选药物是
- A. 大黄
  - B. 地榆
  - C. 白及

- D. 云南白药  
E. 三七
26. 中风与痿证鉴别时, 痿证一般不具有() 症状  
A. 肢体瘫痪  
B. 肌肉萎缩  
C. 神昏  
D. 肢体活动无力  
E. 肌肉瘦削
27. 关于骨度分寸, 下列说法正确的是  
A. 耻骨联合上缘至髌底的骨度分寸是16寸  
B. 脐中至耻骨联合上缘的骨度分寸是5寸  
C. 臀沟至腘横纹的骨度分寸是13寸  
D. 耳后两乳突之间的骨度分寸是12寸  
E. 股骨大转子至腘横纹的骨度分寸是18寸
28. 手太阴肺经中能够治疗小儿腹积的穴位是  
A. 太渊  
B. 少商  
C. 尺泽  
D. 鱼际  
E. 列缺
29. 针刺列缺穴治疗头面部疾患, 属于腧穴的  
A. 远治作用  
B. 近治作用  
C. 特殊作用  
D. 抗御病邪作用  
E. 运行气血作用
30. 在肘区, 尺泽与肱骨外上髁连线的中点处的穴位是  
A. 合谷  
B. 偏历  
C. 曲池  
D. 手三里  
E. 曲泉
31. 提插补泻法的泻法操作是  
A. 先深后浅, 轻插重提, 提插幅度大, 频率快  
B. 先浅后深, 重插轻提, 提插幅度大, 频率快  
C. 先浅后深, 轻插重提, 提插幅度小, 频率快  
D. 先深后浅, 重插轻提, 提插幅度小, 频率快  
E. 先深后浅, 重插轻提, 提插幅度大, 频率快
32. 下列穴中既是络穴又是八脉交会穴的是  
A. 间使  
B. 大陵
- C. 劳宫  
D. 内关  
E. 曲泽
33. 少泽位于  
A. 在手指, 拇指末节桡侧, 指甲根角侧上方0.1寸  
B. 在手指, 食指末节桡侧, 指甲根角侧上方0.1寸  
C. 在手指, 小指末节尺侧, 指甲根角侧上方0.1寸  
D. 在手指, 第4指末节尺侧, 指甲根角侧上方0.1寸  
E. 在足趾, 第2趾末节外侧, 趾甲根角侧后方0.1寸
34. 下列关于膈俞的定位, 叙述正确的是  
A. 在脊柱区, 第1腰椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸  
B. 在脊柱区, 第7胸椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸  
C. 在脊柱区, 第8胸椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸  
D. 在脊柱区, 第6胸椎棘突下, 后正中线旁开1.5寸  
E. 在脊柱区, 第5胸椎棘突下, 后正中线旁开3寸
35. 在头部, 眉上1寸, 瞳孔直上的穴位是  
A. 瞳子髎  
B. 阳白  
C. 鱼腰  
D. 睛明  
E. 攒竹
36. 三阴交不能治疗  
A. 心悸  
B. 下肢疼痛  
C. 阴虚诸证  
D. 湿疹、荨麻疹  
E. 阳虚证
37. 大肠募穴位于() 上  
A. 足太阳脾经  
B. 足阳明胃经  
C. 手阳明大肠经  
D. 手太阴肺经  
E. 手太阳小肠经
38. 下列能治疗奔豚气的是  
A. 涌泉  
B. 然谷  
C. 大钟  
D. 复溜  
E. 太溪

## A2型题

### 答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

39. 患者，男，32岁。左侧小腿处，红赤肿胀、灼热疼痛，短时间内见紫斑，结毒化脓。伴发热，胃纳不香

舌红，苔黄腻，脉滑数。该患者治疗应首选的方剂是

- A. 普济消毒饮
- B. 柴胡清肝汤
- C. 黄连解毒汤
- D. 五神汤合草薢渗湿汤
- E. 八珍汤合仙方活命饮

40. 患者，男，28岁。右指头肿胀疼痛7天，呈蛇头状肿，皮色烦红，疼痛剧烈，手指下垂时加重。伴恶寒发热头痛。透光试验见指头腹侧有一豆状黑色点。诊断为蛇头疔，外治宜

- A. 金黄膏外敷
- B. 鲜猪胆汁外敷
- C. 切开引流
- D. 10%黄柏液湿敷
- E. 白玉膏外敷

41. 患者，女，62岁。便时肛内肿物脱出，轻重程度不一，色淡红，伴有肛门坠胀，大便带血，神疲乏力，食欲不振，舌淡，苔薄白，脉弱。该患者治疗宜选用的方剂是

- A. 葛根芩连汤
- B. 六磨汤
- C. 润肠汤
- D. 补中益气汤
- E. 凉血地黄汤

42. 患者，女性，30岁。左乳红肿热痛3天，皮肤烦红灼热，一周后肿块变软，有应指感。伴有壮热，舌红，苔黄腻，脉洪数。其治法为

- A. 疏肝解郁行气
- B. 活血化瘀
- C. 清热排毒，凉血消痈
- D. 清热解毒，托里透脓
- E. 疏肝清胃，通乳消肿

43. 患者，女，25岁，2天来全身起红色风团，灼热，剧痒，遇热时皮疹加重，苔薄黄，脉浮数。治疗方剂宜选用

- A. 桂枝汤
- B. 麻黄汤

C. 消风散

D. 麻桂各半汤

E. 当归饮子

44. 患者，女，28岁。平素月经规律，但经后头晕，头部绵绵作痛，月经量少，色淡，质稀；心悸少寐，神疲乏力；舌淡，苔薄，脉虚细。其治疗宜选

- A. 血府逐瘀汤
- B. 十全大补汤
- C. 八珍汤
- D. 温经汤
- E. 乌药汤

45. 患者，女，34岁，屡孕屡堕；再次孕后阴道出血，色深红质稠，腰酸腹痛，面赤唇红，口干咽燥，便结尿黄；舌红苔黄，脉弦滑数。该患者治法宜采用

- A. 益气养血，固冲安胎
- B. 祛瘀消瘤，固冲安胎
- C. 清热养血，滋肾安胎
- D. 育阴潜阳
- E. 调补气血

46. 患者，女，36岁，下腹部结块，触痛；月经量少，经行腹痛较剧，经色紫暗有块，曾反复流产3次；腰酸膝软，头晕耳鸣；舌暗，脉弦细。该患者治疗宜选用

- A. 香棱丸
- B. 大黄牡丹汤
- C. 补肾祛瘀方
- D. 桂枝茯苓丸
- E. 大黄蛰虫丸

47. 患者，女，42岁，因卫生习惯差，阴部瘙痒3天，坐卧不宁，外阴皮肤粗糙增厚，有抓痕，黏膜充血破溃，带下量多，色黄如脓，味腥臭；伴心烦易怒，胸胁满痛，口苦口腻，食欲不振，小便黄赤；舌体胖大，色红，苔黄腻，脉弦滑。该患者的治法为

- A. 散寒除湿，排脓止痒
- B. 利湿化痰，杀虫止痒
- C. 滋阴补肾，清肝止痒
- D. 清热除湿，泻火止痒
- E. 清热利湿，杀虫止痒

48. 患者，女，27岁，经期吐血、衄血，量少，色暗红

月经每先期、量少；平素可有头晕耳鸣，手足心热，两额潮红，潮热咳嗽，咽干口渴；舌绛，苔花剥，脉细数。该患者宜选用

- A. 清肝引经汤
- B. 顺经汤
- C. 知柏地黄丸
- D. 六味地黄丸
- E. 左归丸

49. 患儿，男，5岁，喜食肉，不食水果、蔬菜。现咽痛、吞咽困难5天，伴发热，扁桃体充血呈鲜红，肿大，表面有脓点。舌红，脉数。该病的治疗原则为

- A. 开肺化痰，退热利咽
- B. 疏风清热，利咽消肿
- C. 清热宣肺，利咽消肿
- D. 清热解毒，利咽消肿
- E. 养阴润肺，软坚利咽

50. 患儿，男，6岁，气喘，喉间哮鸣5天，伴咳嗽，痰黏，色黄难咯，胸闷，喷嚏，鼻塞，流清涕，恶寒，发热，面色红赤，夜卧不安，无汗，口渴，小便黄赤，大便干，咽红，舌质红，苔薄黄，脉滑数。该患儿治疗宜选用

- A. 苏子降气汤
- B. 大青龙汤
- C. 桑白皮汤
- D. 小青龙汤合三子养亲汤
- E. 麻杏石甘汤

51. 患儿，女，7岁，水肿，从眼睑开始，继而四肢，甚则全身浮肿，来势迅速，颜面为甚，皮肤光亮，按之凹陷即起，尿少，伴发热恶风，咽痛身痛，苔薄白，脉浮。

若咳喘明显，治疗宜麻黄连翘赤小豆汤合五苓散加

- A.羌活、防风
- B.桑白皮、葶苈子
- C.陈皮、白术
- D.白芥子、荆芥
- E.紫苏子、柴胡

52. 患儿，女，8岁，寐中多遗，可达数次，小便清长，面白少华，神疲乏力，智力较同龄儿稍差，肢冷畏寒，舌质淡，苔白滑，脉沉无力。该患儿为

- A. 阴虚内热证
- B. 湿热下注证
- C. 肾气不足证
- D. 脾肾两虚证
- E. 心血不足证

53. 患儿，男，4岁，有风疹接触史，高热1天后，局部

皮肤出现淡红色斑丘疹，1天后出现全身性斑丘疹，疹色鲜红，疹点稠密，可见皮疹融合成片，皮肤猩红，烦躁口渴，小便短黄，大便秘结，舌质红赤，苔黄糙，脉洪数。患儿治疗宜选用

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 透疹凉解汤
- D. 黄连解毒汤
- E. 宣毒发表汤

54. 患者，女，46岁，胸部膨满，憋闷如塞，甚则张口抬肩，咳嗽，神志恍惚，表情淡漠，谵妄，烦躁不安，撮空理线，嗜睡，伴肢体颤动，抽搐，舌质淡紫，苔白腻，脉细滑数。其最佳治法为

- A. 清肺化痰，降逆平喘
- B. 燥湿化痰，降逆平喘
- C. 涤痰、开窍、息风
- D. 温肾健脾，化饮利水
- E. 补肺纳肾，降气平喘

55. 患者，男，72岁，哮喘病史2年，反复发作，喉中时有轻度哮鸣，短气息促，动则为甚，吸气不利，咳痰质黏起沫，脑转耳鸣，腰酸腿软，心慌，不耐劳累。五心烦热，颧红，口干，舌质红少苔，脉细数。临幊上，其治疗宜选

- A. 定喘汤
- B. 金匮肾气丸和参蛤散
- C. 平喘固本汤
- D. 生脉地黄汤合金水六君煎
- E. 六君子汤

56. 患者，女，68岁，肢体关节疼痛，痛势较剧，部位固定，遇寒则痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利，局部皮肤或有寒冷感，舌质淡，舌苔薄白，脉弦紧。其治法为

- A. 散寒通络，祛风除湿
- B. 除湿通络，祛风散寒
- C. 培补肝肾，舒筋止痛
- D. 化瘀行瘀，蠲痹通络
- E. 清热通络，祛风除湿

57. 患者，男，78岁，有冠心病病史多年，形神衰败，身体羸瘦，大肉尽脱，伴心悸自汗，神倦嗜卧，心胸憋闷疼痛，形寒肢冷，面色苍白，舌淡苔白，脉细弱。根据患者症状，其辨证为

- A. 心阳虚证

- B. 心气虚证  
C. 脾气虚证  
D. 心血虚证  
E. 心阴虚证
58. 患者,男,62岁.因劳累引发下痢,时发时止,迁延不愈,发时大便次数增多,夹有赤白黏冻,腹胀食少,倦怠嗜卧,舌质淡苔腻,脉虚数.其治疗首选  
A. 苓药汤  
B. 桃花汤合真人养脏汤  
C. 不换金正气散  
D. 连理汤  
E. 驻车丸
59. 患者,女,28岁,饮食梗阻难下,偶有虽下而复吐出,呕出物如赤豆汁,胸膈疼痛,固着不移,肌肤枯燥,形体消瘦,舌质紫暗,脉细涩.该患者宜选用  
A. 通幽汤  
B. 启膈散  
C. 丁香散  
D. 少腹逐瘀汤  
E. 五磨饮子
60. 患者,女,48岁,胁肋隐痛,悠悠不休,遇劳加重,口干咽燥,心中烦热,头晕目眩,舌红少苔,脉细弦而数.该患者宜选用  
A. 沙参麦冬汤  
B. 一贯煎  
C. 生脉散  
D. 柴胡疏肝散  
E. 左归饮
61. 患者,女,56岁.小便小便频数短涩,浑浊,色乳白,上有浮油,置之沉淀,尿道热涩疼痛,尿时阻塞不畅,口干,苔黄腻,舌质红,脉濡数.其治法为  
A. 清热利湿通淋  
B. 清热利湿,排石通淋  
C. 清热通淋,凉血止血  
D. 疏肝理气,利尿通淋  
E. 清热利湿,分清泄浊
62. 患者,男,60岁,头晕目眩,甚则昏眩欲仆,伴耳鸣,腰膝酸软,遗精,舌淡,脉沉细.除风池、百会外,应加用  
A. 内关、太冲、行间、侠溪、太溪  
B. 内关、太冲、头维、丰隆、中脘  
C. 肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞  
D. 肝俞、肾俞、足三里、太溪、悬钟、三阴交
- E. 头维、血海、膈俞、内关、足三里、太溪  
63. 患者,男,75岁,,大便艰涩,排出困难,用力努挣则汗出短气,便后乏力,面白神疲,肢倦懒言,舌淡苔白,脉弱.治疗本病,除主穴外,还应加用  
A. 曲池、内庭  
B. 太冲、中脘  
C. 脾俞、气海  
D. 神阙、关元  
E. 照海、太溪
64. 患者,女,29岁.近3月经行期间伴小腹坠胀,疼痛,拒按.舌下络脉瘀紫,脉细涩.其针灸治疗主要选取  
A. 手太阳、手阳明经穴  
B. 任脉、足太阴经穴  
C. 手太阳、足厥阴经穴  
D. 任脉、足太阳经穴  
E. 任脉、手太阴经穴
65. 患者,女,38岁,有外伤史,今晨面部突然发作疼痛,呈针刺样剧烈疼痛,痛时可引起面部肌肉抽搐,痛点固定不移,舌暗有瘀斑,脉细涩.治疗除主穴外,还应选取  
A. 风池、列缺  
B. 内关、三阴交  
C. 颧髎、颊车  
D. 行间、内庭  
E. 命门、腰阳关
66. 向某,女,30岁.晚上设置的空调温度过低,晨起后发现右侧项背牵拉疼痛,头向右侧倾斜,颈项活动受限,针灸治疗除局部取穴外,还可用  
A. 督脉、肝经穴  
B. 小肠经、胆经穴  
C. 膀胱经、肝经穴  
D. 胆经、肝经穴  
E. 肝经、膀胱经穴
67. 患者,女,31岁.起病急,牙痛甚而龈肿,伴形寒身热,脉浮数,主穴应选用  
A. 太溪、行间  
B. 内庭、二间  
C. 外关、风池  
D. 下关、合谷、颊车  
E. 太冲、肝俞
68. 患者,女,42岁,一周前左侧腰肋部皮肤出现灼热刺痛、发红,继则出现簇集性粟粒大小丘状疱疹,多带

状排列，胸脘痞满，纳差，舌红，苔黄腻，脉濡数，除主穴外，该患者还应选取

- A. 行间、侠溪
- B. 血海、三阴交
- C. 天枢
- D. 神门
- E. 阴陵泉、内庭

69. 患者，男，50岁，哮喘反复发作，伴声低气怯，气息短促，深吸为快，体质虚弱，脉弱无力。患者针灸治疗的穴位不包括

- A. 列缺、尺泽

- B. 肺俞、肾俞
- C. 膏肓、足三里
- D. 太渊、太溪
- E. 定喘、气海

70. 女，49岁。因患“急性肾绞痛”半小时。针灸治疗时选

- A. 足三里、合谷、三阴交、阴陵泉
- B. 肾俞、三阴交、膀胱俞、阴陵泉
- C. 肾俞、足三里、中渚、三阴交
- D. 三阴交、曲池、昆仑、肾俞
- E. 肾俞、阳陵泉、日月、三阴交

### A3型题

#### 答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

#### (71~73题共用题干)

患者，女，35岁，结喉正中稍右有一半球形肿块如鸡蛋大，不红、不热，边界清楚，表面光滑，质地中等无压痛，皮色如常，随吞咽上下移动。无明显全身症状，苔薄腻，脉弦滑。根据题干回答下列问题

71. 该患者的诊断为

- A. 气瘿肝郁气滞证
- B. 肉瘿气滞痰凝证
- C. 石瘿痰瘀内结证
- D. 肉瘿肝郁气滞证
- E. 筋瘿痰瘀互结证

72. 该病的治法为

- A. 理气解郁，化痰软坚
- B. 解郁化痰，活血散结
- C. 益气养阴，软坚散结
- D. 温阳散寒，化痰散结
- E. 理气化痰排脓

73. 该患者治疗宜选用

- A. 四海舒郁丸
- B. 柴胡疏肝散
- C. 逍遥散合海藻玉壶汤
- D. 海藻玉壶汤合桃仁红花汤
- E. 顺气归脾丸

#### (74~76题共用题干)

患者，男，26岁。3个月前胳膊出现皮疹，有薄膜现象。

刮除薄膜，出现多个筛状出血点。病程进入静止期后，皮疹多呈斑片状，颜色淡红，鳞屑减少，干燥破裂，自觉瘙痒；伴口咽干燥；舌质淡红，舌苔少，脉沉细。根据题干回答下列问题

74. 根据上述症状，诊断该患者所患的疾病是

- A. 黄水疮
- B. 牛皮癣
- C. 蛇串疮
- D. 脂溢性皮炎
- E. 白疕

75. 该患者辨证为

- A. 风虚血燥证
- B. 血热内蕴证
- C. 血虚风动证
- D. 风邪上犯证
- E. 气滞血瘀证

76. 治疗该患者首选的方剂是

- A. 化斑解毒汤
- B. 草薢分清饮
- C. 参苓白术散合茵陈蒿汤
- D. 当归饮子
- E. 四物汤合六味地黄汤

#### (77~79题共用题干)

患者，男，24岁。便血，色鲜红，排便时肛内有肿物脱出，便后可自行回纳，肛门灼热，舌质红，苔黄腻，脉弦数。

77. 该患者所患疾病处于

- A. I 期
- B. Ⅱ 期
- C. Ⅲ 期
- D. Ⅳ 期
- E. V 期

78. 根据患者症状，可辨证为

- A. 风伤肠络证
- B. 湿热下注证
- C. 气滞血瘀证
- D. 脾虚气陷证
- E. 肝胆湿热证

79. 治疗该患者首选的方剂是

- A. 凉血地黄汤
- B. 脾连丸
- C. 止痛如神汤
- D. 补中益气汤
- E. 龙胆泻肝汤

(80~82题共用题干)

患者，女，45岁，经来无期，行经天数不固定，量少淋沥不尽，血色鲜红；面颊潮红，烦热少寐，咽干口燥，舌红，少苔，脉细数。

80. 患者的诊断为

- A. 崩漏肾阴虚证
- B. 经间期出血肾阴虚证
- C. 崩漏血热虚热证
- D. 月经先后无定期血热虚热证
- E. 经期延长肾阴虚证

81. 该患者的治疗宜选用

- A. 清热固经汤
- B. 上下相资汤
- C. 左归丸
- D. 清热调血汤
- E. 右归丸

82. 该患者治法为

- A. 清热凉血，固冲止血
- B. 滋肾益阴，固冲止血
- C. 温经散寒，活血调经
- D. 滋肾养肝，和胃通络
- E. 养阴清热，固冲止血

(83~85题共用题干)

患者，女，31岁。近期带下量多，色白，质稀薄，如涕如唾，绵绵不断，无臭；面色胱白，四肢倦怠，脘胁不舒，纳少便溏，四肢浮肿；舌淡胖，苔白腻，脉细缓。

83. 该患者可辨证为

- A. 脾虚证
- B. 肾阳虚证
- C. 寒湿阻滞证
- D. 阴虚夹湿证
- E. 气阴亏虚证

84. 其治法为

- A. 养血祛风
- B. 滋肾益阴，散寒利湿
- C. 清热利湿，润燥止痒
- D. 健脾益气，升阳除湿
- E. 益气滋阴润燥

85. 其治疗方药宜选

- A. 易黄汤
- B. 内补丸
- C. 完带汤
- D. 左归丸
- E. 知柏地黄丸

(86~88题共用题干)

患者，女，26岁，产后恶露不尽，量时多时少，色暗有块，小腹疼痛拒按；舌紫暗，边有瘀点，脉沉涩。

86. 该患者的诊断为

- A. 产后恶露不绝气虚证
- B. 产后恶露不绝血热证
- C. 产后恶露不绝血瘀证
- D. 盆腔炎湿热瘀滞证
- E. 闭经湿热蕴结证

87. 患者治疗宜选用

- A. 补中益气汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 生化汤
- D. 保阴煎
- E. 泻心汤

88. 该患者治法宜选用

- A. 活血化瘀止血
- B. 补气固冲摄血
- C. 养阴清热止血
- D. 温经通络活血
- E. 疏肝解郁活血

(89~91题共用题干)

病儿，出生后6小时后出现黄疸，迅速加重，伴嗜睡，神昏，抽搐，舌质红，苔黄腻。

89. 该患儿的诊断为

- A. 阳黄 痰蒙神窍证
- B. 阳黄 重症
- C. 胎黄 胎黄虚脱证
- D. 胎黄 胎黄动风证
- E. 胎黄 湿热郁蒸证

90. 该患儿治疗宜选用

- A. 茵陈蒿汤
- B. 茵陈五苓散
- C. 羚角钩藤汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 普济消毒饮

91. 该患儿治法宜选用

- A. 清热利湿退黄
- B. 温中化湿退黄
- C. 平肝息风，利湿退黄
- D. 大补元气，温阳固脱
- E. 行气化瘀消积

(92~94题共用题干)

患儿，女，2岁，1月前感受风寒后发热、咳嗽严重，伴气喘、痰鸣，2天后热退，现仍有咳嗽、咳痰的表现

咳痰无力，痰稀白易咯，多汗，感冒，纳呆便溏，面白少华，神疲乏力，舌质淡红，舌体胖嫩，苔薄白，脉细无力，指纹淡。

92. 该患儿的诊断为

- A. 咳嗽 肺脾气虚证
- B. 肺炎喘嗽 肺脾气虚证
- C. 肺炎喘嗽 风寒闭肺证
- D. 感冒 气虚感冒证
- E. 风寒咳嗽证

93. 患儿治疗宜选用

- A. 杏苏散
- B. 六君子汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 人参五味子汤
- E. 参附龙牡救逆汤

94. 本病的病机关键为

- A. 肺气郁闭
- B. 肺气上逆
- C. 邪犯为表
- D. 正气亏虚
- E. 肺脾气虚

(95~97题共用题干)

患儿，女，1岁半，大便稀溏，夹有食物残渣，气味酸臭，如败卵，脘腹胀满，便前腹痛，泻后痛减，腹痛拒按，嗳气酸馊，不思乳食，夜卧不安，舌苔厚腻，指纹滞。

95. 该患儿治疗宜选用

- A. 大承气汤
- B. 枳实导滞丸
- C. 保和丸
- D. 越鞠丸
- E. 乌梅汤

96. 该患儿的治法宜选用

- A. 健脾益气，助运止泻
- B. 运脾和胃，消食化滞
- C. 清肠解热，化湿止泻
- D. 疏肝健脾，和胃止泻
- E. 清热泻火，解毒止泻

97. 该证不宜应用的推拿疗法为

- A. 清大肠
- B. 揉龟尾
- C. 补脾土
- D. 点揉中脘
- E. 逆运内八卦

(98~100题共用题干)

患者，男，32岁，近期曾与肺旁病人接触。现咳痰、低热2天，痰少质黏，时时咳血，血色鲜红，午后潮热，骨蒸颧红，五心烦热，盗汗，口渴心烦，失眠，性情急躁易怒，形体日益消瘦。舌干而红，苔薄黄而剥，脉细数。

98. 该患者的诊断为

- A. 肺胀 痰热郁肺
- B. 肺痈 恢复期
- C. 肺痨 肺阴亏损
- D. 肺旁 虚火灼肺
- E. 肺痿 虚热

99. 该患者治疗宜选用

- A. 越婢加半夏汤
- B. 沙参清肺汤
- C. 月华丸
- D. 百合固金汤合秦艽鳖甲散
- E. 清燥救肺汤

100. 该患者的治法宜选用

- A. 滋阴润肺
- B. 滋阴补阳
- C. 滋阴降火