

## 中西医实践技能第一站病例分析-5.14 打卡

### 【病案（例）摘要】

张菜，女，7岁。2016年10月10日初诊。

患儿3天前出现双下肢皮疹，逐渐加重。现见双下肢及臀部较密集红色瘀点、瘀斑，色泽鲜艳，压之不褪色，伴瘙痒，有阵发性腹痛，舌质红，苔黄，脉数有力。

查体：T:36.8℃,P:90次/分，R:22次/分。双下肢及臀部皮肤可见较密集红色瘀点、瘀斑，呈对称性分布。心肺听诊(-)，腹软，肝脾未触及，无明显压痛，肠鸣音活跃。舌质红，苔黄，脉数有力。

辅助检查：血常规：白细胞  $9.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 69%，淋巴细胞 28%，血小板  $180 \times 10^9/L$ 。

要求：根据上述摘要，在答题卡上完成书面分析。

### 【参考答案】

中医疾病诊断：紫斑。

中医证候诊断：血热妄行证。

西医诊断：过敏性紫癜。

西医诊断依据：①双下肢及臀部较密集红色瘀点、瘀斑，呈对称性分布，伴瘙痒，腹痛。心肺听诊(-)，腹软，肝脾未触及，无明显压痛，肠鸣音活跃。②血常规：白细胞  $9.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 69%，淋巴细胞 28%，血小板  $180 \times 10^9/L$ 。

中医治法：清热解毒，凉血止血。

方剂：犀角地黄汤加减。

药物组成、剂量及煎服法：犀角(水牛角代)30g(先煎)，生地黄 24g，芍药 12g，牡丹皮 9g。三剂，水煎服。日一剂，早晚分服。

西医治疗原则及方法：①对症治疗：应用 654-2、阿托品等缓解腹痛，限制粗糙饮食，应用大剂量维生素 C、钙剂及抗组胺药。②肾上腺皮质激素与免疫抑制剂：应用泼尼松，或甲基泼尼松龙。③抗凝治疗：阿司匹林、潘生丁。