

2024年医师考试密卷--口腔助理

A1/A2 型选择题

1. 下列关于同工酶概念的叙述哪一项是正确的？（ ）
 - A. 是结构相同而存在部位不同的一组酶
 - B. 是催化相同化学反应而理化性质及免疫学特性不同的一组酶
 - C. 是催化相同反应而分布不同的一组酶
 - D. 是催化相同反应的所有酶
 - E. 所有酶均有同工酶
2. 以下关于牙槽骨吸收的描述，哪项不对？（ ）
 - A. 牙齿松动程度，II度以上松动为有骨吸收
 - B. 牙周袋深度，>4mm的真性牙周袋为有骨吸收
 - C. 牙槽嵴顶到釉牙本质界的距离，超过2mm可确定有骨吸收
 - D. X线示牙槽骨与牙根面间形成角形骨缺损
 - E. 以上均不对
3. 下列哪种药物禁用于心源性哮喘？（ ）
 - A. 吗啡
 - B. 毛花苷（西地兰）
 - C. 肾上腺素
 - D. 氨茶碱
 - E. 呋塞米（速尿）
4. 下列哪种是釉质形成缺陷症的最常见遗传类型？（ ）
 - A. 常染色体显性遗传
 - B. 常染色体隐性遗传
 - C. X性连锁显性遗传
 - D. X性连锁隐性遗传
 - E. Y染色体显性遗传
5. 蛋白质在280nm波长处有最大光吸收，是由下列哪种结构引起的？（ ）
 - A. 组氨酸的咪唑基
 - B. 丝氨酸的羟基
 - C. 半胱氨酸的SH基
 - D. 苯丙氨酸的苯环
 - E. 谷氨酸的-COOH基
6. 丁卡因不用于浸润麻醉的原因，主要是该药（ ）。
 - A. 穿透力强
 - B. 作用时间长
 - C. 毒性大

- D. 刺激性大
E. 可引起过敏反应
7. 阿托品禁用于（ ）。
- A. 肠痉挛
B. 虹膜睫状体炎
C. 青光眼
D. 胆绞痛
E. 溃疡病
8. 能形成半月板的结构是（ ）。
- A. 浆液腺泡
B. 黏液腺泡
C. 混合性腺泡
D. 闰管
E. 分泌管
9. 形状不同于任何恒牙的是（ ）。
- A. 上颌乳尖牙
B. 下颌第一乳磨牙
C. 下颌第二乳磨牙
D. 上颌第一乳磨牙
E. 上颌第二乳磨牙
10. 上下颌骨处于正中关系时，下颌可以做可开闭运动的范围是（ ）。
- A. 15~18mm
B. 18~20mm
C. 18~25mm
D. 25~30mm
E. 30~35mm
11. 下列哪项不属于自律？（ ）
- A. 内心信念
B. 法律法规概念
C. 自我道德教育
D. 良心、人格追求
E. 慎独自省
12. 牙髓坏死的临床表现为（ ）。
- A. 一般无临床表现，X线检查可见牙内吸收
B. 牙齿发暗、变色、不透明，温度及电活力试验无反应
C. 牙齿变色，髓腔内腐败发臭，温度及电活力试验无反应
D. 无明显自发痛，温度改变可引起疼痛
E. 一般无症状，X线可见根管有不均匀膨大

13. 下列哪项不是咀嚼黏膜的特征？（ ）
- A. 有角化层
 - B. 颗粒层不明显
 - C. 上皮钉突多而细长
 - D. 固有层较厚
 - E. 胶原纤维粗大
14. 治疗牙髓及根尖周病一般不会用到的药物是（ ）。
- A. 丁香油
 - B. 甲酚甲醛液
 - C. 根管充填剂
 - D. 碘甘油
 - E. 碘仿糊剂
15. 下列何种疾病患者不易罹患牙周病？（ ）
- A. 糖尿病
 - B. 白血病
 - C. 再生障碍性贫血
 - D. 大叶性肺炎
 - E. Down 综合征
16. 涎腺腺样囊性癌最具侵袭性的成分是（ ）。
- A. 筛孔状结构
 - B. 小导管结构
 - C. 小条索结构
 - D. 实性型结构
 - E. 上皮团块
17. 侵袭性牙周炎全身治疗的首选药物是（ ）。
- A. 广谱抗生素
 - B. 维生素类药
 - C. 皮质激素
 - D. 大环内酯类药物+甲硝唑
 - E. 磷酸氯喹
18. 对正态分布曲线的描述有误的是（ ）。
- A. 正态分布曲线以均数为中心
 - B. 正态分布曲线上下完全对称
 - C. 正态分布曲线是左右完全对称的钟形曲线
 - D. 正态分布曲线由两个参数固定
 - E. 正态分布曲线在横轴均数上方所在处曲线为最高点
19. 原发性疱疹性口炎病因是感染了（ ）。
- A. 单纯疱疹 I 型病毒

- B. 单纯疱疹Ⅱ型病毒
 - C. 人类获得性免疫缺陷Ⅰ型病毒
 - D. 人类获得性免疫缺陷Ⅱ型病毒
 - E. 带状疱疹病毒
20. 窝洞外形线需制成圆缓曲线，其目的是为了（ ）。
- A. 防止充填体脱落
 - B. 防止充填体折断
 - C. 防止继发龋的出现
 - D. 达到良好的美观效果
 - E. 防止牙体折裂
21. 罩牙本质中的胶原（ ）。
- A. 属于Ⅲ型胶原
 - B. 形成的胶原纤维比较纤细
 - C. 所构成的纤维与牙本质小管垂直
 - D. 由成牙本质细胞分泌
 - E. 由牙乳头细胞分泌
22. 治疗牙龈肥大增生，应选择（ ）。
- A. 根尖切除术
 - B. 龈翻瓣术
 - C. 牙龈切除术
 - D. 根尖刮治术
 - E. 依病变程度和性质，可以选用上述任一术式
23. 引起牙髓病的感染途径有（ ）。
- A. 深龋和牙周病的逆行感染
 - B. 牙周病逆行感染、深龋和化学药物刺激
 - C. 电流刺激、咬合创伤、全身慢性消耗性系统疾病
 - D. 血源性感染、牙周病的逆行感染、深龋和严重的牙体损伤
 - E. 外伤、发育畸形和意外穿髓
24. 患牙有垂直的叩痛，通常是什么病的诊断依据？（ ）
- A. 根尖炎
 - B. 牙龈炎
 - C. 牙周炎
 - D. 牙髓炎
 - E. 以上疾病均可出现垂直叩痛
25. 下列关于医德品质和医德行为的关系，哪一个是错误的？（ ）
- A. 医德品质是在医德行为的基础上形成的，并且通过医德行为来加以体现和印证
 - B. 已经形成的医德品质，反过来对医德行为起着导向和支配作用

- C. 医德行为与医德品质是交互作用、互相影响的统一整体
D. 医德行为是在医德品质基础上形成的
E. 医德品质是一系列医德行为的总和
26. 药物产生副作用的药理学基础是（ ）。
- A. 药物的安全范围小
B. 用药剂量过大
C. 作用的选择性低
D. 病人的肝肾功能差
E. 病人对药物过敏
27. 急性汞中毒的主要临床表现（ ）。
- A. 发热、口腔炎、消化道症状
B. 贫血、腹痛、口腔炎
C. 易兴奋、震颤、口腔炎
D. 周围神经炎、皮疹、贫血
E. 抽搐、皮疹、贫血
28. 牙骨质龋细菌入侵的主要通道是（ ）。
- A. 牙骨质层板
B. 穿通纤维
C. 生长线
D. 成牙骨质细胞突起
E. 牙骨质细胞陷窝
29. 下列引起酶原激活方式的叙述哪一项是正确的？（ ）
- A. 是由氢键断裂，酶分子的空间构象发生改变引起的
B. 是由酶蛋白与辅酶结合而实现的
C. 是由低活性的酶形式转变成高活性的酶形式
D. 酶蛋白被修饰
E. 是由部分肽键断裂，酶分子空间构象改变引起的
30. 主要反映医学心理学重要性的不包括下列哪项？（ ）
- A. 医学模式转变
B. 改善医患关系
C. 临床工作需要
D. 预防战略转变
E. 卫生经济学需要
31. 在下列氯丙嗪适应证中，哪个是错误的？（ ）
- A. 人工冬眠
B. 镇吐
C. 麻醉前用药
D. 精神分裂症

E. 抑郁性精神病

32. 伴有糖尿病的水肿病人不宜选用哪一种利尿药？（ ）

- A. 呋塞米
- B. 氢氯噻嗪
- C. 氨苯蝶啶
- D. 螺内酯
- E. 乙酰唑胺

33. 干髓术后发生残髓炎者，应进行何种治疗？（ ）

- A. 除去充填物重新失活后再行干髓术
- B. 拔除患牙
- C. 除去充填物、进行根管治疗或牙髓塑化法
- D. 不除去充填物，只使用药物消炎
- E. 除去充填物开放，服止痛药物，症状消失后重新充填

34. 下列哪项不是咀嚼效率的影响因素？（ ）

- A. 牙周组织的健康状况
- B. 颞下颌关节疾患
- C. 年龄
- D. 全身健康状况
- E. 性别

35. 舌的发育来源除外（ ）。

- A. 第1鳃弓
- B. 第2鳃弓
- C. 第3鳃弓
- D. 第4鳃弓
- E. 第5鳃弓

36. 具备下列条件的可以参加执业医师资格考试：具有高等学校医学专科学历，在医疗、预防、保健机构中试用期满（ ）。

- A. 6个月
- B. 18个月
- C. 1年
- D. 2年
- E. 3年

37. 构成医患之间信任关系的根本前提是（ ）。

- A. 病人求医行为已含对医师的信任
- B. 病人在医患交往中处于被动地位
- C. 医师是仁者
- D. 现代医学服务是完全可以依赖的
- E. 医患交往中加入一些特殊因素

38. 根管治疗中器械折断于根管中未超过根尖孔，不易取出，可采用（ ）。

- A. 根尖切除术
- B. 牙髓塑化疗法
- C. 干尸术
- D. 空管疗法
- E. 复合树脂充填术

39. 上皮层中胞质内含嗜碱性透明角质颗粒的细胞是（ ）。

- A. 角化层
- B. 颗粒层
- C. 棘层
- D. 基底层
- E. 黑色素细胞

40. 位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径，糖原合成及分解各代谢途径交汇点上的化合物是（ ）。

- A. 6-磷酸葡萄糖
- B. 1-磷酸葡萄糖
- C. 1,6-二磷酸果糖
- D. 6-磷酸果糖
- E. 3-磷酸甘油醛

41. 对于牙本质过敏，首选的治疗方法是（ ）。

- A. 药物脱敏
- B. 牙髓治疗
- C. 牙周洁治
- D. 垫底充填
- E. 树脂充填

42. 肝素的抗凝作用（ ）。

- A. 仅在体外有效
- B. 口服有效
- C. 仅在体内有效
- D. 体内、体外都有效
- E. 与 Ca^{2+} 形成可溶性络合物

43. 口腔前庭的表面解剖标志不包括（ ）。

- A. 唇颊龈沟
- B. 上、下唇及颊系带
- C. 翼下颌韧带
- D. 腮腺导管口
- E. 磨牙后区

44. 能主动吸收钠、排出钾的是（ ）。
- A. 闰管
 - B. 分泌管
 - C. 小叶间导管
 - D. 排泄管
 - E. 总导管
45. 牙内陷最严重的情况是（ ）。
- A. 畸形舌侧窝
 - B. 牙中牙
 - C. 畸形根面沟
 - D. 畸形舌侧尖
 - E. 锥形牙
46. 关于青少年牙周炎的叙述，以下哪项是错误的？（ ）
- A. 主要发生在青春期末至 25 岁的年轻人，女性多于男性
 - B. 早期患者菌斑、牙石很少，牙周组织破坏程度与局部刺激物的量不成正比
 - C. X 线片显示：第一磨牙近远中呈水平吸收，切牙区多呈弧形吸收
 - D. 病程进展很快
 - E. 可能有家族遗传史
47. 恒牙列中，患龋最少的是（ ）。
- A. 下颌第一恒磨牙
 - B. 下颌第二恒磨牙
 - C. 前磨牙
 - D. 尖牙
 - E. 上颌第一恒磨牙
48. X 线片上呈透射的是（ ）。
- A. 牙胶
 - B. 氧化锌
 - C. 常见塑化液
 - D. 磷酸锌水门汀
 - E. 氢氧化钙
49. 以下哪支动脉不是颈外动脉的分支？（ ）
- A. 甲状腺上动脉
 - B. 舌动脉
 - C. 面动脉
 - D. 上颌动脉
 - E. 眼动脉
50. 依照对医疗机构执业要求的规定，医疗机构有以下义务，除了（ ）。

- A. 必须承担相应的预防工作
 - B. 必须承担相应的医疗卫生知识的宣传普及工作
 - C. 必须承担相应的保健工作
 - D. 承担卫生行政部门委托的支援农村的任务
 - E. 承担卫生行政部门委托的指导基层医疗卫生工作的任务
51. 医师在执业活动中除正当治疗外，不得使用（ ）。
- A. 保健药品
 - B. 消毒药剂
 - C. 有禁忌证的药品
 - D. 副作用大的药品
 - E. 麻醉药品
52. 奥美拉唑治疗十二指肠溃疡的机制是（ ）。
- A. 阻断胃壁细胞 $H^+ - K^+ - ATP$ 酶
 - B. 阻断 H_2 受体
 - C. 保护胃黏膜细胞
 - D. 抑制胃蛋白酶分泌
 - E. 中和胃酸
53. 下列哪项不是活动期牙周炎的病理变化？（ ）
- A. 牙周袋内有大量炎性渗出物
 - B. 沟内上皮出现糜烂
 - C. 结合上皮向根方增殖
 - D. 牙槽骨出现活跃破骨细胞
 - E. 牙周膜间隙变窄
54. 有关酶催化反应的特点中错误的是（ ）。
- A. 酶反应在 $37^\circ C$ 条件下最高
 - B. 具有高度催化能力
 - C. 具有高度稳定性
 - D. 酶的催化作用是受调控的
 - E. 具有高度专一性
55. 胆固醇是下列哪种化合物的前体？（ ）
- A. 维生素 A
 - B. 维生素 E
 - C. 泛酸
 - D. 维生素 D
 - E. 泛醌
56. 牙本质和牙骨质来源于（ ）。
- A. 上皮细胞
 - B. 骨髓细胞

- C. 牙本质细胞
- D. 间质细胞
- E. 骨细胞

57. 不属于下颌骨内侧面的解剖结构是（ ）。

- A. 颞棘
- B. 颞结节
- C. 下颌小舌
- D. 下颌下腺窝
- E. 舌下腺窝

58. Bennett 运动是指（ ）。

- A. 下颌的侧方运动
- B. 下颌的前伸运动
- C. 下颌的边缘运动
- D. 下颌的开闭运动
- E. 下颌的功能运动

59. 龋的药物治适用于（ ）。

- A. 静止龋
- B. 猖獗龋
- C. 牙本质浅龋
- D. 未成洞的浅龋
- E. 乳牙龋

60. 磨片中可见到新生线的牙是（ ）。

- A. 上中切牙
- B. 下中切牙
- C. 上颌第一磨牙
- D. 下颌第二磨牙
- E. 智齿

61. 慢性根尖周炎的诊断主要依靠（ ）。

- A. 牙髓电活力检查
- B. 冷热刺激检查
- C. 咬诊和叩诊
- D. 探诊和扪诊
- E. X 线检查

62. 对于特别不配合的儿童，乳牙龋坏治疗可酌情采用药物治疗，但除外（ ）。

- A. 2%氟化钠
- B. 8%氟化亚锡
- C. 氟化氨银

D. 酸性氟磷酸盐

E. 10%的氟化钼酸铵

63. 第二恒磨牙萌出时间是（ ）。

A. 2~3 岁

B. 6~7 岁

C. 12~13 岁

D. 18~21 岁

E. 5~6 岁

64. 检查邻面接触点最好用（ ）。

A. 探针探查

B. 牙线检查

C. X 线摄片

D. 摇动牙齿

E. 咬薄蜡片或咬合纸

65. 塑化与根管充填治疗（ ）。

A. 都可治疗根尖周炎

B. 都要彻底拔髓

C. 都要严格扩挫根管

D. 均可通过 X 线显影了解治疗结果

E. 都可充填牙胶尖

66. 手术治疗龋病，备洞时不应该的是（ ）。

A. 以病变范围为基础设计外形，并做预防性扩展

B. 制备抗力形

C. 制备固位形

D. 去尽所有的洞口无基釉

E. 邻面洞的龈壁要做成向龈方的斜面

67. 发生医疗纠纷需进行尸检的，尸检时间应在死亡（ ）。

A. 12h 内

B. 24h 内

C. 36h 内

D. 48h 内

E. 72h 内

68. 不符合逆行性牙髓炎诊断的是（ ）。

A. 深牙周袋或严重的根分歧病变

B. 牙齿松动，牙周袋溢脓

C. 出现急性牙髓炎症状

D. 出现慢性牙髓炎症状

E. 牙周组织健康，牙齿隐裂深达牙髓

69. 后牙鸠尾峡的宽度一般为颊舌牙尖间距的 $1/3 \sim 1/2$ ，主要是为了（ ）。

- A. 获得良好的抗力形
- B. 获得良好的固位形
- C. 获得良好的预防性扩展
- D. 彻底去除龋坏的牙体组织
- E. 充填体的美观

70. 下颌骨的薄弱部位不包括（ ）。

- A. 正中联合
- B. 颞孔区
- C. 下颌角
- D. 乙状切迹
- E. 髁突颈部

71. 在咀嚼过程中，磨损的定义是（ ）。

- A. 牙面与食物之间的摩擦而造成牙齿缓慢地渐进性消耗
- B. 牙面与牙面之间的摩擦而造成牙齿缓慢地渐进性消耗
- C. 牙面与外物机械摩擦而造成牙体损耗
- D. 牙面与外物机械摩擦而产生的外物机械损耗
- E. 牙面与硬物机械性摩擦产生的相互间的损耗

72. 低分化涎腺黏液表皮样癌与鳞状细胞癌的鉴别要点是（ ）。

- A. 表皮样细胞
- B. 黏液细胞
- C. 中间细胞
- D. 鳞状化生
- E. 未分化细胞

73. 维生素 E 是（ ）。

- A. 脂肪酸衍生物
- B. 萘醌
- C. 苯酚
- D. 前列腺素
- E. 生育酚

74. 下颌尖牙形态中哪一点是错误的？（ ）

- A. 近中牙尖嵴较远中牙尖嵴短
- B. 唇面五边形
- C. 牙尖偏近中
- D. 舌轴嵴较上尖牙显著
- E. 发育沟不明显

75. 钟状期的成釉器由几层细胞构成？（ ）

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

76. 不属于年轻恒牙牙髓特点的有（ ）。

- A. 组织疏松
- B. 血运丰富
- C. 防御修复能力强
- D. 渗出作用强
- E. 增生现象显著

77. 在胚胎第 5 周时覆盖在原始口腔的上皮细胞有几层？（ ）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

78. $P(A) = 0$ 时，表示事件（ ）。

- A. 可能发生
- B. 极可能发生
- C. 不可能发生
- D. 在一次抽样中不会发生
- E. 已经发生

79. 雪口病的病因是（ ）。

- A. 溶血性链球菌感染
- B. 结核杆菌感染
- C. 口腔念珠菌感染
- D. B 族维生素缺乏导致的营养不良
- E. 多种病毒感染

80. 不符合急性化脓性根尖周炎骨膜下脓肿阶段的临床表现是（ ）。

- A. 体温升高可达 38°C
- B. 患牙 III 度松动，叩痛（+++），牙龈扪诊可及深部波动感
- C. 根尖区黏膜肿胀局限，半球形隆起
- D. 严重的病例可出现颌面部蜂窝织炎
- E. 末梢白细胞计数多在 $(10\sim 12) \times 10^9/\text{L}$

81. 复发性口腔溃疡的典型临床表现除外（ ）。

- A. 疼痛剧烈
- B. 溃疡边缘整齐，有约 1mm 宽的红晕

- C. 溃疡基部不硬，中心呈凹陷状
- D. 溃疡上覆以灰黄色或浅黄白色纤维素性假膜
- E. 病损部位有残根

82. 人在患病后，有权选择愿意接受或拒绝医生制定的诊治方案，这种权利是（ ）。

- A. 自主原则的体现
- B. 有利原则的体现
- C. 尊重原则的体现
- D. 公正原则的体现
- E. 不伤害原则的体现

83. 关于牙髓失活法，下列说法错误的是（ ）。

- A. 常用失活剂包括多聚甲醛、金属砷和三氧化二砷等
- B. 根尖孔尚未形成的患牙，不使用亚砷酸失活
- C. 采用金属砷失活恒牙一般为 5~7d
- D. 亚砷酸造成的神经血管变化出现在封药后 24~48h
- E. 多聚甲醛封药时间不超过 1 周

84. 牙周膜中数目最多、力量最强大的是（ ）。

- A. 牙槽嵴组
- B. 水平组
- C. 斜行组
- D. 根尖组
- E. 根间组

85. 牙周膜中来源于上皮的细胞成分是（ ）。

- A. 成纤维细胞
- B. 牙周上皮剩余
- C. 成骨细胞
- D. 成牙骨质细胞
- E. 间充质细胞

86. 医学伦理的尊重原则主要包括以下几方面，除了（ ）。

- A. 尊重患者及其家属的自主权或决定
- B. 尊重患者的一切主观意愿
- C. 治疗要获得患者的知情同意
- D. 保守患者的秘密
- E. 保守患者的隐私

87. 除下列哪种细胞色素外，其余都能参与呼吸链的组成？（ ）

- A. 细胞色素 c
- B. 细胞色素 c₁
- C. 细胞色素 P₄₅₀

D. 细胞色素 b

E. 细胞色素 aa₃

88. 一侧额纹消失可能是因为损伤了同侧面 () 神经。

A. 颞支

B. 颧支

C. 颊支

D. 下颌缘支

E. 颈支

89. 哪一项不是急性牙髓炎疼痛的特点? ()

A. 夜间痛比白天重

B. 疼痛不能定位

C. 温度刺激会使疼痛加重

D. 自发性疼痛、阵发性加剧

E. 坐位比卧位重

90. 唇裂发生在怀孕第几周? ()

A. 1~2

B. 3~4

C. 5

D. 6~7

E. 8

91. 不属于牙体急性损伤的是 ()。

A. 冠折

B. 牙震荡

C. 嵌入性脱位

D. 根折

E. 牙隐裂

92. 有关活髓切断术的叙述, 哪一项是不必要的? ()

A. 术前口服抗生素

B. 局部麻醉, 橡皮障隔湿

C. 去净腐质, 消毒窝洞

D. 去净髓室顶, 切除冠髓

E. 止血、放盖髓剂、氧化锌丁香油暂封窝洞

93. 患者男性, 50 岁。行 6 断根拔

除术, 术中断根突然消失, 此时首先应做的是 ()。

A. 冲水吸根

B. 开窗取根

C. 拍 X 线片

D. 服抗生素

E. 扩大牙槽窝掏根

94. 患者，50岁，述左上后牙咬物痛3个月，咬在某一特定位置可引起较强烈

的痛。查：
71 拾 面磨损，牙本质暴露，颊尖高陡，近中边缘嵴至舌尖方向似有隐

裂。进一步检查方法是（ ）。

- A. 叩诊
- B. 温度测验
- C. 碘酊染色
- D. 电活力测验
- E. X线片检查

95. 女性，20岁，诉咀嚼无力，口腔检查发现上颌第一恒磨牙颊侧牙周袋约6mm深，牙齿松动II度，口腔卫生尚佳，下前牙牙石I度，拟诊（ ）。

- A. 青春期牙周炎
- B. 慢性龈炎
- C. 单纯性牙周炎
- D. 复合性牙周炎
- E. 逆行性牙髓炎

96. 女性，21岁。主诉左下后牙进食痛1周，平时仅有冷食痛。查^{6D}龋洞深，叩痛（-）。下面最重要的检查应是（ ）。

- A. 咬诊
- B. 松动度
- C. 温度测验
- D. 电活力测验
- E. X线片检查

97. 患者，30岁。1 变色。患牙无自发痛和冷热刺激痛史。2年前患牙曾有外伤史，未做过治疗。查：牙冠完整，呈暗黄色，无光泽，叩痛（-），温度及电活力测验无反应，X线片未见根尖周明显异常。患牙应诊断为（ ）。

- A. 牙髓纤维性变
- B. 牙髓坏死
- C. 牙髓钙变
- D. 牙内吸收
- E. 牙髓充血

98. 急性牙髓炎患牙疼痛部位的特点是（ ）。

- A. 患者能指出患牙部位
- B. 下颌疼痛患牙为下牙

- C. 上颌疼痛患牙为上牙
- D. 患牙疼痛多无放散性
- E. 上颌疼痛患牙可为下牙

99. 女，30岁。因牙龈出血就诊，口腔检查发现：口腔卫生较差。有少量龈上牙石，边缘龈红肿明显，触之易出血。对该患者正确的处理原则是口腔卫生指导和（ ）。

- A. 龈上洁治术
- B. 口服药物控制炎症
- C. 局部用药控制炎症
- D. 通过局部用药和控制炎症后行龈上洁治术
- E. 通过口服用药和控制炎症后行龈上洁治术

100. 男性，35岁。温度计厂工人。主诉：易激动、易怒（示情感障碍），2年前有唇、手指等细小震颤，现发展到全身震颤，并出现书写震颤。有口腔炎反复发作史。该病可能会诊断为（ ）。

- A. 汞中毒
- B. 铅中毒
- C. 苯中毒
- D. 镉中毒
- E. 砷中毒

101. 男性，50岁。半年前右上后牙龋病做了充填治疗后一直食物嵌塞，近1周来出现持续性自发性钝痛并有牙龈出血，最可能的原因是（ ）。

- A. 充填时未垫底
- B. 备洞时产热过多
- C. 深龋使用刺激性较强的消毒药物
- D. 充填时接触点恢复不良
- E. 备洞时意外穿髓

102. 患者男性，18岁，以上唇肿胀2年就诊，检查发现双唇肿胀，稍硬，有弹性，唇红部鲜红色，皱褶，以上唇明显。左侧鼻唇沟变浅，口角稍下垂。口内检查可见舌背多数沟裂。正确的诊断应该是（ ）。

- A. 湿疹糜烂型唇炎
- B. 干燥脱屑型唇炎
- C. 真菌性唇炎
- D. 梅-罗综合征
- E. 沟纹舌

103. 左上后牙牙龈肿痛2d，查见左上第一磨牙颊侧牙龈卵圆形肿胀，有波动感，袋深8mm，牙髓活力正常，最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性牙槽脓肿
- B. 急性多发性牙龈脓肿

- C. 逆行性牙髓炎
- D. 急性牙周脓肿
- E. 急性根尖周炎

104. 患者 14 岁，右下后牙 1d 来夜间痛。查见 4|𪚩 面畸形中央尖折断痕迹，冷测引起剧痛，叩（-）。诊断为

（ ）。

- A. 急性龋
- B. 可复性牙髓炎
- C. 急性牙髓炎
- D. 慢性牙髓炎
- E. 急性根尖周炎

105. 某 13 岁儿童就诊，主诉全身皮肤干燥，脱屑，最近出现夜间视物不清，且逐渐加重，可能的原因是（ ）。

- A. 维生素 B 族缺乏
- B. 缺乏多种微量元素
- C. 血铅超标
- D. 无机盐摄入不足
- E. 缺乏维生素 A

106. 患者因夜间右侧牙痛不能眠来急诊。牙痛涉及右侧牙和面颞部，查见龋深。患者右侧面和颞部痛的性质属于（ ）。

- A. 钝痛
- B. 激发痛
- C. 自发痛
- D. 阵发性痛
- E. 放散性痛

107. 男性，60 岁，诉咀嚼时牙齿过敏，查牙面磨耗重，叩（-），探敏，冷（-），不松，牙石（+），拟诊（ ）。

- A. 浅龋
- B. 中龋
- C. 牙本质过敏
- D. 逆行性牙髓炎
- E. 变性牙髓炎

108. 造成牙体缺损，最常见的原因是（ ）。

- A. 楔状缺损
- B. 发育畸形
- C. 龋病
- D. 磨损

E. 外伤

109. 患者，女性，演员，26岁。因右侧乳腺癌行右侧乳房全切和周围淋巴结廓清术。术中经检查证实，病人左侧乳房有腺瘤，伴有腺体增生活跃，在未征求病人及家属意见的情况下，医生又切除了病人的左侧乳房。医生违背了病人的（ ）。

- A. 基本医疗权
- B. 监督自己医疗权利的实现
- C. 知情同意权
- D. 保密和隐私权
- E. 平等医疗权

B1 型选择题

(110-1~110-2 题共用备选答案)

- A. 随机误差
- B. 抽样误差
- C. 选择性偏倚
- D. 无应答偏倚
- E. 信息偏倚

110-1. 不按随机抽样的原则进行抽样，使样本与总体之间产生的差异称（ ）。

111-2. 由于检查器械，检查者或调查对象不愿意，或不能真实回答问题而产生的差异称（ ）。

(112-1~112-3 题共用备选答案)

- A. 圆形或椭圆形溃疡，被覆黄白色假膜，周围有红晕，基底柔软
- B. 成簇分布的小水疱破溃后，形成大面积的糜烂
- C. 浅表，微凹，平坦的溃疡，边缘成鼠噬状，潜掘状
- D. 与局部刺激物相适应的溃疡
- E. 火山口状溃疡

112-1. 结核性溃疡（ ）。

113-2. 鳞状细胞癌（ ）。

114-3. 疱疹性口炎（ ）。

(115-1~115-3 题共用备选答案)

- A. 0.1%
- B. 0.5%
- C. 1%
- D. 2%
- E. 3%

115-1. 用于消毒头皮部的碘酊浓度为（ ）。

116-2. 用于消毒颌面颈部的碘酊浓度为 ()。

117-3. 用于消毒口腔黏膜的碘酊浓度为 ()。

(118-1~118-3 题共用备选答案)

- A. 腮腺
- B. 颌下腺
- C. 舌下腺
- D. 唇腺
- E. 腭腺

118-1. 属于大涎腺, 纯浆液性腺的是 ()。

119-2. 属于大涎腺, 混合性腺以浆液性腺泡为主的是 ()。

120-3. 属于大涎腺, 混合性腺以黏液性腺泡为主的是 ()。

(121-1~121-3 题共用备选答案)

- A. DMFT
- B. 龋均
- C. 患龋率
- D. 龋病发病率
- E. 根龋指数

121-1. 某人群患龋病的频率 ()。

122-2. 某人群口腔中平均的龋、失、补牙数 ()。

123-3. 个人口腔中的龋、失、补牙数 ()。

(124-1~124-3 题共用备选答案)

- A. 龈袋
- B. 骨上袋
- C. 骨下袋
- D. 复合袋
- E. 复杂袋

124-1. 袋底位于牙槽嵴冠方的牙周袋为 ()。

125-2. 袋底位于牙槽嵴根方的牙周袋为 ()。

126-3. 假性牙周袋又称 ()。

(127-1~127-3 题共用备选答案)

- A. 充填物有早接触
- B. 未恢复接触点或形成颈部悬突
- C. 备洞过程中产热过多
- D. 继发龋伴牙髓炎
- E. 充填物压得不紧

127-1. 龋齿充填后远期出现继发性痛和自发性痛, 多数是由于 ()。

128-2. 龋齿充填后近期出现继发性痛和自发性痛, 多数是由于 ()。

129-3. 龋齿充填治疗后有咬合痛, 无自发性痛, 无继发性痛, 叩痛 (一), 多数

是由于（ ）。

（130-1~130-3 题共用备选答案）

- A. 继发性牙本质
- B. 前期牙本质
- C. 原发性牙本质
- D. 小球间牙本质
- E. 髓周牙本质

130-1. 牙根发育完成后再形成的牙本质是（ ）。

131-2. 牙齿发育过程中所形成的牙本质是（ ）。

132-3. 在成牙本质细胞与矿化牙本质之间的一层未矿化的牙本质是（ ）。

（133-1~133-3 题共用备选答案）

- A. 釉质发育不全
- B. 氟牙症
- C. 四环素牙
- D. 牙本质发育不全症
- E. 牙骨质发育不全症

133-1. 在牙齿发育阶段，如果饮水中氟含量高于百万分之一，或经其他途径摄入过多的氟，可导致釉质形成不全和钙化不全的是（ ）。

134-2. 在牙的发育阶段，由于局部和全身因素造成釉质结构异常的是（ ）。

135-3. 在牙的发育阶段，服用过量的四环素类药物，使牙着色的是（ ）。

A3/A4 型选择题

（136-1~136-2 题共用题干）

女性，60岁。牙床肿痛2d。检查：左下第一磨牙颊侧牙龈肿胀，有波动感，叩痛轻，局限，有深牙周袋，热测反应同对照牙。

136-1. 该患牙最可能的诊断是（ ）。

- A. 根分叉病变
- B. 边缘性龈炎
- C. 慢性牙周炎
- D. 牙槽脓肿
- E. 牙周脓肿

137-2. 当日的治疗措施是（ ）。

- A. 拔牙
- B. 龈下刮治
- C. 脓肿切开引流

- D. 开髓、拔髓引流
- E. 急性期翻瓣手术

(138-1~138-4 题共用题干)

患者男性，28 岁，下颌第一恒磨牙咬合不适 1 周，感患牙伸长，初时紧咬牙可缓解不适，自昨天开始不敢咬牙并出现自发痛，无放射痛，口腔检查下颌第一恒磨牙远中颌面深龋及髓，探（-），可疑叩痛，牙齿不松动，龈（-），根尖区压痛（+）。

138-1. 根据上述材料，最可能的诊断为（ ）。

- A. 急性牙髓炎
- B. 急性根尖周炎
- C. 急性牙周炎
- D. 急性牙龈炎
- E. 资料不足，无法做出任何诊断

139-2. 为明确诊断，还需做以下一系列检查，其中哪一项是最没有必要的？（ ）

- A. X 线检查
- B. 冷热测
- C. 电活力测
- D. 阿苦里紫牙面染色
- E. 外周血白细胞计数

140-3. 应急处理首选（ ）。

- A. 服用消炎止痛药
- B. 根尖区牙龈切开引流
- C. 针刺止痛，并用氢氧化钙直接盖髓安抚
- D. 去腐、开髓，置氧化锌丁香油棉球安抚镇痛
- E. 去除病髓后开放引流

141-4. 3d 后病人复诊，诉症状明显缓解，此时的处理应当是（ ）。

- A. 封失活剂，嘱再次复诊
- B. 去除引流条，继续服消炎药，条件许可应做洁治术，并嘱 3 个月复查
- C. 清理髓腔，并冲洗，封入樟脑酚棉球，嘱复诊
- D. 停药，观察，如无不适，留底，完成充填术
- E. 拔除患牙，常规医嘱考虑 3 个月后义齿修复

(142-1~142-2 题共用题干)

青年女性，有溃疡反复发作的病史 10 年，每次发作溃疡少于 5 个，症状轻，可以自行愈合。

142-1. 诊断为（ ）。

- A. 轻型口疮
- B. 疱疹型溃疡

- C. 腺周口疮
- D. 疱疹性口炎
- E. 贝赫切特（白塞）综合征

143-2. 本次发病溃疡扩大，直径 1~2cm，深及黏膜层，呈“弹坑状”损害，应诊断为（ ）。

- A. 轻型口疮
- B. 疱疹型溃疡
- C. 腺周口疮
- D. 疱疹性口炎
- E. 贝赫切特综合征